

一、亞汰尼

200 g/L 亞汰尼 FS

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
水稻	葉稻熱病	每公斤稻 種混拌 10 毫升藥劑 和 5 毫升水					<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾稻種直接與藥劑混拌均勻。 2. 混拌藥液之稻種，進行風乾，使藥液完全附著於稻種，再行浸種催芽育苗。 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 適用於水稻種子處理。 2. 使用時添加拌種用樹脂 (Peridiam® EC 104) 2 毫升。 		

二、芬普尼

250 g/L 芬普尼 FS

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
水稻	二化螟蟲	每公斤稻種混拌 6 毫升藥劑與 9 毫升水。					1. 乾稻種直接與藥劑混拌均勻。 2. 混拌藥液之稻種，進行風乾，使藥液完全附著於稻種，再行浸種催芽育苗。		1. 適用於水稻種子處理。 2. 使用時添加拌種用樹脂 (Peridiam® EC 104) 2 毫升。		

三、平氟芬

平氟芬 240 g/L FS

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
水稻	紋枯病	每公斤稻 種混拌8毫 升藥劑與7 毫升水。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾稻種直接與藥劑混拌均勻。 2. 混拌藥液之稻種，進行風乾，使藥液完全附著於稻種，再行浸種催芽育苗。 		<ol style="list-style-type: none"> 1. 適用於水稻種子處理。 2. 使用時添加拌種用樹脂(Peridiam® EC 104) 2毫升。 		

四、二福隆

40.1%二福隆 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
十字花科 包葉菜類	鱗翅目害 蟲	0.25 公升	4,000	害蟲發生 時開始施 藥	每隔 7 天施 藥 1 次	連續 2 次		22			惠光股份 有限公司

五、小菜蛾性費洛蒙

90.5%小菜蛾性費洛蒙 VP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
十字花科包葉菜類、十字花科小葉菜類、十字花科根菜類	小菜蛾	每公頃誘餌數量 120 個					每 8-12 公尺設置 1 個性費洛蒙誘蟲器，每橡皮帽內含費洛蒙 0.45mg；將誘餌放置於黏膠式誘蟲器內，黏板黏滿小菜蛾蟲體時需及時更換；誘蟲盒懸掛高度為作物生長點上方 30-50 公分處。		田間有效期為 2 個月。		興農股份有限公司

六、液化澱粉芽孢桿菌 PMB01

1×10^9 cfu/mL 液化澱粉芽孢桿菌 PMB01 AL

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
胡瓜	萎凋病		200	發病初期於每株莖基部或根圈灌注 200 毫升稀釋液	每隔 7 天施藥 1 次	共 5 次					嘉農企業股份有限公司
蔬菜	萎凋病	4-36 公升	200	發病初期於每株莖基部或根圈灌注 200 毫升稀釋液	每隔 7 天施藥 1 次	共 5 次				延伸使用	

七、液化澱粉芽孢桿菌 CL3

>108 cfu/mL 液化澱粉芽孢桿菌 CL3 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明	原始登記廠商名稱
草莓	灰黴病	2.5 公升	400	發病初期時開始施藥	每隔 7 天施藥 1 次	連續 3 次					興農股份有限公司
蔬菜	灰黴病	0.6-7.5 公升	400	發病初期時開始施藥	每隔 7 天施藥 1 次	連續 3 次				延伸使用	

八、賽氟菲克利

15.25%賽氟菲克利 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
水稻	紋枯病	0.67-0.8 公斤	1,500	於水稻分 蘗期及孕 穗期各施 藥 1 次。				15			台灣日產 化工股份 有限公司

九、賽氟滅

21%賽氟滅 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
水稻	苗立枯病	0.33 毫升	1,500				<ol style="list-style-type: none"> 1. 育苗箱於播種後澆灌藥液，再行覆土。 2. 每育苗箱施用500 毫升稀釋液。 		適用於水稻育苗箱		台灣日產 化工股份 有限公司

十、速殺氟

21.8%速殺氟 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
瓜菜類、瓜 果類、龍鬚 菜	粉蝨類	0.25-0.5 公升	2,400	害蟲發生 時開始施 藥	必要時隔 7 天再施藥 一次	最多 2 次		6			台灣道禮 股份有限 公司

十一、 氟派瑞
400 g/L 氟派瑞 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
番茄	根瘤線蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植後第3天澆灌稀釋藥液1次，每株澆灌40毫升，或每公頃澆灌800公升藥液。					施用前保持土壤濕潤		台灣拜耳股份有限公司

十二、 福賽得

80%福賽得 WG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採收 期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
百香果	疫病	1.6-3.2 公斤	500	雨季來臨 前開始施 藥	必要時隔 10天施藥1 次	共3次		21		延伸使用	