

## 「殺紋依得利」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 9 月 3 日農授防字第 1141876337J 號公告修正

45%(w/w) 殺紋依得利 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蘿菜	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
甘藷	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。適用於葉用甘藷。	
十字花科小葉菜類	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
不結球萵苣與半結球萵苣	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
茼蒿	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
山茼蒿	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
紅鳳菜	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
白鳳菜	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
芳香萵	苗立枯	2 公克/	1,500	播種後均					僅限苗期使	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
壽菊	病	平方公尺		勻澆淋稀釋液1次。					用。	
闊包菊	苗立枯病	2公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液1次。					僅限苗期使用。	
婆羅門參	苗立枯病	2公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液1次。					僅限苗期使用。 <u>適用於婆羅門參葉。</u>	本項修正。
蒜	苗立枯病	2公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液1次。					僅限苗期使用。適用於蒜葉。	
蔥	苗立枯病	2公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液1次。					僅限苗期使用。	
韭	苗立枯病	2公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液1次。					僅限苗期使用。	
落萹	苗立枯病	2公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液1次。					僅限苗期使用。適用於落萹葉。	
珠蔥	苗立枯病	2公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液1次。					僅限苗期使用。適用於珠蔥葉。	
芹菜	苗立枯病	2公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液1次。					僅限苗期使用。	
芫荽	苗立枯病	2公克/平方公	1,500	播種後均勻澆淋稀					僅限苗期使用。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		尺		釋液 1 次。						
茴香	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
山芹菜	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
菠菜	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
甜菜	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。適用於葉用甜菜。	
莧菜	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
瓜菜類	立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	瓜類育苗期：瓜類種子播種後，立即於穴盤上均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
瓜菜類	立枯病	100 毫升/株	1,500	瓜類移植期：瓜類瓜苗定植後，於移植穴立即澆灌稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜果類	立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	瓜類育苗期：瓜類種子播種後，立即於穴盤上均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
瓜果類	立枯病	100 毫升/株	1,500	瓜類移植期：瓜類瓜苗定植後，於移植穴立即澆灌稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	
艾草	苗立枯病	2 公克/平方公尺	1,500	播種後均勻澆淋稀釋液 1 次。					僅限苗期使用。	