

「鮎澤蘇力菌 Ab12」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 9 月 3 日農授防字第 1141876337I 號公告修正

60% (30,000 DBMU/mg) 鮎澤蘇力菌 Ab12 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
甘藍	小菜蛾	1.3-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥。	7	連續 3次			儘量於陰天或下午施藥，可減少藥效降低之情形發生，拆封後請短期內用完，如未用完請密封並置於乾燥陰涼處。	本項修正，原注意事項文字移由產品特性中整體說明揭露。
十字花科小葉菜、十字花科包葉菜類、十字花科根菜類	鱗翅目 害蟲	1.3-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥。	7	連續 3次				本項新增。
乾豆類	夜蛾類	1.3-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥。	7	連續 3次				本項新增。
大豆	夜蛾類	1.3-1.6 公斤	750	害蟲發生時開始施藥。	7	連續 3次			適用於毛豆。	本項新增。