

「芬座克敏」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 9 月 3 日農授防字第 1141876337F 號公告修正

芬座克敏 水懸劑 (SC) 400 g/L (40% w/v)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|-------------|-------|---|---------|--------|------|----------|-----------------|------------|
| 甜椒 | 炭疽病 | 0.4 公升 | 2,000 | 於果實幼果時期開始施藥。 | 7 | 連續 3 次 | | 3 | | |
| 甜椒 | 炭疽病 | 0.4 公升 | 2,000 | 於果實幼果時期開始施藥。 | 7 | 連續 3 次 | | 3 | | 重複範圍，本項刪除。 |
| 葡萄 | 晚腐病 | 0.6 公升 | 2,000 | 果實硬核期開始施藥，每隔 7 天施藥 1 次，連續 3 次至套袋前為止。 | | | | 14 | | |
| 檬果 | 炭疽病 | 0.5-0.63 公升 | 2,400 | 開花初期開始施藥，每隔 7 天施藥 1 次，共 4 次；謝花後結小果期，每隔 14 天施藥 1 次，至套袋為止，共 4 次。開花初期至套袋共 8 次。 | | 共 8 次 | | 14 | | |
| 梨 | 黑星病 | 0.6 公升 | 2,000 | 病害發生初期開始施藥。 | 10 | 連續 3 次 | | 15 | 避免重複使用含滅芬座或百克敏成 | |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|-----------|------|---------|-------|----------------------|---------|-----------|------|----------|------|-----------|
| | | | | | | | | | 分藥劑。 | |
| 番茄、 辣椒 | 炭疽病 | 0.4 公升 | 2,000 | 於果實幼 果時期開 始施藥。 | 7 | 連續 3 次 | | 3 | | 本項新 增。 |