

B型肝炎的媽媽，請您帶您滿一歲的幼兒至醫院進行B型肝炎血液篩檢，若幼兒為帶原者，請定期至醫院追蹤檢查


24



建議孕婦應在第一孕期
產檢時檢測B肝表面
抗原及e抗原篩檢，
瞭解自己的帶原情況。



如果媽媽是B型肝炎帶原者：
新生兒出生24小時內除了
儘速接種第一劑B型肝炎疫
苗外，還需要接種B型肝炎
免疫球蛋白。



當寶寶12個月大時，應主動帶寶寶至醫院抽血
檢驗B型肝炎表面抗原及抗體，以瞭解寶寶B型
肝炎帶原情形：

1. 已具有B型肝炎表面抗體的寶寶，代表已有保護力
2. 若檢測為B型肝炎帶原寶寶：
 - 如肝功能正常，則每6~12個月追蹤一次。
 - 如肝功能異常，則由醫師決定複檢時間。
3. 如未產生B型肝炎表面抗體，也未成為B型肝炎帶原寶寶，則可免費追加1劑B型肝炎疫苗，1個月後再抽血檢驗，若表面抗體仍為陰性，後續可於1、6個月提供公費疫苗接種完成第2、3劑。

大手牽小手

守護家中
心肝Baby



B型肝炎帶原的孕婦在懷孕、生產過程中，有很高的機率會透過「垂直感染」，把B型肝炎病毒傳染給寶寶，只要做好B型肝炎高危險群幼兒追蹤檢查與追加接種作業，就可以大大降低新生兒感染B型肝炎的機率！



B型肝炎的媽媽，請您帶您滿一歲的幼兒至醫院進行B型肝炎血液篩檢，若幼兒為帶原者，請定期至醫院追蹤檢查

準媽媽應向你的婦產科醫師詢問驗血結果



B型肝炎表面抗原(HBsAg):

如果表面抗原的檢查為陽性，那麼您可能就是B型肝炎帶原者。



您的檢驗結果如為**B型肝炎帶原者**，建議**每6~12月追蹤**一次肝功能及超音波檢查，如肝功能異常，則由醫師決定追蹤過程。



B型肝炎e抗原(HBeAg):

如果e抗原檢查為陽性，那麼表示您現在體內B肝病毒正處於高病毒量，具有高傳染性。

保護自己和你的寶寶 做好防護，避免感染

1 預防接種:嬰兒出生後應儘速注射1劑B型肝炎疫苗，愈早愈好，不要晚於24小時，並於滿1個月及6個月時接種第2、3劑疫苗。如果媽媽是HBsAg陽性(不論e抗原陽性或陰性)的嬰兒，還需於出生24小時內儘速接種1劑B型肝炎免疫球蛋白。

2 一般民眾如有感染B型肝炎風險，如未具抗體、也未帶原者，建議自費接種B型肝炎疫苗。



3 B型肝炎目前有疫苗可預防，應採取預防措施。

4 使用拋棄式注射針具及針灸針具，穿耳洞、刺青工具等需充分消毒滅菌，並避免不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為。

5 養成良好個人衛生習慣，不與別人共用刮鬍刀、牙刷、針具、刮痧板、指甲剪，以免因刮破皮膚或黏膜而感染。

6 B型肝炎帶原者不可輸血，且應注意防範，**避免傳染他人**。



7 正確全程使用保險套，不從事無保護的性行為(如多重性伴侶及嫖妓等行為)。

早期追蹤及治療

不做肝苦人!



一般民眾可自行抽血檢驗，瞭解自身之帶原狀況，以早期發現及早期追蹤或治療。

肝炎表面抗原及e抗原雙陽性之孕婦可於懷孕期就診肝膽胃腸科，與醫師討論預防母嬰傳染措施。

慢性肝炎帶原者請儘速前往醫療院所，經醫師評估治療，以降低其未來罹患肝硬化及肝癌之風險。

高雄市政府衛生局 關心您

高雄萬事通 1999