

## 結核病個案愛滋病毒(HIV)檢驗相關問答

項次	問 題	說 明
1.	為何要在治療結核科門診提供愛滋病毒(HIV)檢驗?	HIV 感染是潛伏結核感染(LTBI)進展為結核病之重要危險因子，且結核病是 HIV 感染者之常見共病及主要死亡原因，早期診斷 HIV 感染可作為結核病治療用藥之參考，提升治療成功率。
2.	醫療院所應何時執行 HIV 檢驗?	醫療院所對於結核病個案治療前評估，會抽血進行生化檢查，請向個案說明取得同意後，同時檢驗 HIV，避免須多次抽血造成困擾。
3.	12 歲以下兒童也可以檢驗嗎?	考量臺灣 12 歲以下兒童 HIV 感染情況稀少且治療期間不一定常規抽血，故不納入檢驗對象；惟倘評估兒童有 HIV 感染風險，再依臨床建議抽血檢驗。
4.	個案須填寫同意書嗎?	在提供 HIV 檢驗及諮詢服務時，應讓個案瞭解檢驗及諮詢服務的目的及過程，並取得個案的同意後進行檢驗。同意的方式以口頭或書面同意均可。
5.	HIV 是一種年輕人才會感染的疾病嗎?	HIV 不是年輕人才會感染，只要有不安全性行為、共用針具或稀釋液等行為，就有感染的風險。
6.	個案拒絕怎麼辦?	部分個案剛被通報診斷結核病，心理衝擊很大，第一時間或許會拒絕檢查，且多數人都認為自己沒有感染 HIV 的風險。可以給個案一段時間適應及思考後，再與個案溝通，瞭解自己的免疫狀況，對治療有好處，鼓勵抽血檢查，並向個案說明會確保其隱私。
7.	若個案主訴無性行為，還需要檢驗嗎?	愛滋病毒感染未發病期間不會有症狀，一般會在感染後好幾年才發病，故目前沒有危險因子不代表未被感染，仍建議抽血檢驗以瞭解現在的免疫和健康狀況。

## 結核病個案愛滋病毒(HIV)檢驗相關問答

項次	問 題	說 明
8.	當我向個案介紹並進行 HIV 檢驗時，會讓個案陷入視為愛滋感染者的窘境	HIV 檢驗如同一般預防性保健服務(如:B、C 肝炎檢驗)，係為使民眾瞭解自身健康狀況之檢查項目，個案無須將進行 HIV 檢驗者連結到道德譴責的刻板印象或歧視。
9.	如果個案推說“他沒有時間接受 HIV 檢驗”，該怎麼辦？	如果是臨床醫師，則建議回診時併其他抽血檢驗一起進行；如果是公衛人員，除請個案到衛生所抽血外，也可以在例行的家庭訪視中提供篩檢服務。