

附件2

地址	備註
高雄市XX區XX路X號	

通報機構類別
矯正機關(監獄、收容所、戒治所)
養護中心(護理之家、安/養護中心)
精障機構(精神科病房、精障安/養護中心)
軍營
醫療院所
嬰兒室、產後護理之家
學校(必填欄位)

請調查有無以下共同活動史

1.教誨課程、宗教心靈課程等相關課程

2.復健課程/療程、職能治療、團康活動

3.職能治療、團康活動

4.上課、出操、體能訓練

自行列舉:_____

自行列舉:

5.課輔班、才藝班、補習班(家教)、社團活動

高屏區管制中心

上呼吸道/類流感/不明原因發燒群聚:

矯正機關(監獄、收容所、戒治所)

1. 各工/舍落實移動管制(7天): 疫情發生房間發病收容人移地隔離後, 該房接觸者
2. 醫務候診室防治措施
 - (1) 診間就醫分流: 以工/舍為單位, 就診前區分不具呼吸道/發燒及具呼吸道/發燒
 - (2) 進出候診室及接見等候室皆必須佩戴口罩; 準備乾洗手液, 進出前後皆必須乾
 - (3) 宣導提早就醫: 請工/舍管理員發現收容人不適, 一律提報就醫。
3. 會客等候室防治措施
 - (1) 進出會客等候室皆必須佩戴口罩; 準備乾洗手液, 進出前後皆必須乾洗手。
 - (2) 會客使用桌上電話機旁備消毒酒精(紗布), 於每位收容人使用前後皆必須進行
4. 加強咳嗽禮節: 收容人隨身準備衛生紙, 咳嗽時要求以衛生紙摀住口鼻。 房間

養護中心(護理之家、安/養護中心)

1. 提高通報/就醫警覺: 住民出現上呼吸道症狀即協助就醫並隔離, 勿只以發燒為
2. 進行防疫動線規劃: 發病個案、密切接觸者(與發病個案同房)、非密切接觸且無
3. 留寢用餐、暫停團體活動和進行訪客限制。發病房間無症狀住民如至房外活動,
4. 每天開窗3次, 每次至少15分鐘; 有排風扇則請開啟, 以助室內通風。
5. 工作人員於上班期間, 全程佩戴外科口罩, 用餐時保持1公尺之間距, 落實手部
6. 配合追蹤發病個案/住院個案健康狀況, 如有住院或轉加護病房者, 則主動告知

精障機構(精神科病房、精障安/養護中心)

1. 提高通報/就醫警覺: 住民出現上呼吸道症狀即協助就醫並隔離, 勿只以發燒為
2. 進行防疫動線規劃: 發病個案、密切接觸者(與發病個案同房)、非密切接觸且無
3. 留寢用餐、暫停團體活動和進行訪客限制。
4. 暫停空調並開窗(精障機構若因住民安全因素無法開窗, 則不在此限); 有排風扇
5. 住民加強手部衛生: 安排人員監督住民在用餐前確實洗手; 工作人員上班佩戴口
6. 工作人員於上班期間全程佩戴外科口罩, 用餐時保持1公尺之間距, 落實手部衛
7. 配合追蹤發病個案/住院個案健康狀況, 如有住院或轉加護病房者, 則主動告知

軍營

1. 規劃防疫動線: 疫情發生房間發病個案移地隔離, 該房接觸者原地隔離; 發病隔
2. 寢室關閉冷氣, 打開窗戶維持空氣流通; 疫情發生單位原寢室用餐、用餐禁交談
3. 長官加強關懷士兵有無上呼吸道或發燒症狀, 及早就醫診斷。
4. 因應假日, 宣導發病個案外出時, 請全程佩戴口罩並加強手部衛生、勿出入室內

醫療院所

1. 工作人員於上班期間全程佩戴外科口罩, 用餐時互相保持1公尺之間距, 落實手
2. 考量提高病房空調換氣次數(ACH)以改善通風。
3. 疫情發生單位落實只出不進, 直至疫情結束。
4. 加強疫情單位之環境清消及落實手部衛生和口罩佩戴。

嬰兒室、產後護理之家、托嬰中心

1. 提高通報/就醫警覺: 嬰兒出現上呼吸道症狀即協助就醫並隔離, 勿以發燒為就醫

2. 加強入住媽媽衛教宣導，請其加強自我症狀監測、手部衛生及咳嗽禮節等。
3. 加強進行全面消毒，宣導工作人員落實手部衛生及執行照護工作時應配戴口罩。
4. 規劃防疫動線：限制訪客，發病個案儘速就醫隔離照護，工作人員分區照護。
5. 疫情期間遵循只出不進原則。
6. 配合追蹤發病個案/住院個案健康狀況，如有住院或轉加護病房者則主動告知衛

學校

1. 進行家長聯繫及衛教，發病學生得請假至症狀緩解後24小時，期間勿至補習班或
2. 針對發病個案參與之課後補習班進行造冊，並由衛生所進行地毯式拜訪及衛教宣
3. 鑒於用餐為飛沫傳染高風險行為，請校方宣導遵守用餐時「不走動、不交談」原
4. 如因其他因素考量無法停課，請學校座位作調整：發病同學在前排、其他同學課

事件防治措施建議

者原地隔離，7天內不准遷進其他房間收容人、亦不遷出至其他房間(其他房間供單人使

症狀兩批就醫需求之收容人，前一批先就醫、再換下一批就醫，看完診候診間清消;再:洗手。

機具消毒(話筒、話筒把手、按鍵)。

內用餐時背對背、禁交談。

就醫或防護隔離條件(避免部分老人低體溫因素)。

症狀者分區隔離，工作人員分區照護，若礙於人力無法分區，則分批照護(非密切接觸一律佩戴口罩。

衛生，以避免交互傳播；發病服用流感抗病毒藥劑員工，安排休假至發病日後5日。

衛生所；住加護病房或死亡個案請醫師評估是否符合通報流感病發重症定義。

就醫或防護隔離條件(避免部分老人低體溫因素)。

症狀者分區隔離，工作人員分區照護，若礙於人力無法分區，則分批照護(非密切接觸

則請開啟協助室內通風。

罩、落實手部衛生。

生，以避免交互傳播；發病服用克流感員工安排休假至發病日後5日。

衛生所；住加護病房或死亡個案請醫師評估是否符合通報流感病發重症定義。

隔離者暫停出操、訓練、上課等團體活動。

。

公共場所。

部衛生，以避免交互傳播；發病服用流感抗病毒藥劑員工，安排休假至發病日後5日。

鑑別條件。

生所。

心安親班。

導。

則。

調整至後排。

用則不在此限)。

換別的工/舍看診。

i且無症狀者->密切接觸者->發病個案)。

i且無症狀者->密切接觸者->發病個案)。

發病個案名冊(107年9月修訂版).xls 的相容性報表
執行於 2018/9/12 09:49

舊版 Excel 不支援此活頁簿中的下列功能。當您以舊版 Excel 開啟此活頁簿時，或以舊版檔案格式儲存此活頁簿時，這些功能可能會遺失或降級。

嚴重影響功能

此活頁簿中的一或多個儲存格，包含參照其他工作表中值的資料驗證規則。這些資料驗證規則將不會儲存。

稍微影響逼真度

此活頁簿中的部分儲存格或樣式包含所選檔案格式不支援的格式。這些格式將會轉換為最接近的可用格式。

發生的次數

版本

1

[發病個案疫調](#) Excel 97-2003

49

Excel 97-2003