新聞資料

農業部高雄區農業改良場
屏東縣長治鄉德和村德和路 2-6 號

第 115037 號　　中華民國 115 年 10 月 29 日

颱風過境帶來強風雨水，請農友加強防範作物病害

高屏地區多項重要作物正值育苗定植及栽培初期，受颱風剛過境帶來的強風雨水影響，植株易產生傷口，且環境濕度偏高，易誘發病害。高雄區農業改良場（以下簡稱高雄農改場）籲請農友於風雨過留意田間衛生，適時進行預防與防治工作，以降低病害發生風險，確保作物產量與品質。

高雄農改場羅正宗場長指出，針對各作物於風雨後好發之病蟲害，防範重點如下：紅豆播種後一個月內若遭遇降雨及土壤含水量過高，易因白絹病菌、立枯絲核菌或疫病菌引發根腐病與立枯現象，受害植株根部呈黑褐色，莖基部出現縊縮壞疽，導致植株枯萎死亡；應注意田區排水，並可選用20%福多寧水懸劑(1,200倍)澆灌土壤以防範白絹病，疫病可選用23%亞托敏水懸劑(1,000倍)防治。小果番茄易因風雨導致細菌性斑點病傳播，造成葉片斑點及壞疽，定植初期常以下位葉發生較為嚴重；風雨後應儘速清除受害枝葉並保持通風，可選用81.3%嘉賜銅可溼性粉劑(1,000倍)防治；此外應持續監測病毒病害及其媒介昆蟲粉蝨，確保定植初期植株健康。洋蔥即將陸續定植，降雨或地勢低窪排水不良，易引發黃萎病與炭疽病，黃萎病會造成幼苗黃化倒伏或本田期根部腐敗萎凋，炭疽病則可能造成葉片扭曲及葉鞘彎曲症狀；定植前應嚴格淘汰罹病幼苗與殘體，黃萎病發生初期可選用62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑(1,500倍)，炭疽病可選用25%待克利乳劑 (3,000倍)進行防治。芒果植株則因強風，易導致傷口增加及病原菌容易入侵，為避免後續防治不易，可施用炭疽病及細菌性黑斑病登記藥劑以保護傷口。

高雄農改場提醒農友，應留意天氣與田間變化，適時調整農事作業，加強田間排水、清園以及病蟲害監測和防治工作。農友如在病蟲害防治上仍有疑問，可洽高雄改場病蟲害診斷服務專線(08-7389060)，相關人員將提供協助。

- 高雄農改場作物安全用藥資訊 https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665

聯絡人：陳正恩
電　話：08-7746760



紅豆根腐病造成紅豆幼苗倒伏



番茄細菌性斑點病造成葉片斑點及壞疽



洋蔥定植前應淘汰罹病幼苗與殘體



排水不良易引發洋蔥黃萎病等病害