

「美氟綜」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 3 月 13 日農授防字第 1121488356E 號公告修正

22%(w/w) 美氟綜 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
大豆	夜蛾類	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於乾豆。	
十字花科包葉菜類	小菜蛾	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	3		18		
十字花科小葉菜類	小菜蛾	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	3		9		
番茄	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
甜椒	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
辣椒	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
茄子	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
枸杞	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
香瓜茄	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
樹番茄	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		
大豆	夜蛾類	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施	7			15	適用於毛豆。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
花木	夜蛾類	0.6-2.5 公升	1.0-1.2 公升	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
茶	捲葉蛾類	0.75 公升	1,500	害蟲發生時施藥。				21		
胡瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3	限第一次開花前使用。	本項新增。
苦瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3	限第一次開花前使用。	本項新增。
絲瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3	限第一次開花前使用。	本項新增。
冬瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
扁蒲	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
南瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
隼人瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
越瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
夏南瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
木鱨果	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生初期開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
洋香瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生 初期開始 施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
香瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生 初期開始 施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。
西瓜	夜蛾類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生 初期開始 施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。