

「賽芬蟎」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 3 月 13 日農授防字第 1121488356H 號公告修正

賽芬蟎 水懸劑 (SC) 20.000 (%) (w/w)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
仙草	葉蟎類	0.7-1.5公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	14			21		
甜椒	葉蟎類	1.0-2.0公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	14			7		
辣椒	葉蟎類	1.0-2.0公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	14			7		
枸杞	葉蟎類	1.0-2.0公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	14			7	限採收果實者使用。	
香瓜茄	葉蟎類	1.0-2.0公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	14			7		
野茄	葉蟎類	1.0-2.0公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	14			7		查未訂有農藥殘留容許量標準，本項刪除。
酸漿	葉蟎類	1.0-2.0公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	14			7		
樹番茄	葉蟎類	1.0-2.0公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	14			7		
木瓜	神澤氏葉蟎	1-1.2公升	2,000	害蟎發生時施藥 1 次。				12		
酪梨	葉蟎類	0.5-1.0公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			12		
草莓	葉蟎類	1-1.5公升	1,000	害蟎發生時施藥 1 次。	14			5		
葡萄	葉蟎類	0.4-0.8公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			7		
楊桃	葉蟎類	0.4-0.8公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			7		
蓮霧	葉蟎類	0.5-1.5公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
梨、 蘋果、 桃、 梅、 李、 枇杷	葉蟬類	0.5-1.0 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		本項修正。
印度棗	葉蟬類	0.4-0.6 公升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。	7			14		本項修正。
柑桔類	葉蟬類	0.7 公 升	3,000	害蟬發生時 開始施藥 1 次。				15		
茶	葉蟬類	0.5 公 升	2,000	害蟬發生時 開始施藥。				15		
當歸	葉蟬類	1.2-2.0 公升	1,000	害蟬發生時 開始施藥。	14			21		
胡瓜、 南瓜、 扁蒲、 冬瓜、 苦瓜、 夏南瓜、 隼人瓜、 絲瓜、 越瓜、 木鱧果	葉蟬類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟬發生時 開始施藥 1 次。				7		本項新增。
西瓜、 洋香瓜、 香瓜、	葉蟬類	1.0-1.2 公升	1,000	害蟬發生時 開始施藥 1 次。				7		本項新增。