


檔 號：  
保存年限：

## 農業部 公告

發文日期：中華民國113年10月24日  
發文字號：農授防字第1131876880A號



主旨：公告修正「鮎澤蘇力菌NB-200」農藥使用方法及其範圍如  
附件，並自即日生效。  
依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

## 「鮎澤蘇力菌 NB-200」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 10 月 24 日農授防字第 1131876880A 號公告修正


54% (15,000 IU/mg) 鮎澤蘇力菌 NB-200 水分散性粒劑 (WG)

| 作物名稱                | 病蟲名稱  | 每公頃每次用量    | 稀釋倍數  | 使用時期       | 施藥間隔(天) | 施藥次數   | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明                          |
|---------------------|-------|------------|-------|------------|---------|--------|------|----------|------|-----------------------------|
| 蔬菜                  | 鱗翅目害蟲 | 0.5-2.0 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |      |                             |
| 番茄                  | 夜蛾類   | 0.5-1.0 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       |        |      |          |      |                             |
| 山茶科茶類               | 鱗翅目害蟲 | 0.8-1.0 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 |         |        |      |          |      |                             |
| 葡萄                  | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |      | 本項新增。原始登記廠商名稱：台灣住友化學股份有限公司。 |
| 果樹、可可、咖啡、破布子、愛玉子、檳榔 | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7       | 共 2 次  |      |          |      |                             |
| 鳳梨                  | 鱗翅目害蟲 | 1.0-2.0 公斤 | 1,000 | 開花末期開始施藥。  | 7       | 連續 3 次 |      |          |      |                             |

檔 號：  
保存年限：

## 農業部 公告

發文日期：中華民國113年10月24日  
發文字號：農授防字第1131876880B號



主旨：公告修正「三氟派瑞」農藥使用方法及其範圍如附件，並自  
即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駿季

## 「三氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 10 月 24 日農授防字第 1131876880B 號公告修正

500 g/L (50% w/v) 三氟派瑞 水懸劑 (SC)

| 作物名稱        | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數  | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數  | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項         | 說明 |
|-------------|------|-----------|-------|-------------|---------|-------|------|----------|--------------|----|
| 十字花科包葉菜類    | 炭疽病  | 0.1-0.4公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 共 2 次 |      | 14       |              |    |
| 結球萵苣        | 炭疽病  | 0.1-0.4公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 共 2 次 |      | 14       |              |    |
| 十字花科小葉菜類    | 炭疽病  | 0.1-0.4公升 | 2,500 | 本葉期開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       |              |    |
| 不結球萵苣與半結球萵苣 | 炭疽病  | 0.1-0.4公升 | 2,500 | 本葉期開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       |              |    |
| 茼蒿          | 炭疽病  | 0.1-0.4公升 | 2,500 | 本葉期開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       |              |    |
| 山茼蒿         | 炭疽病  | 0.1-0.4公升 | 2,500 | 本葉期開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       |              |    |
| 紅鳳菜         | 炭疽病  | 0.1-0.4公升 | 2,500 | 本葉期開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       |              |    |
| 白鳳菜         | 炭疽病  | 0.1-0.4公升 | 2,500 | 本葉期開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       |              |    |
| 蔥           | 炭疽病  | 0.3-0.8公升 | 2,500 | 定植後開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       |              |    |
| 韭           | 炭疽病  | 0.3-0.8公升 | 2,500 | 定植後開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       | 採收韭菜花者不得使用。  |    |
| 菠菜          | 炭疽病  | 0.1-0.3公升 | 2,500 | 本葉期開始施藥。    | 7       | 共 2 次 |      | 10       |              |    |
| 番茄          | 炭疽病  | 0.2-0.6公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。 | 7       | 共 2 次 |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |    |
| 甜椒          | 炭疽病  | 0.4公      | 2,500 | 病害發生        | 7       | 共 2 次 |      | 7        | 避免重          |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數  | 使用時期           | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項         | 說明  |
|------|------|-----------|-------|----------------|---------|------|------|----------|--------------|-----|
|      |      | 升         |       | 初期開始施藥，全株均勻噴施。 |         | 次    |      |          | 複使用氟派瑞單劑。    |     |
| 辣椒   | 炭疽病  | 0.2-0.6公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。    | 7       | 共2次  |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |     |
| 茄子   | 炭疽病  | 0.2-0.6公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。    | 7       | 共2次  |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |     |
| 枸杞   | 炭疽病  | 0.2-0.6公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。    | 7       | 共2次  |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |     |
| 香瓜茄  | 炭疽病  | 0.2-0.6公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。    | 7       | 共2次  |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |     |
| 樹番茄  | 炭疽病  | 0.2-0.6公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。    | 7       | 共2次  |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |     |
| 瓜菜類  | 炭疽病  | 0.3-0.8公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。    | 7       | 連續2次 |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |     |
| 胡瓜   | 白粉病  | 0.1公升     | 9,000 | 病害發生初期開始施藥。    | 7       | 共2次  |      | 3        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |     |
| 瓜果類  | 炭疽病  | 0.3-0.8公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥。    | 7       | 連續2次 |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 |     |
| 香蕉   | 炭疽病  | 0.09-     | 4,000 | 謝花幼果           | 14      |      |      | 18       | 避免重          | 本項修 |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量    | 稀釋倍數  | 使用時期              | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項         | 說明    |
|------|------|------------|-------|-------------------|---------|------|------|----------|--------------|-------|
|      |      | 0.3 公升     |       | <u>期開始施藥。</u>     |         |      |      |          | 複使用氟派瑞單劑。    | 正。    |
| 木瓜   | 炭疽病  | 0.2-0.7 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |              | 本項修正。 |
| 番荔枝  | 炭疽病  | 0.2-0.5 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |              | 本項修正。 |
| 酪梨   | 炭疽病  | 0.3-0.7 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |              | 本項修正。 |
| 紅龍果  | 炭疽病  | 0.3-0.5 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |              | 本項修正。 |
| 百香果  | 炭疽病  | 0.3-0.5 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |              | 本項修正。 |
| 紅毛丹  | 炭疽病  | 0.2-0.4 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |              | 本項修正。 |
| 草莓   | 炭疽病  | 0.3-0.8 公升 | 2,500 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 7       | 2    |      | 7        | 避免重複使用氟派瑞單劑。 | 本項修正。 |
| 葡萄   | 晚腐病  | 0.3-0.5 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 7        |              | 本項修正。 |
| 楊桃   | 炭疽病  | 0.3-0.5 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 7        |              | 本項修正。 |
| 蓮霧   | 炭疽病  | 0.3-1 公升   | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 7        |              | 本項修正。 |
| 番石榴  | 炭疽病  | 0.4-0.7 公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 7        |              | 本項修正。 |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數  | 使用時期              | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                | 說明    |
|------|------|-----------|-------|-------------------|---------|------|------|----------|---------------------|-------|
| 無花果  | 炭疽病  | 0.3-0.5公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 7        |                     | 本項修正。 |
| 龍眼   | 炭疽病  | 0.3-0.5公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |                     | 本項修正。 |
| 荔枝   | 炭疽病  | 0.2-0.4公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |                     | 本項修正。 |
| 檬果   | 炭疽病  | 0.3公升     | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       | 結果後每隔14天施藥1次至套袋前為止。 | 本項修正。 |
| 蘋果   | 炭疽病  | 0.1-0.8公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      | 最多4次 |      | 14       |                     | 本項修正。 |
| 桃    | 炭疽病  | 0.1-0.8公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      | 最多4次 |      | 14       |                     | 本項修正。 |
| 梅    | 炭疽病  | 0.1-0.8公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      | 最多4次 |      | 14       |                     | 本項修正。 |
| 印度棗  | 炭疽病  | 0.3-0.4公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      | 最多4次 |      | 14       |                     | 本項修正。 |
| 柿    | 炭疽病  | 0.3-0.5公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |                     | 本項修正。 |
| 柑桔類  | 炭疽病  | 0.5公升     | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      | 共3次  |      | 14       |                     | 本項修正。 |
| 椰子   | 炭疽病  | 0.2-0.7公升 | 4,000 | <u>謝花幼果期開始施藥。</u> | 14      |      |      | 18       |                     | 本項修正。 |
| 山茶科茶 | 赤葉枯  | 0.3-1     | 4,000 | 病害發生              | 14      |      |      | 14       |                     |       |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數  | 使用時期               | 施藥間隔(天) | 施藥次數     | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明    |
|------|------|---------|-------|--------------------|---------|----------|------|----------|------|-------|
| 類    | 病    | 公升      |       | 初期開始施藥。            |         |          |      |          |      |       |
| 梨    | 炭疽病  | 0.3 公升  | 4,000 | 謝花幼果<br>期開始施<br>藥。 | 14      | 共 3<br>次 |      | 14       |      | 本項新增。 |