

「撲滅松」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 4 月 23 日農授防字第 1141875604A 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
40% 撲滅松水基乳劑	好速化學股份有限公司	114 年 4 月 23 日	本藥劑係 40% 撲滅松可溼性粉劑轉換為更安全劑型

二、「撲滅松」農藥使用方法與範圍一覽表

20(%) (w/w) 撲滅松 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	一點螟蟲	2-3 公升秧田至孕穗	400					14	齊穗期至收穫前用藥量為 3-3.75 公升。	
水稻	二化螟蟲	2-3 公升(幼株期)	100				孕穗期用藥 3-3.75 公升用動力微粒噴霧機噴藥；人力噴霧器噴藥時用藥量 2 公升,稀釋 400 倍。	21		
水稻	瘤野螟	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	夜蛾類	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	稻螟蛉	2-3 公升	400	孕穗期至齊穗期。				21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	樹蔭蝶	2-3 公升	400	孕穗期至齊穗期。				21		
水稻	稻苞蟲	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	負泥蟲	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	鐵甲蟲	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	薊馬類	2-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。				21		
玉米	薊馬類	1.3-2.5 公升	600	害蟲發生時開始施藥。	7		施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。	6	玉米薊馬為玉米褪綠斑駁病毒之媒介昆蟲，應於玉米幼苗期防治，以防止病毒傳播。	
玉米	條背土蝗	2.5 公升	600	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
乾豆類	青椿象	2.5 公升		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
綠豆	夜蛾類	1.3-2 公升	400	害蟲發生時開始施	7			14		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
綠豆	毒蛾類	1.3-2公升	400	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	5公升	400	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	夜蛾類	5公升	400	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用，防治夜蛾類幼蟲	
大豆	椿象類	5公升	400	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	南方綠椿象	5公升	400	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
包葉菜類	青椿象	2.5公升		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
小葉菜類	青椿象	2.5公升		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
根菜類	青椿象	2.5公升		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
茭白筍	二化螟蟲	2-3.5公升	100	生育初期，發現茭白葉鞘變黃，或				21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				田間水面有流葉與折葉情形時，施藥 1 次，必要時於分藥後期再施藥 1 次。						
甘藷	甘藷 潛葉 蛾	2.5 公 升	400	害蟲發生時開始施藥。						
山藥	黑盲 椿象	2.5- 3.75 公 升	400	害蟲發生時開始施藥。	7	最多 2 次		6		
薑	玉米 螟	2.5-3 公升	400	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
果菜 類	青椿 象	2.5 公 升		害蟲發生時開始施藥。				10		
瓜菜 類	青椿 象	2.5 公 升		害蟲發生時開始施藥。				10		
豆菜 類	青椿 象	2.5 公 升		害蟲發生時開始施藥。				10		
黃金	粉介	2.25-5	400	害蟲發	7			10		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
果	殼蟲類	公升		生時開始施藥。						
黃金果	果實蠅類	1 公升	75		7				使用時加蛋白質水解物，果實套袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每 7 天 1 次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於植株。	
香蕉	粉介殼蟲類		400	十月時施藥。					清園後隨即施藥。	
鳳梨	粉介殼蟲類		1,000	落花後施藥。						
百香果	粉介殼蟲類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。	
榴槤蜜	粉介殼蟲類	2.5-5 公升	400	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		400	花落後 20 天施藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		400	在冬令世代（1-2 月），於若蟲固定前施藥。	7	2-3	可加入 95%礦物油 150 倍混合噴施。		1. 施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒毀。 2. 儘量使用	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									動力噴霧 機以增加 防治效 力。 3. 樹勢衰弱 時切勿混 用礦物 油。	
荔枝	荔枝 細蛾		400	落花後 20 天左 右施 藥。	10	3-4		10		
荔枝	膠蟲		400	害蟲發 生時開 始施 藥。				10		
荔枝	荔枝 瘿蚧	2.5- 3.75 公 升	400	害蟲發 生時開 始施 藥。	10			10		
檬果	螟蛾 類	2.5-3 公升	400	害蟲發 生時開 始施 藥。						
柑桔 類	東方 果實 蠅	1,000 毫升	75	成熟前 施藥。	7				1. 本劑使用 時加蛋白 質水解物 1 公升。 2. 防治果實 蠅係作局 部噴施於 果園周 圍，不得 直接噴施 於植株 上，標示 僅加註果	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									實蠅即 可。	
甘蔗	大螟	3 公升	400	害蟲發 生時開 始施 藥。						

50(%) (w/w) 撲滅松 乳劑 (EC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾 類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	一點 螟蟲	0.8-1.2 公升秧 田至孕 穗	1,000	採收 前。				21	孕穗至齊穗期 用 1.2 公升。	
水稻	二化 螟蟲	0.8-1.2 公升秧 田至孕 穗	1,000				人力噴霧器噴 藥，孕穗至齊 穗期用 1.2 公 升;動力微粒噴 霧機噴藥時孕 穗至齊穗期用 1.2 公升稀釋 250 倍	21		
水稻	瘤野 螟	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	夜蛾 類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	稻螟	0.8-1.2	1,000	孕穗期				21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
	蛉	公升		至齊穗 期。						
水稻	樹蔭 蝶	0.8-1.2 公升	1,000	孕穗期 至齊穗 期。				21		
水稻	稻苞 蟲	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	負泥 蟲	0.8-1.2 公升	1,000	幼穗形 成前。			1. 水稻分藥 期中，負 泥蟲幼蟲 發生時噴 藥，若施 藥後田間 密度尚 高，隔 15 天再施藥 一次。 2. 施用粒劑 或粉劑時 稻田需保 持水位高 度 3-5 公 分，7-10 天，若水 位降低時 必須灌溉 補充。	21		
水稻	鐵甲 蟲	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	薊馬 類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
玉米	薊馬類	0.5-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7		施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。	6	玉米薊馬為玉米褪綠斑駁病毒之媒介昆蟲，應於玉米幼苗期防治，以防止病毒傳播。	
玉米	條背土蝗	1.0公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
乾豆類	青椿象	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
綠豆	夜蛾類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
綠豆	毒蛾類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	2公升	1,000	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
大豆	夜蛾類	2公升	1,000	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
大豆	椿象類	2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	南方綠椿象	2公升	1,000	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
包葉菜類	青椿象	1公升	1,000	害蟲發生時開始施				10	十字花科蔬菜避免使用。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
小葉菜類	青椿象	1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
根菜類	青椿象	1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
茭白筍	二化螟蟲	0.8-1.2 公升	1,000	生育初期，發現茭白葉鞘變黃，或田間水面有流葉與折葉情形時，施藥 1 次，必要時於分蘖後期再施藥 1 次。				21		
甘藷	甘藷潛葉蛾	1 公升	1,000	生長期施藥。		1-2		60		
山藥	黑盲椿象	1-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	最多 2 次		6		
薑	玉米螟	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
果菜類	青椿象	1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10		
瓜菜類	青椿象	1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10		
豆菜類	青椿象	1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10		
黃金果	粉介殼蟲類	0.9-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
黃金果	果實蠅類	0.4 公升	200		7				使用時加蛋白質水解物，果實套袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每 7 天 1 次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於植株。	
香蕉	粉介殼蟲類		1,000	十月時施藥。					清園後隨即施藥。	
鳳梨	粉介殼蟲類	1.2 公升	2,500	鳳梨花謝約 1 個半月左右施藥 1 次			以人力噴霧器徐徐噴佈於果實及果柄基部	9		
百香果	粉介殼蟲	0.3-0.6 公升	2,500	害蟲發生時開	7			10	避免施用於弱勢植株，以免	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	類			始施藥。					發生藥害。	
榴槤蜜	粉介殼蟲類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		1,000	花落後 20 天施藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		1,000	在冬令世代（1-2 月），於若蟲固定前施藥。	7	2-3	可加入 95%礦物油 150 倍混合噴施。		1. 施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒毀。 2. 儘量使用動力噴霧機以增加防治效力。 3. 樹勢衰弱時切勿混用礦物油。	
荔枝	荔枝細蛾		1,000	落花後 20 天左右施藥。	10	3-4		10		
荔枝	膠蟲		1,000	害蟲發生時開始施藥。						
荔枝	荔枝癭蚧	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	10			10		
檬果	螟蛾類	1-1.2 公升	1,000	花梢抽出後施					自新梢抽出後每 10 天施藥 1	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。					次共 2 次，花梢抽出後每 10 天施藥 1 次共 4 次。	
柑桔類	東方果實蠅	400 毫升	200	成熟前施藥。	7				1. 本劑使用時加蛋白質水解物 1 公升。 2. 防治果實蠅係作局部噴施於果園周圍，不得直接噴施於植株上，標示僅加註果實蠅即可。	
甘蔗	大螟	1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。						

50(%) (w/w) 撲滅松 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	一點螟蟲	0.8-1.2 公升秧田至孕穗	1,000	採收前。				21	孕穗至齊穗期用 1.2 公升。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	二化 螟蟲	0.8-1.2 公升秧 田至孕 穗	1,000				人力噴霧器噴藥，孕穗至齊穗期用 1.2 公升;動力微粒噴霧機噴藥時孕穗至齊穗期用 1.2 公升稀釋 250 倍	21		
水稻	瘤野 螟	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	夜蛾 類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	稻螟 蛉	0.8-1.2 公升	1,000	孕穗期至齊穗期。				21		
水稻	樹蔭 蝶	0.8-1.2 公升	1,000	孕穗期至齊穗期。				21		
水稻	稻苞 蟲	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	負泥 蟲	0.8-1.2 公升	1,000	幼穗形成前。			1. 水稻分藥期中，負泥蟲幼蟲發生時噴藥，若施藥後田間密度尚高，隔 15 天再施藥一次。 2. 施用粒劑	21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
							或粉劑時 稻田需保 持水位高 度 3-5 公 分，7-10 天，若水 位降低時 必須灌溉 補充。			
水稻	鐵甲 蟲	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	薊馬 類	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
玉米	薊馬 類	0.5-1 公升	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7		施藥時務必將 藥液噴灑至新 葉及葉鞘部 位。	6	玉米薊馬為 玉米褪綠斑 駁病毒之媒 介昆蟲，應 於玉米幼苗 期防治，以 防止病毒傳 播。	
玉米	條背 土蝗	1.0 公 升	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	2		6		
乾豆 類	青椿 象	1 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				10	十字花科蔬 菜避免使 用。	
綠豆	夜蛾 類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			14		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
綠豆	毒蛾類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	2公升	1,000	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
大豆	夜蛾類	2公升	1,000	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
大豆	椿象類	2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	南方綠椿象	2公升	1,000	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
包葉菜類	青椿象	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
小葉菜類	青椿象	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
根菜類	青椿象	1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
茭白筍	二化螟蟲	0.8-1.2公升	1,000	生育初期，發現茭白葉鞘變黃，或田間水面有流葉與折葉情形時，施				21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				藥 1 次，必 要時於 分藥後 期再施 藥 1 次。						
甘藷	甘藷 潛葉 蛾	1 公升	1,000	生長期 施藥。		1-2		60		
山藥	黑盲 椿象	1-1.5 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	最多 2 次		6		
薑	玉米 螟	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			12		
果菜 類	青椿 象	1 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				10		
瓜菜 類	青椿 象	1 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				10		
豆菜 類	青椿 象	1 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。				10		
黃金 果	粉介 殼蟲 類	0.9-2 公升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			10		
黃金 果	果實 蠅類	0.4 公 升	200		7				使用時加蛋 白質水解 物，果實套	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每 7 天 1 次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於植株。	
香蕉	粉介殼蟲類		1,000	十月時施藥。					清園後隨即施藥。	
鳳梨	粉介殼蟲類	1.2 公升	2,500	鳳梨花謝約 1 個半月左右施藥 1 次			以人力噴霧器徐徐噴佈於果實及果柄基部	9		
百香果	粉介殼蟲類	0.3-0.6 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。	
榴槤蜜	粉介殼蟲類	1-2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		1,000	花落後 20 天施藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		1,000	在冬令世代（1-2 月），於若蟲固定前施藥。	7	2-3	可加入 95%礦物油 150 倍混合噴施。		1. 施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒毀。 2. 儘量使	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									用動力噴霧機以增加防治效力。 3. 樹勢衰弱時切勿混用礦物油。	
荔枝	荔枝細蛾		1,000	落花後20天左右施藥。	10	3-4		10		
荔枝	膠蟲		1,000	害蟲發生時開始施藥。						
荔枝	荔枝癭蚧	1.0-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	10			10		
檬果	螟蛾類	1-1.2公升	1,000	花梢抽出後施藥。					自新梢抽出後每10天施藥1次共2次，花梢抽出後每10天施藥1次共4次。	
柑桔類	東方果實蠅	400毫升	200	成熟前施藥。	7				1. 本劑使用時加蛋白質水解物1公升。 2. 防治果實蠅係	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									作局部 噴施於 果園周 圍，不 得直接 噴施於 植株 上，標 示僅加 註果實 蠅即 可。	
甘蔗	大螟	1.2 公 升	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。						

95(%) (w/w) 撲滅松 超低容量液劑 (UL)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾 類	0.75-1 公升						21	空中施藥； 第一次施 藥：插秧後 約 30 天；第 二次施藥： 插秧後約 90 天。	
水稻	二化 螟蟲	0.5- 0.75 公 升					超低容量地面 撒佈；動力微粒 噴霧機噴嘴前 或藥管上加流 量控制器(孔徑 0.8 毫米)操作者 位上風順風噴 射,人行方向與 風向垂直速度	21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							40-70 公尺/分鐘。			
水稻	蝗蟲類	0.5-0.75 公升					空中施藥;動力微粒噴霧機噴嘴前或藥管上加流量控制器(孔徑 0.8 毫米);操作者位上風順風噴射,人行方向與風向成直角,速度 40-70 公尺/分鐘。	21		
甘蔗	條背土蝗	1 公升		害蟲發生時開始施藥。						

40(%) (w/w) 撲滅松 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	1-1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。				21		
水稻	一點螟蟲	1-1.5 公斤秧田至孕穗	800					14	齊穗期至收穫前用藥量為 1.5 公斤。	
水稻	二化螟蟲	1-1.5 公斤(幼株期)	200				孕穗期用藥 1.5 公斤用動力微粒噴霧機噴藥;人力噴霧器噴藥時用藥量 1 公斤,稀釋 800 倍	21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	瘤野 螟	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	夜蛾 類	1-1.5 公斤	800	孕穗期 至齊穗 期。				21		
水稻	稻螟 蛉	1-1.5 公斤	800	孕穗期 至齊穗 期。				21		
水稻	樹蔭 蝶	1-1.5 公斤	800	孕穗期 至齊穗 期。				21		
水稻	稻苞 蟲	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	負泥 蟲	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	鐵甲 蟲	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	薊馬 類	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
玉米	薊馬 類	0.7-1.3 公斤	1,200	害蟲發 生時開 始施 藥。	7		施藥時務必將 藥液噴灑至新 葉及葉鞘部 位。	6	玉米薊馬為 玉米褪綠斑 駁病毒之媒 介昆蟲，應 於玉米幼苗 期防治，以 防止病毒傳 播。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
玉米	條背土蝗	1.25 公斤	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
乾豆類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
綠豆	夜蛾類	0.65-1 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
綠豆	毒蛾類	0.65-1 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	夜蛾類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用，防治夜蛾類幼蟲	
大豆	椿象類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	南方綠椿象	2.5 公斤	800	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
包葉菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
小葉菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開				10	十字花科蔬菜避免使	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				始施 藥。					用。	
根菜 類	青椿 象	1.25 公 斤		害蟲發 生時開 始施 藥。				10	十字花科蔬 菜避免使 用。	
茭白 筍	二化 螟蟲	1-1.75 公斤	200	生育初 期，發 現茭白 葉鞘變 黃，或 田間水 面有流 葉與折 葉情形 時，施 藥 1 次，必 要時於 分蘖後 期再施 藥 1 次。				21		
甘藷	甘藷 潛葉 蛾	1.25 公 斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。					適用於甘藷 塊根。	
山藥	黑盲 椿象	1.25- 1.9 公 斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	最多 2 次		6		
薑	玉米 螟	1.25- 1.5 公 斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			12		
果菜 類	青椿 象	1.25 公 斤		害蟲發 生時開				10		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				始施藥。						
瓜菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10		
豆菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10		
黃金果	粉介殼蟲類	1.13-2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
黃金果	果實蠅類	0.53 公斤	150		7				使用時加蛋白質水解物，果實套袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每 7 天 1 次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於植株。	
香蕉	粉介殼蟲類		800	十月時施藥。					清園後隨即施藥。	
鳳梨	粉介殼蟲類		2,000	落花後施藥。						
百香果	粉介殼蟲類	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
榴槤蜜	粉介殼蟲類	1.25-2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		800	花落後 20 天施藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		800	在冬令世代（1-2 月），於若蟲固定前施藥。	7	2-3	可加入 95%礦物油 150 倍混合噴施。		1. 施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒毀。 2. 儘量使用動力噴霧機以增加防治效力。 3. 樹勢衰弱時切勿混用礦物油。	
荔枝	荔枝細蛾		800	落花後 20 天左右施藥。	10	3-4		10		
荔枝	膠蟲		800	害蟲發生時開始施藥。				10		
荔枝	荔枝癭蚧	1.25-1.9 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	10			10		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
檬果	螟蛾類	1.25-1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。						
柑桔類	東方果實蠅	533 公克	150	成熟前施藥。	7				1. 本劑使用時加蛋白質水解物 1 公升。 2. 防治果實蠅係作局部噴施於果園周圍，不得直接噴施於植株上，標示僅加註果實蠅即可。	
甘蔗	大螟	1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。						

40%(w/w) 撲滅松 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	螟蛾類	1-1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。				21		變更安全劑型

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	一點 螟蟲	1-1.5 公斤秧 田至孕 穗	800					14	齊穗期至收 穫前用藥量 為 1.5 公 斤。	
水稻	二化 螟蟲	1-1.5 公斤 (幼株 期)	200				孕穗期用藥 1.5 公斤用動 力微粒噴霧機 噴藥；人力噴 霧器噴藥時用 藥量 1 公斤， 稀釋 800 倍	21		
水稻	瘤野 螟	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	夜蛾 類	1-1.5 公斤	800	孕穗期 至齊穗 期。				21		
水稻	稻螟 蛉	1-1.5 公斤	800	孕穗期 至齊穗 期。				21		
水稻	樹蔭 蝶	1-1.5 公斤	800	孕穗期 至齊穗 期。				21		
水稻	稻苞 蟲	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	負泥 蟲	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	鐵甲 蟲	1-1.5 公斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。				21		
水稻	薊馬	1-1.5	800	害蟲發				21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
	類	公斤		生時開始施藥。						
玉米	薊馬類	0.7-1.3 公斤	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7		施藥時務必將藥液噴灑至新葉及葉鞘部位。	6	玉米薊馬為玉米褪綠斑駁病毒之媒介昆蟲，應於玉米幼苗期防治，以防止病毒傳播。	
玉米	條背土蝗	1.25 公斤	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
乾豆類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
綠豆	夜蛾類	0.65-1 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
綠豆	毒蛾類	0.65-1 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			14		
大豆	螟蛾類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用。	
大豆	夜蛾類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。					限採收乾大豆者使用，防治夜蛾類幼蟲	
大豆	椿象類	2.5 公斤	800	害蟲發生時開					限採收乾大豆者使用。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				始施藥。						
大豆	南方綠椿象	2.5 公斤	800	結莢期施藥。	15			14	限採收乾大豆者使用。	
包葉菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
小葉菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
根菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10	十字花科蔬菜避免使用。	
茭白筍	二化螟蟲	1-1.75 公斤	200	生育初期，發現茭白葉鞘變黃，或田間水面有流葉與折葉情形時，施藥 1 次，必要時於分蘖後期再施藥 1 次。				21		
甘藷	甘藷潛葉蛾	1.25 公斤	800	害蟲發生時開始施					適用於甘藷塊根。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
山藥	黑盲椿象	1.25-1.9 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2 次		6		
薑	玉米螟	1.25-1.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
果菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10		
瓜菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10		
豆菜類	青椿象	1.25 公斤		害蟲發生時開始施藥。				10		
黃金果	粉介殼蟲類	1.13-2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
黃金果	果實蠅類	0.53 公斤	150		7				使用時加蛋白質水解物，果實套袋前或果實蠅密度急遽增加時，作局部施佈毒餌，每 7 天 1 次，局部噴施於果園周圍，不得直接噴灑於	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									植株。	
香蕉	粉介殼蟲類		800	十月時施藥。					清園後隨即施藥。	
鳳梨	粉介殼蟲類		2,000	落花後施藥。						
百香果	粉介殼蟲類	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟲發生時開始施藥。	7			10	避免施用於弱勢植株，以免發生藥害。	
榴槿蜜	粉介殼蟲類	1.25-2.5 公斤	800	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
龍眼	細蛾類		800	花落後 20 天施藥。	10	3-4		10		
龍眼	膠蟲		800	在冬令世代（1-2 月），於若蟲固定前施藥。	7	2-3	可加入 95%礦物油 150 倍混合噴施。		1. 施藥防治之前先採折枯枝及危害嚴重枝燒毀。 2. 儘量使用動力噴霧機以增加防治效力。 3. 樹勢衰弱時切勿混用礦物油。	
荔枝	荔枝		800	落花後	10	3-4		10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	細蛾			20 天左 右施 藥。						
荔枝	膠蟲		800	害蟲發 生時開 始施 藥。				10		
荔枝	荔枝 瘿蚧	1.25- 1.9 公 斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。	10			10		
檬果	螟蛾 類	1.25- 1.5 公 斤	800	害蟲發 生時開 始施 藥。						
柑桔 類	東方 果實 蠅	533 公 克	150	成熟前 施藥。	7				1. 本劑使 用時加 蛋白質 水解物 1 公 升。 2. 防治果 實蠅係 作局部 噴施於 果園周 圍，不 得直接 噴施於 植株 上，標 示僅加 註果實 蠅即 可。	
甘蔗	大螟	1.5 公 斤	800	害蟲發 生時開						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				始施 藥。						