

老鼠的防治方法及如何正確使用毒餌藥劑：

1. 封閉鼠道，不讓鼠來：封閉居家周圍可能的鼠洞及空隙，修補破損的紗窗及紗門，排水管可加裝0.6公分網目以下之柵網，以防止老鼠入侵或從屋外的排水溝等地爬進屋內。
2. 斷絕糧食，不讓鼠吃：斷絕食物的來源，將食物與飲水收藏於適當的封閉容器內，每日做好廚餘回收，將廚餘與垃圾分離，如果無法立即清除廚餘，應予以完整包裝，以免引來老鼠覓食。
3. 整理環境，不讓鼠住：整理居家環境，減少堆積雜物，儲藏室、櫥櫃、水溝等都應經常清掃，以免提供老鼠躲藏與築巢的處所。
4. 毒餌藥劑應選用行政院環境保護署核准的環境衛生用藥。
5. 每次使用前將廚餘或食物收好，投下適量之毒餌置於鼠類經常出沒、搜食及棲息處，直到不再有取食之情況(待老鼠取食後再補充，以免久置發霉)。餌劑如未被取食則不宜再放餌，因為鼠隻可能不在附近活動或已被毒殺淨盡。
6. 放置捕鼠籠、捕鼠夾、粘鼠板等捕鼠器或滅鼠毒餌藥劑，應選擇安全、隱蔽之處所，避免兒童及寵物誤觸或誤食。
7. 為避免草鴞、黑鳶、遊隼等一級保育類猛禽誤食已食入毒餌的鼠隻，如需使用滅鼠毒餌藥劑，應避免於保育類動物棲息之環境放置，如發現老鼠屍體，應立即予以清除處理，以避免保育類動物誤食而中毒或造成死亡情事。
8. 滅鼠毒餌藥劑主要是影響凝血功能，若誤食毒餌，於意識清醒的情況下，應立即催吐，並攜帶毒餌及包裝告知餌劑成分，以便醫院診治。