



最新病蟲害警報

首頁 > 植物保護資訊 > 最新病蟲害警報 > 防治荔枝蒂頭蟲要趁早

防治荔枝蒂頭蟲要趁早

高屏地區的玉荷包荔枝即將進入果實期囉！喜歡吃果實的蒂頭蟲-荔枝細蛾，在果實綠豆大小時，就會在果皮表面產卵，孵化後的幼蟲隨即進入果實內。因此，高雄區農業改良場(以下簡稱高雄農改場)特別提醒農友，綠豆大的果實期為重要的防治時機。此外，由於成蟲喜棲息於枝條下方，故噴藥時應加強樹冠內的枝條噴灑，以避免害蟲數量劇增而影響荔枝收成。

高雄農改場場長戴順發表示，荔枝果實形成後，易誘引荔枝細蛾成蟲產卵於果實表皮，幼蟲孵化後直接蛀入果實內部危害。在果肉尚未包裹種子前，幼蟲蛀食種子；當果肉生長、包覆種子後，幼蟲則蛀蝕果蒂處，受害果實會提早脫落，造成嚴重落果，果實如果沒有掉落，則因蒂部存在細蛾幼蟲及蟲糞，致商品價值降低。

由於幼果剛形成，像綠豆大小時，就會有成蟲來產卵，故噴藥防治一定要趁早，務必在害蟲發生初期防治，以避免後續害蟲密度升高。施藥時，可參考農藥資訊服務網，選擇核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，例如20%亞滅培水溶性粉劑、50%芬殺松乳劑、85%加保利可濕性粉劑、50%撲滅松乳劑、

2.4%第滅寧水懸劑、42%益洛寧可濕性粉劑或10.2%賽安勃濃懸乳劑等，且應選擇作用機制不同的藥劑輪流使用，以避免抗藥性產生。此外，噴藥時務必加強噴灑樹冠內部的枝條(成蟲喜歡休息的地方)。農友在害蟲鑑定或防治上如有進一步問題，歡迎逕洽高雄區農業改良場，技術人員將竭誠為農友服務。



喜歡棲息於枝條下方的荔枝細蛾成蟲



取食果實蒂頭的荔枝細蛾幼蟲

[回上一頁](#)

© www.kdais.gov.tw

https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=warning&id=9836

2024/03/27