

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435A號



主旨：公告修正「阿扶巴汀」農藥使用方法及其範圍如附件，並自
即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「阿扶巴汀」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435A 號公告修正


75 g/L (7.5% w/v) 阿扶巴汀 水分散性乳劑 (DC)

[illegible]

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435B號



主旨：公告修正「阿扶平」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「阿扶平」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435B 號公告修正


50 g/L (5% w/v) 阿扶平 水分散性乳劑 (DC)

[illegible]

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435C號



主旨：公告修正「派滅芬」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「派滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435C 號公告修正

200 g/L(20% w/v) 派滅芬 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
十字花 科包葉 菜類	黑斑病	0.17- 0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		10	<u>使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。</u>	本 項 修 正。
結球萵 苣	黑斑病	0.17- 0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		15	<u>使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。</u>	本 項 修 正。
番茄	早疫病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		3	使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。	
甜椒	早疫病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		3	使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。	
辣椒	早疫病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		3	<u>使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。</u>	本 項 修 正。
茄子	早疫病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始	7	連續 2 次		3	<u>使用本藥劑 後不可與非</u>	本 項 修 正。


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				施藥。					<u>本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。</u>	
枸杞	早疫病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		3	<u>使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。</u>	本 項 修 正。
香瓜茄	早疫病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		3	<u>使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。</u>	本 項 修 正。
樹番茄	早疫病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		3	<u>使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。</u>	本 項 修 正。
香蕉	黑星病	0.417 公升	2,400	病害發生 初期開始 施藥。	14	共 4 次		14	<u>使用本藥劑 後不可與非 本藥劑核准 使用範圍輪 作，以免蓄 積殘留。</u>	本 項 修 正。
梨	黑星病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	共 2 次		14		
蘋果	黑星病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	共 2 次		14		
桃	黑星病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	共 2 次		14		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
印度棗	白粉病	0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	10	共 2 次		14		
<u>菜豆</u>	黑斑病	<u>0.25 公升</u>	<u>4,000</u>	<u>病害發生初期開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>共 2 次</u>		<u>15</u>	<u>使用本藥劑後不可與非本藥劑核准使用範圍輪作，以免蓄積殘留。</u>	本項新增。
<u>毛豆</u>										
<u>刀豆</u>										
<u>花豆</u>										
<u>扁豆</u>										
<u>豇豆</u>										
<u>樹豆</u>										
<u>翼豆</u>										
<u>蠶豆</u>										
<u>鷹嘴豆</u>										
<u>菜豆</u>										
<u>豌豆</u>										

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435D號



主旨：公告修正「曼普歐西比」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「曼普歐西比」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435D 號公告修正

280 g/L (28% w/v) 曼普歐西比 水懸劑 (SC)


[illegible]

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
<u>菠菜</u>	<u>露菌病</u>	<u>0.4 公 升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生 初期開始 施藥。</u>	<u>7</u>	<u>共 2 次</u>		<u>14</u>		本項新 增。
<u>羅勒</u>										
<u>蘿蔔</u>										
<u>燕薺</u>										
<u>山葵</u>										
<u>蓮霧</u>	<u>果疫病</u>	<u>0.4 公 升</u>	<u>5,000</u>	<u>病害發生 初期開始 施藥。</u>	<u>7</u>	<u>共 3 次</u>		<u>14</u>		本項新 增。
<u>番石榴</u>										
<u>無花果</u>										
<u>胡瓜</u>	<u>露菌病</u>	<u>0.4 公 升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生 初期開始 施藥。</u>	<u>7</u>	<u>共 2 次</u>		<u>2</u>		本項新 增。
<u>苦瓜</u>										
<u>絲瓜</u>										
<u>冬瓜</u>										
<u>南瓜</u>										
<u>扁蒲</u>										
<u>隼人瓜</u>										
<u>越瓜</u>										
<u>夏南瓜</u>										
<u>木鼈果</u>										

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435E號



主旨：公告修正「護汰派滅芬」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「護汰派滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435E 號公告修正

400 g/L (40% w/v) 護汰派滅芬 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
甘藍	菌核病	0.5 公升	2,000	病 害 發 生 初 期 開 始 施 藥。	7-10	共 2 次		15	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	與大類範圍重疊，本項刪除。
結球萵苣	菌核病	0.5 公升	2,000	定植後或發病初期開始施藥。	7-10	共 2 次		15	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	
草莓	灰黴病	0.5 公升	2,000	草 莓 開 花 灰 黴 病 發 生 初 期 開 始 施 藥。	7	連續 2 次		3	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	
葡萄	灰黴病	0.5-1 公升	1,000	開 花 期 及 中 果 期 各 施 藥 一 次。		共 2 次		14	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	
十字花科包葉菜類	菌核病	0.5 公升	2,000	病 害 發 生 初 期 開 始 施 藥。	7-10	共 2 次		15	使用派滅芬之藥劑後，避免與非本藥劑之核准範圍作物輪作，以免蓄積殘留。	本項新增。

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435F號



主旨：公告修正「布芬淨」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「布芬淨」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435F 號公告修正

40(%) (w/w) 布芬淨 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蟲	0.48 公升	2,500	孕穗末期若蟲發生盛期。				15	1. 本劑對若蟲防治效果較佳。 2. 宜於水稻孕穗末期若蟲發生盛期使用一次。	
水稻	斑飛蟲	0.5 公升	加水至 15 公升	一期作插秧後 40-50 天。			1. 空中施藥：每 8 平方公分相紙內應有直徑 1,000 μ 以下之藥點 135 點以上。 2. 人力噴藥：稀釋 2,000 倍，每穗 1-2 隻斑飛蟲時。	15	避免南瓜田使用，以免藥害。	
花椰菜	銀葉粉蟲	0.67-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施		2		15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
小葉菜類	粉蝨類	0.6-0.9公升	2,500	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
瓜菜類	粉蝨類	0.67-1.13公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共2次		7		
瓜果類	粉蝨類	0.67-1.13公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
檬果	葉蟬類		1,200	抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。	10			15	為保護授粉昆蟲及天敵，盛花期避免施藥。	
檬果	檬果木蝨	0.38-0.81公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
梨	梨木蝨	0.96公升	2,500	害蟲發生時開始施藥。	7	2		9		
印度棗	粉介殼蟲類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時施藥1次。				6		
柑桔類	盾介殼蟲類	1-1.5公升	1,500	害蟲發生時施藥1次。				18		
花木	粉蝨類	0.4-0.8公升	1,500	害蟲發生時開	7				限觀賞花卉使用，使用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				始施藥。					前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	粉蝨類	0.2-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7		藥液應噴到葉背。	12		
茶	柑桔刺粉蝨	0.5 公升	2,000	若蟲發生初期施藥。				15		
咖啡	介殼蟲類	1.0-1.5 公升	1,500	害蟲發生時施藥 1 次。				7		
可可	介殼蟲類	1.0-1.5 公升	1,500	害蟲發生時施藥 1 次。				7		本項新增。

25(%) (w/w) 布芬淨 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	褐飛蝨	0.8 公 斤	1,500	孕穗末期若蟲發生盛期。				15	1. 本劑對若蟲防治效果較佳。 2. 宜於水稻孕穗末期若蟲發生盛期使用一次。 3. 本劑試驗時加	


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									「新利農」展著劑 3,000 倍。	
水稻	斑飛蟲	0.8 公 斤	1,500	孕穗期 後若蟲 發生高 時。			孕穗期後若 蟲發生密度 高時施藥一 次。	15	本劑試驗時 加「新利農 展著劑」 3,000 倍。	
花椰菜	銀葉粉 蟲	1-1.2 公斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。		2		15		
芥藍	銀葉粉 蟲	1-1.5 公 斤	1,500	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	2		6		
瓜菜類	粉蟲類	1-1.7 公 斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7	共 2 次		7		
瓜果類	粉蟲類	1-1.7 公 斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			15		
瓜果類	銀葉粉 蟲	1-1.7 公 斤	1,000	害蟲發 生時開 始施 藥。	7			15		
檬果	葉蟬類		750	抽穗及 開花期 害蟲發 生時開 始施 藥。	10			15	為保護授粉 昆蟲及天 敵，盛花期 避免施藥。 2. 本劑試驗 時加展著劑 「新利農」 3,000 倍。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
椪果	椪果木蝨	0.6-1.3公斤	750	害蟲發生時開始施藥。	7			15		
梨	梨木蝨	1.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	2		9		
花木	粉蝨類	0.6-1.2公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
花木	銀葉粉蝨		1,000	害蟲發生時開始施藥。	7		應噴到葉背。		限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	粉蝨類	0.3-1.2公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7		藥液應噴到葉背。	12		
菊	溫室粉蝨	0.6-1.2公斤	1,000	發現葉片有溫室粉蝨時開始施藥。	7		藥液應噴到葉背。			
咖啡	介殼蟲類	1.6-2.4公斤	1,000	害蟲發生時施藥 1 次。				7		
可可	介殼蟲類	1.6-2.4公斤	1,000	害蟲發生時施藥 1 次。				7		本項新增。

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435G號



主旨：公告修正「亞酞蟎」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳啟季

「亞醜蟎」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435G 號公告修正

15(%) (w/w) 亞醜蟎 水懸劑 (SC)


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事 項	說明
胡瓜 苦瓜 木鼈果	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		本 項 修 正。
絲瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		
冬瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		
南瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		
扁蒲	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		
隼人瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		
越瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		
夏南瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		
洋香瓜 香瓜 西瓜	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			6		本 項 修 正。
瓜果類	葉蟎類	0.5-1.3 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。	7			21		重 複 範 圍，本項 刪除。
西瓜	二點葉 蟎	0.3-0.5 公 升	1,500	害蟎發生時開 始施藥。		2		6		本 項 恢 復 為 原 登 記 作 物品項。
香蕉	葉蟎類	0.18- 0.6 公升	1,500	害蟎發生初期 施藥 1 次。				14		
木瓜	葉蟎類	0.34-1.34 公升	1,500	害蟎發生初期 施藥 1 次。				14		
番荔枝	葉蟎類	0.46-1.0 公升	1,500	害蟎發生初期 施藥 1 次。				14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事 項	說明
百香果	葉蟬類	0.53-1.33 公升	1,500	害蟬發生初期 施藥 1 次。				14		
龍眼	葉蟬類	0.5-1.0 公 升	1,500	害蟬發生初期 施藥 1 次。				14		
荔枝	葉蟬類	0.4-0.8 公 升	1,500	害蟬發生初期 施藥 1 次。				14		
檬果	葉蟬類	0.6-1.34 公升	1,500	害蟬發生初期 施藥 1 次。				7		
梨 蘋果 桃 梅 李 杏 枇杷	葉蟬類	0.27-1.67 公升	1,500	害蟬發生時開 始施藥。	7			6		本 項 修 正。
印度棗	柑桔葉 蟬	0.6-0.8 公 升	1,500	害蟬發生時開 始施藥。	7			6		本 項 修 正。
柑桔類	葉蟬類	0.66-1.6 公升	1,500	害蟬發生時開 始施藥。	7			21		
茉莉	葉蟬類	0.67-1.67 公升	1,500	害蟬發生時開 始施藥。	7			7		
蔥 韭	葉蟬類	0.67-1 公 升	1,500	害蟬發生時開 始施藥。	7	共 2 次		4		本項新 增。
蒜	葉蟬類	0.67-1 公 升	1,500	害蟬發生時開 始施藥。	7	共 2 次		4	適用於 蒜葉。	本項新 增。
珠蔥	葉蟬類	0.67-1 公 升	1,500	害蟬發生時開 始施藥。	7	共 2 次		4	適用於 珠蔥 葉。	本項新 增。
落萵	葉蟬類	0.67-1 公 升	1,500	害蟬發生時開 始施藥。	7	共 2 次		4	適用於 落萵 葉。	本項新 增。

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435H號



主旨：公告修正「芬普蟎」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳駱季

「芬普蟎」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435H 號公告修正

5(%) (w/w) 芬普蟎 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
大豆	細蟎類	0.3-0.8 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			21	適用於乾豆。	
馬鈴薯	葉蟎類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	7			9	避免與石灰硫磺合劑混合使用。	
茄科果菜類	葉蟎類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥。	7			9	避免與石灰硫磺合劑混合使用。	
茄科果菜類	細蟎類	0.3-1.0 公升	2,000	新芽有輕微危害狀時開始施藥。	7			9		
辣椒	細蟎類	0.5 公升	2,000	新芽輕微危害狀時開始施藥。	7			9		
<u>冬瓜</u> <u>南瓜</u> <u>扁蒲</u> <u>夏南瓜</u> <u>隼人瓜</u> <u>絲瓜</u> <u>越瓜</u> <u>胡瓜</u> <u>苦瓜</u> <u>木鼈果</u>	細蟎類	0.4-1.0 公升	2,000	新芽有輕微危害狀時開始施藥。	7			7	避免與石灰硫磺劑混合使用。	本項修正。
瓜果類	細蟎類	0.4-1.0 公升	2,000	新芽有輕微危害狀時開始施藥。	7			7	避免與石灰硫磺劑混合使用。	
番荔枝	葉蟎類	0.35-0.75 公	2,000	葉蟎發生初期開始	7	最多 2 次		30		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		升		施藥。						
百香果	葉蟬類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟬發生 初期施藥 1 次。				14		
榴槤蜜 菠蘿蜜	蟬蟬類	1~1.5 公升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			14		本 項 修 正。
草莓	葉蟬類	0.8-2.0 公升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			3	避免與石灰 硫磺合劑混 合使用。	
草莓	二點葉 蟬	1 公升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			3		
葡萄	蟬蟬類	0.75-3 公升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			14		
楊桃	蟬蟬類	0.8-1.6 公升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			14		
番石榴	蟬蟬類	0.75-3 公升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			14		
桑科小 漿果類	蟬蟬類	1~1.5 公升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			14		
檬果	葉蟬類	0.6-0.9 公升	2,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7	2	均勻噴 施 全 株。	6		
薔薇科 梨果類	蟬蟬類	0.9-2.5 公升	1,000	害蟬發生 時開始施 藥。	7			14		
柑桔類	柑桔葉 蟬	1 公升	2,000					15		
柑桔類	銹蟬類	2 公升	1,000	害蟬發生 時施藥 1 次。				21		
花木	葉蟬類	0.6-2.5	1,000	害蟬發生	7	最多 2			1. 限觀賞	


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升		時開始施藥。		次			花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 2. 避免於開花期使用，以免發生藥害。	
花木	二點葉蟬	0.5 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	葉蟬類	0.2-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			12		
玫瑰	葉蟬類	0.5-1.3 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			15		
茉莉	葉蟬類	1.0-2.5 公升	1,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
茶	葉蟬類	0.5 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。				12		
<u>蔥</u>	葉蟬類	<u>1-1.5 公</u>	<u>1,000</u>	<u>害蟬發生</u>	<u>7</u>	<u>共 2 次</u>		<u>6</u>		本項新增。
<u>韭</u>		<u>升</u>		<u>時開始施藥。</u>						
<u>蒜</u>	葉蟬類	<u>1-1.5 公</u>	<u>1,000</u>	<u>害蟬發生</u>	<u>7</u>	<u>共 2 次</u>		<u>6</u>	<u>適用於蒜</u>	本項新增。
		<u>升</u>		<u>時開始施藥。</u>					<u>葉。</u>	
<u>珠蔥</u>	葉蟬類	<u>1-1.5 公</u>	<u>1,000</u>	<u>害蟬發生</u>	<u>7</u>	<u>共 2 次</u>		<u>6</u>	<u>適用於珠蔥</u>	本項新

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		<u>升</u>		<u>時開始施</u> <u>藥。</u>					<u>葉。</u>	增。
<u>落 蓯</u>	<u>葉蟬類</u>	<u>1-1.5 公</u> <u>升</u>	<u>1,000</u>	<u>害蟬發生</u> <u>時開始施</u> <u>藥。</u>	<u>7</u>	<u>共 2 次</u>		<u>6</u>	<u>適用於落蓯</u> <u>葉。</u>	本項新 增。

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435I號



主旨：公告修正「可尼丁」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳啟季

「可尼丁」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435I 號公告修正

0.5(%) (w/w) 可尼丁 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	稻蟲類	本田： 40-60 公斤/公頃		害蟲發生時開始施藥。	7				本田使用： 有施藥時稻田需保持水位約 1 公分。	
水稻	稻蟲類	育苗箱：50 公克/公頃		插秧前 24 小時。			育苗箱使用：將藥劑均勻撒布於育苗箱，並灑水至飽和狀態。			
水稻	水象鼻蟲	50 公克		插秧前 24 小時。					1. 插秧前 24 小時，將藥劑均勻撒布於育苗箱，並灑水至飽和狀態。 2. 限育苗箱使用。	
豆科乾豆類	粉蟲類	60 公斤		種植後 21 天畦上施藥 1 次。施藥後全園灌水至畦面濕潤。						
豆科乾	潛蠅類	60 公斤		定植後於						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆類				畦上施藥 1 次，施藥 後全園灌 水至畦面 濕潤。						
十字花 科包葉 菜類	斑潛蠅 類	60 公斤		定植後 14 天畦面施 藥 1 次。				15	施藥後全園 灌水至畦面 濕潤。	
菊科包 葉菜類	斑潛蠅 類	60 公斤		定植後 14 天畦面施 藥一次。				15		
結球萵 苣	番茄斑 潛蠅	60 公斤		定植後 14 天畦上施 藥。				12		
蕹菜	斑潛蠅 類	60 公斤						15	1. 小葉菜 類播種 前畦面 施藥一 次。 2. 施藥後 全園灌 水至畦 面濕 潤。 3. 小葉菜 類採收 前 9 天 (設施 栽培 15 天) 停止施 藥。	
甘藷	斑潛蠅 類	60 公斤						15	1. 小葉菜 類播種 前畦面 施藥一 次。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									2. 施藥後全園灌水至畦面濕潤。 3. 小葉菜類採收前9天（設施栽培15天）停止施藥。 4. 限用於葉用甘藷。	
豌豆	粉蝨類	60 公斤		種植後 21 天畦上施藥 1 次。施藥後全園灌水至畦面濕潤。					適用於葉用豌豆。	
豌豆	潛蠅類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次，施藥後全園灌水至畦面濕潤。					適用於葉用豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	斑潛蠅 類	60 公斤		播種前畦面施藥 1 次。				15	1. 施藥後全園灌水至畦面濕潤。 2. 小葉菜類採收前9天（設施	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									栽 培 15 天) 停止施 藥。	
菊科小 葉菜類	斑潛蠅 類	60 公斤		播種前畦 面施藥 1 次。				15	1. 施藥後 全園灌 水至畦 面濕 潤。 2. 小葉菜 類採收 前 9 天 (設施 栽 培 15 天) 停止施 藥。	
芹菜	斑潛蠅 類	60 公斤						15	1. 小葉菜 類播種 前畦面 施藥一 次。 2. 施藥後 全園灌 水至畦 面濕 潤。 3. 小葉菜 類採收 前 9 天 (設施 栽 培 15 天) 停止施 藥。	
菠菜	斑潛蠅 類	60 公斤						15	1. 小葉菜 類播種	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									前畦面 施藥一 次。 2. 施藥後 全園灌 水至畦 面濕 潤。 3. 小葉菜 類採收 前9天 (設施 栽培 15天) 停止施 藥。	
竹	蚜蟲類	9 公斤/ 分地		害蟲發生 初期施藥 1 次。			施藥前 要先把 基部落 葉剷除， 施藥後 應灌水 或澆水 至土壤 溼潤。	3		
豆薯	粉蝨類	60 公斤		種植後 21 天畦上施 藥 1 次。施 藥後全園 灌水至畦 面濕潤。						
豆薯	潛蠅類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次，施藥 後全園灌 水至畦面 濕潤。						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
狗尾草	粉蝨類	60 公斤		種植後 21 天畦上施 藥 1 次。施 藥後全園 灌水至畦 面濕潤。						
狗尾草	潛蠅類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次，施藥 後全園灌 水至畦面 濕潤。						
闊葉大 豆	粉蝨類	60 公斤		種植後 21 天畦上施 藥 1 次。施 藥後全園 灌水至畦 面濕潤。						
闊葉大 豆	潛蠅類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次，施藥 後全園灌 水至畦面 濕潤。						
茄科果 菜類	粉蝨類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次。						
瓜菜類	粉蝨類	25-30 公斤		定植前 3 日施藥於 植穴上。			每穴用 藥量 1 公 克。		限植穴使 用。	
胡瓜	銀葉粉 蝨	1 公克/ 每穴		定植前 3 日施藥於 植穴。					限植穴使 用。	
豆菜類	粉蝨類	60 公斤		種植後 21 天畦上施 藥 1 次。施 藥後全園						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				灌水至畦面濕潤。						
豆科豆 菜類	潛蠅類	60 公斤		定植後於畦上施藥 1 次，施藥後全園灌水至畦面濕潤。						
大豆	銀葉粉 蝨	60 公斤		播種後 21 天畦上施藥。				6	限毛豆使用。	
瓜果類	粉蝨類	25-30 公斤		定植前 3 日施藥於植穴上。			每穴用藥量 1 公克。		限植穴使用。	
香蕉	象鼻蟲 類	81-90 公斤(45 公克/株)		苗期施藥一次，將藥劑均勻施用於莖基周圍 15 公分處，覆土後灌水，保持適當濕度。					依使用方法用藥，無需訂定安全採收期。	
花木	粉蝨類	60 公斤		定植前 3 天畦上施藥 1 次					1. 限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 2. 施藥後全園灌水至畦面濕潤。	
菊	斑潛蠅	60 公斤		定植後 14			施藥後	9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
	類			天畦面施 藥 1 次。			全園灌 水至畦 面溼潤。			
茶	蟻蝽害 蟲	24 公斤 (2 公克/ 株茶苗)		苗期施用， 刨除表土 10 公分 後，均勻撒 施並覆土， 施用後澆 水至土壤 濕潤。					依使用方法 用藥，無需 訂定安全採 收期。	
黃耆	粉蝨類	60 公斤		種植後 21 天畦上施 藥 1 次。施 藥後全園 灌水至畦 面濕潤。						
黃耆	潛蠅類	60 公斤		定植後於 畦上施藥 1 次，施藥 後全園灌 水至畦面 濕潤。						

16(%) (w/w) 可尼丁 水溶性粒劑 (SG)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
水稻	稻蝨類	0.4 公 斤	3,000					10	田間褐飛蝨 密度每樣平 均 5 隻左右 施藥一次， 其後如密度 升高至每樣 20 隻以上 時，行第二 次施藥。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	粉蝨類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		21		
茶	葉蟬類	0.25 - 0.75 公 斤	4,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	避免於開花 期使用。適 用於茶籽。	
茶	薊馬類	0.3-1 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	避免於開花 期使用。適 用於茶籽。	
油茶	葉蟬類	0.25 - 0.75 公 斤	4,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	避免於開花 期使用。適 用於油茶 籽。	
油茶	薊馬類	0.3-1 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	避免於開花 期使用。適 用於油茶 籽。	
十字花 科包葉 菜類	蚜蟲類	0.2-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
菊科包 葉菜類	蚜蟲類	0.06- 0.25 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15		
蕹菜	蚜蟲類	0.06- 0.25 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停 止施藥。	
甘藷	蚜蟲類	0.06- 0.25 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停 止施藥，限 用於葉用甘 藷。	
豌豆	粉蝨類	0.2-0.5	3,000	害蟲發生	7	最多		9	適用於葉用	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公斤		時開始施藥。		2 次			豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	蚜蟲類	0.2-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
菊科小 葉菜類	蚜蟲類	0.06- 0.25 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	採收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停 止施藥。	
芹菜	蚜蟲類	0.06- 0.25 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停 止施藥。	
羅勒	蚜蟲類	0.06- 0.25 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停 止施藥。	
菠菜	蚜蟲類	0.06- 0.25 公 斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			15	小葉菜類採 收前 9 天 (設施栽培 15 天) 停 止施藥。	
豆薯	粉蟲類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		21		
狗尾草	粉蟲類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		21		
闊葉大 豆	粉蟲類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		21		
茄科果 菜類	粉蟲類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
瓜菜類	粉蟲類	0.4-0.6	3,000	害蟲發生	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公斤		時開始施 藥。						
豆菜類	粉蝨類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		6		
瓜果類	粉蝨類	0.4-0.6 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
瓜果類	銀葉粉 蝨	0.4-0.6 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
黃金果	粉介殼 蟲類	0.6-1.3 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
香蕉	薊馬類	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
木瓜	薊馬類	0.2-0.7 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
番荔枝	粉介殼 蟲類	0.5-0.7 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
百香果	薊馬類	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
紅毛丹	薊馬類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
榴槤蜜	粉介殼 蟲類	0.7-1.3 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
草莓	薊馬類	0.2-0.5 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
蓮霧	腹鉤薊 馬	0.5-1.0 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施				21		


作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
椪果	葉蟬類	0.3-0.5 公斤	4,000	抽穗及開 花期害蟲 發生時開 始施藥。	7			6		
椪果	薊馬類	0.3-0.7 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
薔薇科 梨果類	薊馬類	0.2-0.83 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
梨	梨木蝨	0.6-0.8 公斤	2,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
鼠李科 梨果類	薊馬類	0.2-0.83 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
柿	薊馬類	0.2-0.83 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			9		
花木	粉蝨類	0.2-0.4 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	蚜蟲類	0.1-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
臺灣欒 樹	椿象類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				避免於開花 期使用。	
臺灣欒 樹	薊馬類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7				避免於開花 期使用。	
山茶	葉蟬類	0.25 - 0.75 公 斤	4,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施	7			21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
山茶	薊馬類	0.3-1 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
茶	葉蟬類	0.25 - 0.75 公 斤	4,000	發芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	避免於開花 期使用。	
茶	小綠葉 蟬	0.25 公 斤	4,000	萌芽初期 害蟲發生 時開始施 藥。				21		
茶	薊馬類	0.3-1 公 斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21	避免於開花 期使用。	
黃耆	粉蟲類	0.2-0.5 公斤	3,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7	最多 2 次		21		
風茹	蚜蟲類	0.1-0.3 公斤	4,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
咖啡	粉介殼 蟲類	0.5-0.7 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 2 次		28	避免於開花 期使用。	
可可	粉介殼 蟲類	0.5-0.7 公斤	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7	連續 2 次		28	避免於開花 期使用。	本項新 增。

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國113年11月26日
發文字號：農授防字第1131878435J號



主旨：公告修正「賜派減」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

部長 陳啟季

「賜派滅」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435J 號公告修正

150 g/L (15% w/v) 賜派滅 水分散性油懸劑 (OD)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	粉蝨類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
豆科乾 豆類	薊馬類	0.24- 0.42 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
十字花 科乾豆 類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			28		
菊科乾 豆類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			28		
胡麻	粉蝨類	0.4-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			28		
十字花 科包葉 菜類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
菊科包 葉菜類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
旋花科 小葉菜 類	粉蝨類	0.2-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
豆科小 葉菜類	粉蝨類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
豆科小 葉菜類	薊馬類	0.24- 0.42 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
十字花 科小葉 菜類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
菊科小 葉菜類	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
茄科小 葉菜類	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
葫蘆科 小葉菜 類	粉蝨類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
菠菜	粉蝨類	0.2-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
甘藷	粉蝨類	0.2-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆薯	粉蝨類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆薯	薊馬類	0.24- 0.42 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
狗尾草	粉蝨類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
狗尾草	薊馬類	0.24- 0.42 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
闊葉大 豆	粉蝨類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
闊葉大 豆	薊馬類	0.24- 0.42 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蘿蔔	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蕪菁	粉蝨類	0.2-0.7	1,500	害蟲發生	7			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		時開始施 藥。						
山葵	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
牛蒡	粉蝨類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
馬鈴薯	粉蝨類	0.3-1 公 升	1500	害蟲發生 時開始施 藥	7			14		
茄科果 菜類	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
秋葵	粉蝨類	0.3-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
瓜菜類	粉蝨類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
豆菜類	粉蝨類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
豆菜類	薊馬類	0.24- 0.42 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
瓜果類	粉蝨類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時。	7			7		
黃金果	粉介殼 蟲類	0.36- 0.78 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
香蕉	粉介殼 蟲類	0.12- 0.36 公 升	2,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
木瓜	粉介殼 蟲類	0.2-0.8 公升	2,500	害蟲發生 時開始施	7			10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
鳳梨	粉介殼 蟲類	0.42- 0.78 公 升	2,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
番荔枝	粉介殼 蟲類	0.3-0.42 公升	2,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
酪梨	粉介殼 蟲類	0.42- 0.78 公 升	2,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
紅龍果	粉介殼 蟲類	0.3-0.66 公升	2,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
百香果	粉蟲類	0.3-0.6 公升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
榴槤蜜	粉介殼 蟲類	0.42- 0.78 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
葡萄	小黃薊 馬	0.3-0.42 公升	2,500	花穗形成 至幼果期 前。					1. 花穗形 成至幼 果 期 前，均 勻施藥 一次， 隔 7 天 再施藥 一次， 共 2 次。 2. 採收前 14 天 (設施	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									栽 培 20 天) 停止施 藥。	
楊桃	薊馬類	0.3-0.66 公升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蓮霧	薊馬類	0.42-1.2 公升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
番石榴	薊馬類	0.48- 0.78 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
檬果	粉介殼 蟲類	0.36- 0.78 公 升	2,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
梨	薊馬類	0.42- 0.78 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	於幼果期施 用時，避免 提高劑量。	
蘋果	薊馬類	0.36- 0.48 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
梅	薊馬類	0.48- 0.72 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	於幼果期施 用時，避免 提高劑量。	
李	薊馬類	0.42- 0.78 公 升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	於幼果期施 用時，避免 提高劑量。	
枇杷	薊馬類	0.6-0.78 公升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	於幼果期施 用時，避免 提高劑量。	
鼠李科 梨果類	粉介殼 蟲類	0.67 公 升	3,000	開花前至 幼果期， 全株均勻 施藥 1 次。				6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
鼠李科 梨果類	薊馬類	0.3-0.48 公升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
柿	薊馬類	0.42-0.6 公升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	避免與其他 農藥混合使 用。	
柑桔類	介殼蟲 類	0.64 公 升	3,000	於若蟲發 生初期施 藥 1 次。			採全株 噴灑。	7	開花期避免 使用	
柑桔類	盾介殼 蟲類	0.67 公 升	3,000	害蟲發生 開始時施 藥 1 次。				7		
菊	粉蟲類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
洋甘菊	粉蟲類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
茶	柑桔刺 粉蟲	0.33 公 升	3,000	若蟲發生 初期施 藥。				21		
茶	薊馬類	0.42-1.2 公升	2,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
黃耆	粉蟲類	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
風茹	粉蟲類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
艾草	粉蟲類	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
檳榔	椰子綴 蛾	1 公升	1000	檳榔花苞 形成初期 開始施 藥。	7	共 3 次		60	施藥時請注 意人員安全 防護。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番石榴	粉介殼蟲類	0.4-1.2公升	2,500	害蟲發生初期施藥1次。				14		本項新增。

100 g/L (10% w/v) 賜派滅 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	粉蝨類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
豆科乾豆類	薊馬類	0.4-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
十字花科乾豆類	粉蝨類	0.3-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			28		
菊科乾豆類	粉蝨類	0.3-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			28		
胡麻	粉蝨類	0.6-1.2公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			28		
十字花科包葉菜類	粉蝨類	0.3-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
菊科包葉菜類	粉蝨類	0.3-1公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
旋花科小葉菜類	粉蝨類	0.3-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
豆科小葉菜類	粉蝨類	0.5-0.8公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
豆科小	薊馬類	0.4-0.7	1,500	害蟲發生	7			7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
葉菜類		公升		時開始施 藥。						
十字花 科小葉 菜類	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
菊科小 葉菜類	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
茄科小 葉菜類	粉蝨類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
葫蘆科 小葉菜 類	粉蝨類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
菠菜	粉蝨類	0.3-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
甘藷	粉蝨類	0.3-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆薯	粉蝨類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
豆薯	薊馬類	0.4-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
狗尾草	粉蝨類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
狗尾草	薊馬類	0.4-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
闊葉大 豆	粉蝨類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
闊葉大 豆	薊馬類	0.4-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施	7			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。						
蘿蔔	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蕪菁	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
山葵	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
牛蒡	粉蝨類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
馬鈴薯	粉蝨類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
茄科果 菜類	粉蝨類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
番茄	粉蝨類	0.9 公 升	1,000	害蟲發生 時噴施 1 次。				7		
秋葵	粉蝨類	0.4-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
瓜菜類	粉蝨類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
豆菜類	粉蝨類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
豆菜類	薊馬類	0.4-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		
瓜果類	粉蝨類	0.8-2 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
黃金果	粉介殼 蟲類	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
香蕉	粉介殼 蟲類	0.2-0.6 公升	1,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
木瓜	粉介殼 蟲類	0.3-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
鳳梨	粉介殼 蟲類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
番荔枝	粉介殼 蟲類	0.5-0.7 公升	1,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
酪梨	粉介殼 蟲類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
紅龍果	粉介殼 蟲類	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
百香果	粉蟲類	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
榴槤蜜	粉介殼 蟲類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			10		
葡萄	小黃薊 馬	0.5-0.7 公升	1,500	花穗形成 至幼果期 前。					1. 花穗形 成至幼 果 期 前，均 勻施藥	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									一次， 隔 7 天 再施藥 一次， 共 2 次。 2. 採收前 14 天 (設施 栽培 20 天) 停止施 藥。	
楊桃	薊馬類	0.5-1.1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
蓮霧	薊馬類	0.7-2 公 升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
番石榴	薊馬類	0.8-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14		
檬果	粉介殼 蟲類	0.6-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時全株均 勻施藥 1 次。				10		
梨	薊馬類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	於幼果期施 用時，避免 提高劑量。	
蘋果	薊馬類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6		
梅	薊馬類	0.8-1.2 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			6	於幼果期施 用時，避免 提高劑量。	
李	薊馬類	0.7-1.3 公升	1,500	害蟲發生 時開始施	7			6	於幼果期施 用時，避免	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。					提高劑量。	
枇杷	薊馬類	1-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6	於幼果期施用時，避免提高劑量。	
鼠李科梨果類	粉介殼蟲類	1 公升	2,000	開花前至幼果期，全株均勻施藥 1 次。				6		
鼠李科梨果類	薊馬類	0.5-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
柿	薊馬類	0.7-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			6	避免與其他農藥混合使用。	
柑桔類	介殼蟲類	0.96 公升	2,000	於若蟲發生初期施藥 1 次。			採全株噴灑。	7	開花期避免使用。	
柑桔類	盾介殼蟲類	1.01 公升	2,000	害蟲發生開始時施藥 1 次。				7		
菊	粉蟲類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
洋甘菊	粉蟲類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
茶	柑桔刺粉蟲	0.5 公升	2,000	若蟲發生初期施藥。				21		
茶	薊馬類	0.7-2 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
黃耆	粉蟲類	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			21		
風茹	粉蟲類	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生	7			21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		升		時開始施 藥。						
艾草	粉蟲類	0.3-1 公 升	1,000	害蟲發生 時開始施 藥。	7			21		
咖啡	粉介殼	0.5-0.7	1,500	害蟲發生	7	連續		14		本項新 增。
可可	蟲類	公升		時開始施 藥。		2 次				
番石榴	粉介殼	0.7-2.0	1,500	害蟲發生				14		本 項 新 增。
	蟲類	公升		初期施藥 1 次。						