

水稻秋行軍蟲緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

| 藥劑名稱 | 每公頃 每次施 藥量 | 稀釋 倍數 | 施藥時期及方法 | 注意事項 |
|--|------------------|----------|---|---------------|
| 18.4% 剋安勃 SC (chlorantraniliprole) | 0.5 毫升/ 每育苗箱 | 1,000 | 插秧前 24 小時，將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱，每育苗箱稀釋水量 500 毫升。 | 限育苗箱使用。 |
| 5% 護賽寧 SL (flucythrinate) | 1 公升 | 800 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7-10 天施藥一次。 | 採收前 15 天停止施藥。 |
| 10% 依芬寧 EC (etofenprox) | 1.6 公升 | 750 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。 | 採收前 15 天停止施藥。 |
| 20% 依芬寧 WP (etofenprox) | 0.67 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。 | 採收前 15 天停止施藥。 |
| 48.1% (35,000 DBMU/MG) 蘇力菌 WG | 0.8-1 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | |
| 54% (15,000 IU/MG) 鮎澤蘇力菌 NB-200 WG | 0.8-1 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。 | |