

臺灣鳳梨品種建議生產月份及安全用藥(圖卡)

季節 品種	冬季			春季			夏季			秋季		
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
台農13號	█									█		
台農17號				█								
台農20號						█						
台農22號						█			█			
開英種						█						
最高氣溫(°C)	28.2	22.1	24.8	27.8	30.5	32.3	33.1	32.6	21.6	29.8	27.1	23.9
最低氣溫(°C)	19.4	12.5	13.8	15.9	19.2	22.1	24.3	25.2	24.9	23.7	20.9	17.3

備註：催花日期應依預計生產月份，往前推算6個月，並參考當地季節特性與催花栽培紀錄，調整催花時間。

粉介殼蟲



寄生於鳳梨葉片基部、果實果目間、芽體及根部等隱密處。蟲體刺吸汁液，可傳播萎凋病，使鳳梨植株衰弱及果實發育不良，嚴重危害可致使植株萎凋枯死。

藥劑	日本	大陸
三落松	█	█
大利松	█	█
加保扶	█	█
亞滅培	█	█
芬殺松	█	█
達特南	█	█
撲滅松	█	█
賜派滅	█	█

心腐病



由疫病菌感染所引起，造成植株心部呈白色乳狀軟腐，心葉易被拔起，在病部和健部交界處有深褐色暈環。病株成為無心鳳梨，不久即死亡。

藥劑	日本	大陸
三元硫酸銅	█	█
氟比拔克	█	█
純白鏈黴菌素	█	█
福賽得	█	█
蓋普丹	█	█

- █ 對方殘留容許量規定較我國嚴格，請謹慎使用
- █ 對方殘留容許量規定較我國略為嚴格，請特別注意安全採收期
- █ 對方未定殘留容許量，請特別注意安全採收期
- █ 對方殘留容許量規定與我國相同或較寬鬆，請遵守規定之安全採收期