

龍眼

龍眼椿象類

防治(除)方法：

藥劑名稱	作用機制代碼	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20% 亞滅培 水溶性粉劑 (acetamiprid)	IRAC 4A	0.2-0.4 公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.採收前 7 天停止施藥。 2.避免苗期使用。 3.延伸使用藥劑。
40% 丁基加保扶 可溼性粉劑 (carbosulfan)	IRAC 1A	0.5-1.3 公斤	1,200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.採收前 21 天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。
25% 丁基加保扶 可溼性粉劑 (carbosulfan)	IRAC 1A	0.8-2 公斤	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.採收前 21 天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。
48.34% 丁基加保扶 水基乳劑 (carbosulfan)	IRAC 1A	0.6-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.採收前 21 天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。
48.34% 丁基加保扶 乳劑 (carbosulfan)	IRAC 1A	0.6-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。	1.採收前 21 天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。

藥劑名稱	作用機制代碼	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5% 賽洛寧 微乳劑(lambda-cyhalothrin)	IRAC 3A	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。
2.8% 賽洛寧 水懸劑(lambda-cyhalothrin)	IRAC 3A	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。
2.8% 賽洛寧 乳劑(lambda-cyhalothrin)	IRAC 3A	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。
5% 賽洛寧 水分散性粒劑(lambda-cyhalothrin)	IRAC 3A	0.2-0.4 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。
1% 賽洛寧 可溼性粉劑(lambda-cyhalothrin)	IRAC 3A	0.9-2.1 公斤	700	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止用藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。
2.46% 賽洛寧 膠囊懸著劑(lambda-cyhalothrin)	IRAC 3A	0.3-0.8 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免於開花期使用。 3.延伸使用藥劑。