

## 「平速爛」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 3 月 16 日農授防字第 1111488433A 號公告修正

### 0.12 (%) (w/w) 平速爛 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	30 公斤		田面雜草 2-3 葉時。					防除移植本田雜草。防除對象：鴨舌草、球花蒿草、水丁香、螢蘭、稗草。	

### 2.7 (%) (w/w) 平速爛 水分散性油懸劑 (OD)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	1 公升	1,000 公升	田間雜草長至 2-4 葉時。					防除移植本田雜草。	
水稻	雜草	1 公升	加水稀釋至 20 公升				1. 適用於無人飛行載具，藥滴體積中值粒徑 (VMD, Volume Media Diameter) 應大於 145 微米。 2. 田間雜		1. 防除移植本田雜草。 2. 風速大於每秒 3 公尺時，請勿噴施。 3. 為防制飄散並避免鄰田污染應設置適當緩衝區。 4. 操作者應	本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							<u>草長至2-4葉時,均勻噴施於雜草植株上。</u>		5. <u>站於上風處,並保持適當操作距離。</u> <u>無人飛行載具飛行參數請參閱防檢局農藥資訊服務相關網站。</u>	