武漢肺炎 564 死》傳染途徑、預防措施看這裡

自由時報

中國武漢 2019 新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例持續攀升，並已造成逾 500 人死亡。為讓民眾更加了解此病毒，本報整理懶人包資訊。（本報合成）

2020-02-06 07:50:00

首次上稿 01/22 13:59
更新時間 02/06 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢 2019 新型冠狀病毒（2019-nCov）肺炎確診病例持續攀升，已經造成 564 人死亡，世界衛生組織（WHO）宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），國內日前已成立嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮

中心，為讓民眾更加了解此病毒特性、感染途徑與預防措施，本報整理懶人包資訊如下：

武漢肺炎是如何發生的？

去年 12 月 31 日，網路流傳中國武漢出現多起不明肺炎案例，隨後中國證實是一種新型冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）將之暫時命名為「2019 新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。

我國利用中國公布的基因序列比對發現，與蝙蝠冠狀病毒相似度高達 87.6%，代表病毒可能來自蝙蝠，與同為冠狀病毒家族的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）相似度也分別有 79%與 52.5%。

武漢肺炎如何傳染？

目前對 2019 新型冠狀病毒的完整傳播途徑，尚未完全瞭解。當 2019 年 12 月武漢不明原因肺炎疫情發生時，案例多數曾至有賣野味的華南海鮮市場活動，此市場的環境檢體雖檢出 2019 新型冠狀病毒，但感染源仍無法釐清。除此，從發病個案的流行病學資訊來看，亦有家庭群聚與醫護人員感染的個案報告，因此高度懷疑可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液而增加人傳人之感染風險。

感染武漢肺炎有何症狀？會很嚴重嗎？

根據中國衛生部門公布資料，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難。嚴重時可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。依據目前的流行病學資訊，患者大多數能康復，但也有死亡病例，死亡個案多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。

武漢肺炎如何有傳播風險？

世界衛生組織一開始認為可能是動物感染源，後來也認定「有限度人傳人」，指近距離、通常一公尺內，然後接觸約十幾分鐘而感染，往往是同在一個家戶或醫護人員照顧病人較可能發生傳染，但隨著中國

武漢以外的省市、其他國家陸續發生病例，且不少病例並無發生群聚感染的華南海鮮市場暴露史，世衛已確認為「持續性人傳人」。

如何預防武漢肺炎？

目前未有疫苗可用來預防冠狀病毒感染。預防措施與其他呼吸道感染相同，包括勤洗手、配戴外科口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，且避免接觸野生動物與禽類。

搭乘交通工具要擔心被傳染嗎？

前往 2019 新型冠狀病毒感染流行區或在當地搭乘大眾交通工具時，預防措施建議與預防呼吸道感染相同，包括配戴外科口罩、勤洗手等。

目前對於武漢肺炎，台灣政府有做什麼防疫工作嗎？

已成立嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，因應疫情，6 日宣布，居住中國各省市的中國人全面暫緩入境，台灣人有中港澳旅遊史或港澳人士入境須居家檢疫或自主健康管理 14 天，外籍人士則是 14 天內曾入境或居住中港澳一律禁止入境。

原本我國是禁止湖北、廣東、浙江省居民來台，中國其他省分民眾暫緩來台，但投資經營管理、商務活動交流（履約活動、跨國企業內部調動）等可除外，如今則是全面暫緩來台。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國 14 天內如出現上述疑似症狀，可撥打防疫專線 1922 依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）。民眾於疫調時如果未據實回答，或居家隔離時未遵守隔離規定，可處 6 萬元到 30 萬元罰鍰；如果未遵循防疫指示傳染他人，須負刑責，得處 3 年以下有期徒刑。

中國武漢肺炎疫情造成搶購口罩，民眾抱怨買不到口罩，行政院長蘇貞昌 3 日拍板決定，6 日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡，在全國 6 千多家健保特約藥局購買，每個人在 7 天內限購 2 片，一片降價為 5 元。

此外，首班搭載中國武漢台商及眷屬 247 人的返台專機 3 日接近午夜抵達桃園機場，中央流行疫情指揮中心大陣仗出動超過百名工作人員

執行旅客檢疫及消毒，於 4 日凌晨 3 點完成入境檢疫程序，分送至北中等地隔離檢疫點集中檢疫，新增 1 例武漢回台台商確診，全台累計已有 11 例。

被告知是武漢肺炎病人接觸者，現在有呼吸道症狀怎麼辦？

疾病管制署建議，應立即佩戴外科口罩，主動與縣市衛生局聯繫，或立即撥打 1922 防疫專線協助，並依指示盡速就醫，並主動告知旅遊史。

面對武漢肺炎如何消毒？

疾病管制署建議，一般的環境，如家具、廚房，可以用 1：100 的稀釋漂白水（500 ppm）來消毒。浴室或馬桶表面則應使用 1：10 的稀釋漂白水（5000 ppm）消毒，每天一次。

2019 新型冠狀病毒的潛伏期是多久？

潛伏期是從暴露病毒至可能發病的這段觀察時間，依據世界衛生組織與中國官方資訊，2019 新型冠狀病毒感染之潛伏期為 2 至 12 天（平均 7 天），但若曾前往流行地區或曾接觸疑似 2019 新型冠狀病毒感染之病人，目前仍維持需健康監測 14 天。