

高雄市立民生醫院藥劑科用藥指導單④

英文品名	中文品名
Aminophylline (Aminophylline®) 100 mg	胺非林錠
Theophylline anhydrous (Euphylline Retard®) 250 mg	歐福林持續性藥效錠
Theophylline (Xanthium®) 400 mg	善寧持續性藥效膠囊

作用：是一種支氣管擴張劑，可鬆弛支氣管平滑肌，使通道呼吸順暢，用於治療氣喘、支氣管炎

用藥方式：

1. 因歐福林錠與善寧膠囊，皆是持續性長效藥，不宜磨碎或嚼碎
2. 依醫師指示服藥，吃藥時間要有規律，不要自行停藥或增減劑量
3. 飯後服用並服大量開水可減少胃刺激

用藥注意事項：

1. 目前正服用高蛋白、低糖類飲食，則會增加本藥代謝，而使藥效降低
2. 曾有高血壓、肝腎疾病、癲癇、胃及十二指腸潰瘍、甲狀腺異常及青光眼情形發生，則在服用本藥之前先告知醫師
3. 停止喝酒及抽煙的習慣

4. 有並用下列藥品時，要先告知醫師：

Phenytoin、Carbamazepine、Erythromycin、Cimetidine、Rifampin、Isoniazide、
Phenobarbital

5. 避免在服藥後 2 小時內或在其服藥前 1 小時喝葡萄柚汁

6. 避免服用含咖啡因之食物，如巧克力、可可、茶等，因會增加中樞神經興奮

7. 避免經常食用燒烤之肉類，因會增加藥物的代謝，而降低藥效

此藥品可能引起副作用

心跳加速、噁心、嘔吐、胃部不適、坐立不安、緊張、頭痛及失眠，以上症狀仍持續，請告知醫師；另有發生顫抖、心悸、呼吸急速、肌肉抽攣時，請先停藥並立即就醫