

## 高雄市立民生醫院藥劑科支氣管擴張劑用藥指導單④

英文品名	中文品名
Aminophylline (Aminophyllin®) 100mg	氨基非林錠
Theophylline (Uniphyllin®) 400mg	優汝喘持續性藥效錠
Theophylline sodium glycinate 200mg (equ. to Theophylline 100mg) & Guaifenesin 100mg (Recalm®)	利咳安寧錠

作用：是一種支氣管擴張劑，可鬆弛支氣管平滑肌，使通道呼吸順暢，用於治療氣喘、支氣管炎。

### 用藥方式：

1. 因優汝喘錠是持續性長效藥，不宜磨碎或嚼碎。
2. 依醫師指示服藥，吃藥時間要有規律，不要自行停藥或增減劑量。
3. 飯後服用，併服大量開水可減少胃刺激。

## 用藥注意事項：

1. 目前正服用高蛋白、低糖類飲食，則會增加本藥代謝，而使藥效降低。
2. 曾有高血壓、肝腎疾病、癲癇、胃及十二指腸潰瘍、甲狀腺異常及青光眼情形發生，則在服用本藥之前先告知醫師。
3. 停止喝酒及抽煙的習慣。
4. 有並用下列藥品時，要先告知醫師：  
  
Phenytoin、Carbamazepine、Erythromycin、Cimetidine、Rifampin、Isoniazide、  
Phenobarbital
5. 避免在服藥後 2 小時內或在其服藥前 1 小時喝葡萄柚汁。
6. 避免服用含咖啡因之食物，如巧克力、可可、茶等，因會增加中樞神經興奮。
7. 避免經常食用燒烤之肉類，因會增加藥物的代謝，而降低藥效。

## 此藥品可能引起副作用

心跳加速、噁心、嘔吐、胃部不適、坐立不安、緊張、頭痛及失眠，以上症狀仍持續，請告知醫師；另有發生顫抖、心悸、呼吸急速、肌肉抽搐時，請先停藥並立即就醫。