

## 高雄市立民生醫院藥劑科胃潰瘍藥物用藥指導單 ⑫

英文品名	中文品名
H <sub>2</sub> -受體拮抗劑：	
Cimetidine ( Defense <sup>®</sup> ) 300mg	祛潰錠
Famotidine ( Gaster D <sup>®</sup> ) 20mg	蓋舒泰錠
Ranitidine( Quicran <sup>®</sup> ) 150mg	潰克定膜衣錠
Ranitidine ( RND F.C <sup>®</sup> ) 150mg	胃恩利錠
氫離子幫浦抑制劑(PPI)：	
Esomeprazole( Nexium <sup>®</sup> ) 40mg	耐適恩錠
Lansoprazole( Rich <sup>®</sup> ) 30mg	胃全膠囊
Lansoprazole( Takepron OD <sup>®</sup> ) 30mg	泰克胃通口溶錠
Pantoprazole( Panho <sup>®</sup> ) 40mg	盼胃好腸溶膜衣錠

作用：此類藥物可分為競爭性的抑制胃壁細胞組織胺接受器，及選擇性酸幫浦抑制劑之作用，皆有效抑制胃酸分泌，用於治療胃及十二指腸潰瘍、消化性潰瘍、逆流性食道炎、幽門螺旋桿菌感染等。

用藥方式：請遵照醫師指示服藥，若忘記服藥時，盡快補服，若已接近下次服藥時間，則不必補服，勿同時服用雙倍劑量。

## 用藥注意事項：

1. 請遵照醫囑，持續服藥至療程結束，勿自行停藥，並按時回診，以助醫師決定停藥時機。
2. 如果併用制酸劑，在服用 H<sub>2</sub> 受體拮抗劑 1~2 小時內不要服用制酸劑。
3. H<sub>2</sub> 受體拮抗劑會降低抗黴菌藥 ketoconazole、itraconazole、fluconazole 在胃中的吸收，而降低抗黴菌藥的藥效，所以若同時服用這兩類藥物時，應間隔 2 小時服藥。
4. 長期併用 Cimetidine 與口服抗凝血劑 warfarin，可能會增加出血的機率。
5. 懷孕或授乳的婦女用藥前，應告知醫師。
6. 若正服用其他藥物或有肝、腎方面的疾病，應告知醫師。
7. 抽煙或喝酒會刺激胃酸分泌，影響藥品療效，所以應避免。

## 此藥品可能引起副作用

腹瀉、便秘、頭痛、暈眩、噁心、疲倦、腸胃不適等，如症狀持續，請與醫師聯絡；若有過敏現象（皮膚疹、呼吸困難等）、臉部、手或喉嚨腫脹，發燒、喉嚨痛，意識改變、混淆，心跳不規則或變快等，請停藥，並立即就醫。