

## 高雄市立民生醫院藥劑科用藥指導單⑥

英文品名	中文品名
Isoniazid(INAH)(Inavita®) 100 mg	愛娜癆錠
Ethambutol(Epbutol®) 400 mg	易復癆錠
Rifampicin(RIF®) 300 mg ; 450 mg	瑞比新膠囊 立汎黴素膠囊
Pyrazinamide(Mide®) 500 mg	邁得
Rifampicin 120 mg & Isoniazid 80 mg & Pyrazinamide 250 mg(Rifater®)	衛肺特糖衣錠

### 作用：

1. 抗結核菌，通常需數種併用，以免結核菌產生抗藥性。由於這類藥品對於休止期狀態之結核菌無效，所以須長期給藥，療程由六個月至二年不等
2. Rifampicin 亦可用於治療奈瑟氏腦膜炎球菌

### 用藥方式：

1. 請遵照醫師指示服用，通常一天一次
2. 立汎黴素膠囊(RIF)和衛肺特糖衣錠(Rifater)應空腹服用；另孟表多錠和邁得(Mide®)可空腹服用，但若發生反胃時可與食物並用，以減輕症狀。

## 用藥注意事項

### \* 共同注意事項

1. 服用抗結核病藥需定期監測肝功能，服用 Isoniazid、Rifater 及 Eambutol 病患，亦定期追蹤視力
2. 不可因症狀改善而擅自停藥，以免感染復發
3. 若有以下情形，請在服藥前告知醫師：  
懷孕、曾發生藥物過敏、正服用其他藥物、你的病史，如肝、腎疾病、糖尿病或酒精中毒
4. 請務必按時複診及作相關檢查，以評估你對藥物之反應
5. 避免飲酒

藥品名	個別注意事項
愛娜癆錠(Inavita®)	1. 若同時在服用胃乳，請先服愛娜癆錠(Inavita®)，隔一小時再服用胃乳
易復癆錠(Eambutol®)	1. 每隔三至六個月需作眼睛檢查 2. 服用本藥 2 小時內，不可服用含鋁之制酸劑 3. 本藥可能引起視覺模糊，則避免從事危險工作
瑞比新、立汎黴素膠囊 (RIF®)	1. 遵醫囑按時服藥，因不規則服藥易引起血液及肝臟問題 2. 服用本藥有人會昏昏欲睡，則儘避免從事危險工作 3. 本藥會影響口服避孕藥之作用，則服本藥前先與醫師討論
邁得Pyrazinamide(Mide®)	服用本藥可能會影響尿液檢測

## 此藥品可能引起副作用

藥品名	副作用
愛娜癆錠(Inavita <sup>®</sup> )	皮膚發疹、疲勞、噁心嘔吐、皮膚眼睛發黃、尿液顏色變深、胃腸不適、視覺問題、手腳刺痛、緊繃感
易復癆錠(Epbutol <sup>®</sup> )	視覺變化(如模糊不清)、發疹發癢、關節痛、胃腸不適、呼吸困難、蕁麻疹，臉、喉嚨腫脹
瑞比新、立汎黴素膠囊(RIF <sup>®</sup> )	1. 蕁麻疹、皮膚或嘴巴腫痛潰爛、發燒、黃疸(皮膚眼睛發黃)、胃腸不適、心口灼熱、類流行性感冒症狀 2. 若尿液、糞便、唾液等體液呈現橙紅色，為正常現象，不必擔心
邁得Pyrazinamide(Mide <sup>®</sup> )	發燒、異常倦怠、食慾減退、關節痛或腫脹、皮膚發疹或發癢、皮膚眼睛發黃