

高雄市立民生醫院

糞便潛血定量檢查(EIA)採檢注意事項

1. 免疫法糞便潛血試驗所需之檢體為新鮮糞便，請依照免疫法糞便樣本採集說明書方法，已採檢棒碰觸穿刺採集 3-6 處不同部位的糞便檢體採檢。
2. 採檢棒上有螺旋狀溝紋，可達到定量採樣的目的，勿過量影響準確度。
3. 避免碰到馬桶水被汙染，請直接解便在空容器或報紙。
4. 避免夏季高溫影響準確性，請放室溫或 2~8°C 冰箱勿讓陽光直射。
5. 採便器內附有保存液，勿倒掉。
6. 請特別注意當有痔瘡出血、便秘導致肛門微量出血及女性月經期間，應暫停採便。

收件時間：週一至週六 上午 8:10~11:00；週一至週五 下午 1:40~4:20

(務必交給檢驗人員簽收時間)(國定假日不收件)

高雄市立民生醫院 檢驗科門診檢驗室 分機：2113

KMSH-LSO-115-07

免疫法糞便檢體採集步驟

1 請先在標籤上清楚寫上姓名等資料
SAMPLING BOTTLE
NAME _____
AGE _____ SEX _____
DATE _____ TIME _____
※請務必寫上採便的日期與時間

1. 旋轉瓶蓋
2. 向上拔開

※若糞便檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果

2 刮取量
刮取溝槽
如圖示在整條大便上以輕劃方式刮取檢體
刮取量約為將刮取溝槽完全覆蓋即可

3 插入後，將蓋子用力押緊
有“喀”一聲才有蓋緊
放入採便管專用塑膠袋交給收取檢體的人員
※插入後請不要再拔開
※保存在陰涼的場所

注意事項：

- 請先在標籤上寫上姓名、年齡以及採便日期。
- 請按照上圖所示方式採取檢體，採完後放入綠色塑膠袋中，交付前應存放於避光陰涼的場所。
- 請勿將管瓶中的液體倒出、或任意於瓶中加水。
- 大便過硬時可加水弄濕，待其軟化時再以採便棒刮取。若遇水便情形不易採樣時，請改日再取。
- 遇痔瘡出血或女性月經期間，請暫停採便檢體。
- 使用座式馬桶時，為避免大便掉入水中不易採樣，請往前坐或反坐。並在便器內斜面上先鋪上衛生紙以方便採集。

※請珍惜醫療資源！將採集完畢之容器交回指定醫療院所或衛生局、所。