

高雄市立民生醫院精索靜脈曲張手術說明書

訂定日期：96.11.14

修訂日期：102.5.10

修訂日期：106.3.21

修訂日期：113.9.21

(1/2 頁)

本文件會說明與您的手術相關的事項，希望您能仔細閱讀並了解。

親愛的患者您好，在開始說明前我們希望您能了解：任何醫療措施都有其不確定性（即使是很小的手術）。正因如此，我們十分期待您的主動參與，畢竟您的安全是我們最大目標。無論在何時（解說前、後）有任何疑問，都請您與醫師充分討論；我們也尊重您的個人考量及其他專家的意見，讓我們一起為您的健康努力。

手術內容：

- (1) 由於陰囊內精索靜脈的不正常曲張，引起腫脹不適。藉由手術方式切除曲張的靜脈，以導引靜脈血液回留至正常其他靜脈系統。
- (2) 手術採半身（較常見）或全身麻醉。

手術效益：經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師不能保證您獲得其中任何一項；且手術效益與風險性之間的取捨，應由您決定。

- (1) 避免靜脈曲張的不舒適感、緩解疼痛感、改善外觀。
- (2) 增進或保護睪丸製造精子的功能，降低男性不孕的機率。

手術風險：沒有任何手術是完全沒有風險的，以下所列的風險可能會發生，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。

- (1) 傷口出血、皮下組織血腫。
- (2) 傷口感染。
- (3) 傷口疼痛。
- (4) 陰囊血腫。
- (5) 手術一段時間之後靜脈曲張可能再復發。

替代方案：這個手術的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。

除手術方式屬於積極性治療外，其他消極性的治療如：藥物、姿勢工作的改變、休息、避免長期久站與腹部用力，只有暫時改善疼痛的作用。

手術後之後續治療：

- (1) 手術後應至少於門診追蹤7~10 天。
- (2) 若有傷口出血或形成血腫，請至門診或急診就醫。

承上頁

(2/2 頁)

(3) 手術後一般需長期 (6~12 個月) 追蹤靜脈曲張的改善程度，若有不孕的問題也應回門診檢查。

醫師補充說明：

本人(家屬) _____ 已經和醫師討論過，並接受這個手術或處置的效益、風險及替代方案。對醫師的說明都已充分了解，並保存有此文件副本一份。

病患 (或家屬)： (簽名)

與病人之關係：

見證人 (本院人員或病患家屬)： (簽名)

說明： (簽名)

中華民國 年 月 日

修訂日期：113.9.21