

高雄市立民生醫院陰囊手術說明書

(睪丸固定、副睪丸、陰囊水腫或腫瘤切除)

訂定日期：96.11.14

修訂日期：102.5.10

修訂日期：106.3.07

修訂日期：113.9.22

(1/2 頁)

本文件會說明與您的手術相關的事項，希望您能仔細閱讀並了解。

親愛的患者您好，在開始說明前我們希望您能了解：任何醫療措施都有其不確定性（即使是很小的手術）。正因如此，我們十分期待您的主動參與，畢竟您的安全是我們最大目標。無論在何時（解說前、後）有任何疑問，都請您與醫師充分討論；我們也尊重您的個人考量及其他專家的意見，讓我們一起為您的健康努力。

手術內容（或醫療處置）：

- (1) 睪丸固定術：治療隱睪症，使睪丸下降或解除即將或已經扭轉的睪丸固定於陰囊內。
- (2) 副睪丸手術：切除精液囊腫及其他腫塊，或為了阻塞性無精蟲的患者，由副睪丸抽取精蟲。
- (3) 陰囊水腫或腫瘤切除：藉由手術剝除陰囊水腫囊袋或移除腫瘤。

手術效益：經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師不能保證您獲得其中任何一項；且手術效益與風險性之間的取捨，應由您決定。

- (1) 睪丸固定術，可以避免睪丸功能繼續受到傷害而喪失生殖能力，但由於隱睪症本身的睪丸先天發育上即可能有缺陷，手術後不一定能使睪丸功能完全恢復正常。
- (2) 副睪丸手術，切除腫塊以判斷其病理診斷，並消除腫塊的不適感。也可以抽取精蟲以進行人工輔助生殖（試管嬰兒）。
- (3) 陰囊水腫切除，減輕不適感或獲得病理診斷結果。

手術風險：沒有任何手術是完全沒有風險的，以下所列的風險有可能發生，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。

- (1) 傷口疼痛。
- (2) 傷口感染。
- (3) 傷口出血、血腫或瘀血。
- (4) 陰囊腫脹。
- (5) 睪丸缺血壞死。
- (6) 副睪丸炎。
- (7) 其他。

替代方案：這個手術的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術，可能會有危險，請與醫師討論您的決定

承上頁
(2/2頁)

- (1) 睪丸固定術：評估施打胎盤激素促使睪丸下降；施作人工睪丸復位術解決扭轉問題。
- (2) 副睪丸手術及陰囊切除術：可以藥物止痛治療（副睪丸炎）、其他取精方式（男性不孕），以細針做水囊抽吸（陰囊水腫）等。

手術後之後續治療：

- (1) 陰囊的手術，一般不必拆線只要門診追蹤換藥7~10 天。
- (2) 術後應避免傷口泡水、劇烈運動及提重物。
- (3) 若有必須長期追蹤的狀況，請依醫師指示接受回診（例如：睪丸固定術後的追蹤）。

醫師補充說明：

本人（家屬）_____已經和醫師討論過，並接受這個手術或處置的效益、風險及替代方案。對醫師的說明都已充分了解，並保存有此文件副本一份。

病患（或家屬）： (簽名)

與病人之關係：

見證人（本院人員或病患家屬）： (簽名)

說明： (簽名)

中華民國 年 月 日

修訂日期：106.3.07