

# 高雄市立民生醫院

## 醫療處置說明書—超音波導引乳房穿刺切片檢查

(1/2 頁)

制訂日期：96.08.08

修訂日期：103.05.10

修訂日期：105.12.10

修訂日期：106.06.09

修訂日期：106.08.01

審視日期：113.10.18

本文件會說明與您的手術(或醫療處置)相關的事項，希望您能仔細閱讀並了解。

您好，在開始說明前我們希望您能了解：任何醫療措施都有其不確定性（即使很小）。正因如此，我們十分期待您的主動參與，畢竟您的安全是我們最大的目標。無論在何時（解說前、後）有任何疑問，都請您與醫師充分討論；我們也尊重您的個人考量及其他專家的意見，讓我們一起為了您的健康努力。

### 手術（或醫療處置）

本處置之目的為當乳房內發現有性質不明之組織，需作病理切片檢查，以擬定正確治療或追蹤方式時進行之。此檢查是在局部麻醉下利用超音波的導引與定位準確到達目標區域並經皮下穿刺，以 19 號特殊鋼針抽取組織樣本，以進行病理化驗。

手術(醫療處置)效益（經由手術或醫療處置），您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且效益與風險間的取捨，應由您決定）

本檢查的優點是在高度準確定位下，獲取組織樣本，檢查過程比傳統的手術切片法安全簡單，而且，切片後的傷口恢復迅速，多數不會留下疤痕。大於九成的病人，可以藉由此檢查，確定結果並決定治療方式。

手術（或醫療處置）風險（沒有任何的手術或處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但仍可能有一些醫師無法預期的風險未列出）

- 極少數人會對局部麻醉劑有特異體質性的過敏反應。
- 穿刺處皮膚瘀青:適當局部用力壓迫可減輕症狀。
- 局部短暫疼痛：雖施用麻醉藥，因病人對疼痛敏感度不同，感覺不同。

- 皮下血腫：發生率非常低，約 1%，而需要手術引流者低於 0.2%。

## 超音波導引乳房穿刺切片檢查

( 2 / 2 頁 )

**替代方案** (本手術的替代方案如下，如果您決定不施行手術 (或醫療處置)，可能會有危險，但何種方式較優，則依病況不同，因人而異。請與您的主治醫師充分討論醫療處置之決定。)

- 直接手術切片。

### 手術 (或醫療處置) 禁忌

- 對局部麻醉藥過敏。
- 個案無法合作。
- 有出血傾向或血液凝固異常的疾病、或正在使用抗凝血藥物:請提早告知實行檢查的醫師，以便做適當之處理。。

### 醫師補充說明 是 否

- 檢查結束後，需局部加壓止血三十分鐘，返家後局部冰敷更佳，且醫護人員會交付「乳房穿刺切片檢查護理」之衛教單張，可作為返家護理之依據。
- 請於檢查後 4-7 個工作天(檢查當日及例假日不算)，依醫師原預約門診時間看檢查結果。

本人 (或家屬) 已經和醫師討論過，並接受這個手術或處置的效益、風險及替代方案。對醫師的說明都已充分了解，並保有此文件副本一份。

病患 (或家屬) : (簽章)

與病人之關係 :

說明人 : (簽章)

中華民國            年            月            日