

躲在河床的夜鷹不易發現。要小心避免踩到。

母鳥會蓋住小鳥，避免風吹日晒，若是受到干擾離巢太久，沒有媽媽庇蔭的小鳥可能會被曬死。

夜鷹喜歡河床等裸露的地形。

雄鳥外側尾羽是白色。

俗諺說：捉長羽鷹把田雞的斑，雄鷹叫雞兜兜。

夜鷹也會在檳榔、香蕉、鳳梨或西瓜田裡休息。

鷺科和鴉科、鷺科和鴉科、鷺科和鴉科。

夜鷹會在田間道路上覓食。

夜鷹有時會邊飛邊叫，叫聲是追伊-追伊-

夜鷹的主食是昆蟲，可以幫助減少害蟲的數量。

夜鷹的活動時間



近年來開始發現夜鷹在人工建築上繁殖的狀況。

寫下你對夜鷹的觀察：

.....

.....

.....

.....



追伊-追伊-

臺灣夜鷹



石磯仔 = 臺灣有兩種

夜鷹俗稱石磯仔，也有人稱蚊母鳥。英文的俗名是goatsucker就是喝羊奶的鳥的意思！



西元2000年以前，臺灣夜鷹被發現的地點及數量均相當稀少，主要集中在屏東與東部的花東一帶，曾被考慮列為瀕危的鳥種。



近年來，西部各地陸續有發現穩定族群的消息傳出，數量甚至多到擾人的程度，族群逐漸往北擴散。

夜鷹使用溪床或其他開闊地作為棲息繁殖的場所，牠們不築巢，小鳥直接在裸露的地面上等待餵食。

學名：*Caprimulgus affinis*
英名：Savanna Nightjar
中名：臺灣夜鷹、林夜鷹、南亞夜鷹

學名：*Caprimulgus indicus*
英名：Jungle Nightjar
中名：普通夜鷹、日本夜鷹

臺灣夜鷹屬於局部普遍留鳥，在臺灣繁殖，而普通夜鷹則是稀有過境鳥，只在遷徙的過程中經過臺灣作短暫停留。



普通夜鷹

體型較大
翅膀斑塊較小
雄性尾羽近末端有白色橫斑

臺灣夜鷹

體型較小
翅膀斑塊較大
雄性最外側尾羽整根白色

1天大的夜鷹



8天大的夜鷹



近年來發現夜鷹也會使用建築物進行繁殖，斑駁的水泥地面和天然的裸露地一樣，與夜鷹的顏色相近，可以保護牠們避免被天敵發現。

我家也有夜鷹出現！



如果近幾年來你也開始聽到夜鷹的叫聲，可以將相關的情況記錄下來，寄E-mail到 ketupaflavpes@yahoo.com.tw，您提供的資料將幫助記錄夜鷹擴散及數量增多的情況！



以下是受到夜鷹叫聲干擾的住戶，適合採取的因應之道：



人常到頂樓活動，如遛狗或曬衣等。



搭設棚架讓頂樓成為遮蔽的環境，或是改變頂樓的鋪面，例如塗防水漆。



試著和這些原本處於瀕危的鳥類和平共處，為週遭的自然生態做紀錄。



用以下的方法阻止夜鷹鳴叫可能會得到反效果：



相較於西部地區部分居民對夜鷹鳴叫不勝其擾，東部花蓮牛犁社區居民卻積極保護夜鷹，不但對夜鷹進行觀察，同時還成立了夜鷹保護區，豎立警告標語提醒用路人減速慢行。面對保護與造成困擾的衝突性，深入研究臺灣夜鷹將可幫助尋找解決衝突的方法。

<p>發現地點：南投縣集集 發現環境：檳榔園、香蕉田 鳴叫時間：入夜開始 聲音形容：追伊--- 鳴叫月份：11-2月 大約2008年開始聽到</p>	 <p>To: 臺中野鳥救傷保育學會 ketupaflavpes@yahoo.com.tw</p>
<p>發現地點：台中縣霧峰 發現環境：附近有溪床 鳴叫時間：入夜開始 聲音形容：追伊-追伊- 鳴叫月份：1-7月 大約2008年開始出現在店家附近聽到</p>	 <p>To: 臺中野鳥救傷保育學會 ketupaflavpes@yahoo.com.tw</p>

委託單位：行政院農業委員會林務局
花蓮林區管理處
執行單位：國立臺灣師範大學生命科學系
攝影：吳志典、林文隆、姚采宜
設計、繪圖：白蛋工作室
whiteandegg@gmail.com