

# 關於植樹

相信大家都知道種樹對我們有許多好處，就讓植樹精靈幫大家整裡種樹的效益吧!



**A** 樹冠可以阻截、反射及吸收太陽輻射，以調整夏天的氣溫，幫助我們渡過炎炎夏日。

**B** 當樹木進行光合作用時，吸收了空氣中的二氧化碳，釋放出氧氣，有效減緩溫室效應。另葉面可以截留空氣中之懸浮微粒，而達到淨化空氣的作用。

**C** 茂盛的枝葉、木材及花蜜果實，提供許多野生動物居住空間及養分來源，營造人與自然和諧共處的社群，搭造友善野生生物的平台。

**D** 台灣山坡地因過度濫墾及濫伐，颱風來襲或是連日豪雨時易發生土石流，樹根能固定土壤，達成水土保持及水源涵養功能。另落葉也能保護表土，腐爛後可化為林木之肥料。



## 羅漢松

型態：常綠喬木，葉互生螺旋狀排列，線形葉，種子橢圓形。樹型看似羅漢外形，故名羅漢松。

花型：開花期3月-5月黃綠色小花，雄花柔荑狀，單生，雌花單生於枝條先端的葉腋。

果實：8月-9月果實橢圓形，初為綠色，成熟時紫黑色，果托顯著肉質，比種子長。

栽培管理：陽性植物，日照水份需充足，生性強健，但生長緩慢，以肥沃的壤土或砂質壤土為佳，排水需良好。



## 樟樹

型態：常綠大喬木，樹形高大壯碩，樹冠開展濃密，樹高可達30公尺、胸徑可達3公尺。枝、葉、木才有樟腦氣味。

花型：圓錐花序自葉腋伸出，花白色或淺綠、淺黃色。

果實：核果球形，成熟時紫黑色，帶有光澤。

栽培管理：適合全日照溫暖環境，栽培土壤要寬廣深厚。全年可適度修剪樹冠內過密的不良枝以保持樹冠透光、通風，能有效減緩樟白介殼蟲危害。繁殖可使用播種、扦插、空中壓條法。



## 紫薇

型態：落葉喬木，樹幹通直，樹皮淡茶褐色，光滑，常有片狀剝落；枝條初為綠色，次則為灰色，再變為赤褐色。

花型：花瓣紅至紫紅色，柱頭頭狀；花期 5~9 月。

果實：蒴果圓球形，長 0.9~1.3 公分，寬 0.8~1.1 公分。

栽培管理：紫薇喜愛光線充足，排水良好的環境，生長適溫 23-30℃，土壤以含腐植質豐富者為佳。



## 高雄市植樹節小樹苗贈送活動資訊

- 3月12日(星期二)上午8時30分開始，在高雄市38個區公所各發放600株，計有羅漢松、樟樹、紫薇三種小樹苗，等著市民朋友帶回家。
- 活動當天不用攜帶證件，每人即可領取樹苗2株，送完為止。
- 請市民朋友們自備環保袋裝置苗木。



# 種樹

## 5步驟



若苗高30公分左右，則穴寬應為40公分、土深應為30公分。掘穴時，記得「表土」與「心土」要分開堆置，以便栽植時應用，另需注意的是，置於植穴內的苗木，其苗根需要空間舒展，不可盤曲。

植穴挖好後，將有機肥或培養土放穴底，上面堆放「表土」後將小樹種下，再覆蓋「心土」。植栽時深度要比小苗在原土中的深度略深一點，且苗木需放直不可歪斜，一邊將樹苗往上輕拉踏緊。

在風大的地方，應準備支柱撐扶，以免因倒伏或搖動而影響生長。綁支柱的繩索要用草繩、麻繩或塑膠繩，不要用鉛絲以避免傷及樹木。

樹木長大後，應於每年秋冬之際，視需要與目的施行枝葉修剪，樹冠整理，以增進樹型的美觀；而為了減少風害、霜害，亦須於秋冬季酌情修剪枝葉。



樹木種好後，立即澆水，周圍長出的雜草要經常拔除，天旱時早晚記得澆水。此外，適當的施用肥料以及注意病蟲害的防治，也是重要的工作。

- ★ 苗木種在穴內過深過淺都不好，過深易彎曲、折斷而腐爛；過淺易乾枯、倒伏而枯死，覆土不宜超過「根領」且種植後應經常澆水。
- ★ 種樹時苗根不可彎曲，如根系太長或過多，應加以修剪或將植穴加大加深，低溼地或濕氣重的地區可用丘植方法，使苗根不易腐爛。

### ○ 種法正確



### ✗ 種法太偏



### ✗ 種法太淺



### ✗ 種法太深



# 2024

# 森活 高雄

# 植樹趣

延伸島嶼生命綠



主辦單位：  
高雄市政府農業局

協辦單位：  
三民區公所、小港區公所、大寮區公所、大樹區公所、大社區公所、仁武區公所、內門區公所、六龜區公所、左營區公所、永安區公所、田寮區公所、甲仙區公所、那瑪夏區公所、阿蓮區公所、杉林區公所、林園區公所、岡山區公所、前金區公所、苓雅區公所、前鎮區公所、美濃區公所、茄萣區公所、茂林區公所、桃源區公所、鳥松區公所、梓官區公所、湖內區公所、楠梓區公所、鼓山區公所、新興區公所、路竹區公所、旗津區公所、鳳山區公所、旗山區公所、橋頭區公所、燕巢區公所、彌陀區公所、鹽埕區公所