

一、百克敏

23.6% 百克敏 EC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項
檳榔	炭疽病	0.2-0.7 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	7	4		7	

二、福化利

25.0% 福化利 EC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項
檳榔	花薊馬類	0.2-0.7 公升	3,000	花薊馬發生初期開始施藥。	7	1-3		7	

三、福化利

240G/L 福化利 (24.0% W/V) EW

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項
檳榔	花薊馬類	0.2-0.7 公升	3,000	花薊馬發生初期開始施藥。	7	1-3		7	

四、庫斯蘇力菌 E-911

16,000IU/mg 庫斯蘇力菌 E-911 WP

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥方法	安全採 收期	注意事項
檳榔	椰子 綴蛾	0.5 公斤	600	害蟲發生初期開 始施藥。	14	2			