

薏苡秋行軍蟲緊急防治藥劑及其使用方法與範圍

藥劑名稱	每公頃 每次施 藥量	稀釋 倍數	施藥時期及方法	注意事項
5.87% 賜諾特 SC (spinetoram)	0.6-2.6 公升	600	害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	採收前 9 天停止施藥。
11.7% 賜諾特 SC (spinetoram)	0.3-1.3 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	採收前 9 天停止施藥。
18.4% 剋安勃 SC (chlorantraniliprole)	0.1-0.3 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。	採收前 14 天停止施藥。
5% 護賽寧 SL (flucythrinate)	1 公升	800	害蟲發生時開始施藥，每隔 7-10 天施藥一次。	採收前 15 天停止施藥。
10% 依芬寧 EC (etofenprox)	1.6 公升	750	害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。	採收前 15 天停止施藥。
20% 依芬寧 WP (etofenprox)	0.67 公 升	1,500	害蟲發生時開始施藥，每隔 10-14 天施藥一次。	採收前 15 天停止施藥。
48.1% 蘇力菌 WG	0.8-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	
54% 鮎澤蘇力菌 NB-200 WG	0.8-1 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，每隔 7 天施藥一次。	