

## 「施得圃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 1 月 11 日農授防字第 1111488057A 號公告修正

38.7% 施得圃 膠囊懸著劑 (CS)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量    | 稀釋倍數       | 使用時期                | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                      | 安全採收期(天) | 注意事項   | 說明 |
|------|------|------------|------------|---------------------|---------|------|---------------------------|----------|--|----|
| 水稻   | 雜草   | 1.5 公升     | 加水至 600 公升 | 於水稻移植後 1-3 天施藥 1 次。 |         |      |                           |          | 防除移植本田雜草。防除對象：稗草、畔茅、母草。  |    |
| 落花生  | 雜草   | 4.5-5.4 公升 | 200-250    | 雜草萌芽前。              |         |      | 播種覆土後，雜草萌芽前全面噴於土面。        |          |  |    |
| 紅豆   | 雜草   | 4.5-5.4 公升 | 200-250    | 播種覆土後，雜草萌芽前。        |         |      | 全面噴施於土壤表面。                |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 播種覆土後，雜草萌芽前，全面噴施於土壤表面。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、旱辣蓼、龍葵、野苳、小葉灰藿、滿天星。</li> </ol> |    |
| 大豆   | 雜草   | 2 公升       | 300        |                     |         |      | 整地耙平後，將藥劑全面均勻噴於土壤表面，並與土壤混 |          | 限採收乾大豆者使用。   |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期                   | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                   | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|-------------|-----------|------------------------|---------|------|------------------------|----------|---|----|
|      |      |             |           |                        |         |      | 合後開始播種。                |          |   |    |
| 大豆   | 雜草   | 2.63-3.94公升 | 400       | 播種後。                   |         |      | 整地播種後全面噴於土壤表面。         |          | 限採收乾大豆者使用。  |    |
| 甘藍   | 雜草   | 1.67公升      | 600       | 定植前。                   |         |      | 定植前一天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。 |          | 土壤表面濕潤後施藥。  |    |
| 結球白菜 | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |                        |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。            |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 結球白菜 | 雜草   | 1.67公升      | 1,200     | 定植前1天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。 |         |      |                        |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土壤表面濕潤後施藥。</li> <li>2. 防除對象：小葉灰藿、牛筋草、野莧、馬齒</li> </ol>               |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期                   | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|-------------|-----------|------------------------|---------|------|-------------|----------|---|----|
|      |      |             |           |                        |         |      |             |          | 莧、珠仔草。  |    |
| 結球萵苣 | 雜草   | 1.67公升      | 1,200     | 定植前1天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。 |         |      |             |          | 1. 土壤表面濕潤後施藥。<br>2. 防除對象：小葉灰藿、牛筋草、野莧、馬齒莧、珠仔草。         |    |
| 結球萵苣 | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |                        |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 |    |
| 萵菜   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |                        |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野            |    |

| 作物名稱   | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量      | 稀釋倍數       | 使用時期                     | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|--------|------|--------------|------------|--------------------------|---------|------|-------------|----------|---|----|
|        |      |              |            |                          |         |      |             |          | 莧、馬唐草等一年生草。   |    |
| 豆科小葉菜類 | 雜草   | 2.5 公升       | 稀釋至 600 公升 | 播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。 |         |      |             |          | 施用時土壤需維持濕潤。   |    |
| 小白菜    | 雜草   | 1.25-1.67 公升 | 900-1,200  |                          |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 油菜     | 雜草   | 1.25-1.67 公升 | 900-1,200  |                          |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生</li> </ol>   |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|-------------|-----------|------|---------|------|-------------|----------|---|----|
| 青江菜  | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |      |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | 草。<br>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 |    |
| 芥藍   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |      |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。       |    |
| 芥菜   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |      |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉                          |    |

| 作物名稱        | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期   | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|-------------|------|-------------|-----------|--------|---------|------|-------------|----------|---|----|
|             |      |             |           |        |         |      |             |          | 灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。   |    |
| 不結球萵苣與半結球萵苣 | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |        |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 茼蒿          | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |        |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 蒜           | 雜草   | 3.15公升      | 200       | 雜草萌芽後。 |         |      | 栽植後畦田禾本科雜   |          | 施藥時田間應保持濕潤狀態。   |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期                   | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                 | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|-------------|-----------|------------------------|---------|------|----------------------|----------|---|----|
|      |      |             |           |                        |         |      | 草萌芽至1-2葉時，將藥劑均勻全面噴施。 |          |   |    |
| 韭    | 雜草   | 3公升         | 700       | 畦面雜草萌芽至1~2葉時將藥劑均勻全面噴施。 |         |      |                      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後田間應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野萹、龍葵、馬齒莧。</li> </ol> |    |
| 芹菜   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 | 播種後均勻噴施於畦面。            |         |      |                      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萹、馬唐草等一年生草。</li> </ol>       |    |
| 菠菜   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |                        |         |      | 播種後均勻噴               |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應</li> </ol>   |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期    | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|-------------|-----------|---------|---------|------|-------------|----------|---|----|
|      |      |             |           |         |         |      | 施於畦面。       |          | 保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。          |    |
| 莧菜   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 |         |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 |    |
| 甘藷   | 雜草   | 1.5公升       | 400       | 播植後第一天。 |         |      | 均勻噴施於畦面。    |          | 1. 防治對象：龍葵、小葉莧、芒稷。<br>2. 適合秋作及塊根用品種。                  |    |
| 豆科根  | 雜草   | 2.5公升       | 稀釋至       | 播種覆土    |         |      |             |          | 施用時土壤   |    |



| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數  | 使用時期                          | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                              | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|-------------|-------|-------------------------------|---------|------|-----------------------------------|----------|---|----|
| 菜類   |      |             | 600公升 | 後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。          |         |      |                                   |          | 需維持濕潤。  |    |
| 蘿蔔   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 600   | 播種後。                          |         |      | 播種後均勻噴射於畦面。                       |          |   |    |
| 洋蔥   | 雜草   | 2公升         | 500   | 定植後。                          |         |      | 定植後2-4天畦面濕潤時噴於畦面及畦溝道。             |          | 土壤表面濕潤後施藥。  |    |
| 金針   | 雜草   | 3.15公升      | 200   | 雜草萌發至1-2葉時均勻噴施。               |         |      | -                                 |          | 施藥時田間應保持濕潤狀態。   |    |
| 番茄   | 雜草   | 2公升         | 300   | 雜草萌芽後。                        |         |      | 定植第一次培土後俟雜草1-2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |          | 避免噴及作物之生長點。   |    |
| 甜椒   | 雜草   | 2.14公升      | 700   | 定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於 |         |      |                                   |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 避免噴及作物之生長點。</li> <li>2. 防除對象：芒稷、牛筋</li> </ol> |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期                             | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項   | 說明 |
|------|------|---------|------|----------------------------------|---------|------|------|----------|--|----|
|      |      |         |      | 土面。                              |         |      |      |          | 草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。                                |    |
| 辣椒   | 雜草   | 2.14公升  | 700  | 定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |         |      |      |          | 1. 避免噴及作物之生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 |    |
| 枸杞   | 雜草   | 2.14公升  | 700  | 定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |         |      |      |          | 1. 避免噴及作物之生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 |    |
| 香瓜茄  | 雜草   | 2.14公升  | 700  | 定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |         |      |      |          | 1. 避免噴及作物之生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉              |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期                             | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項   | 說明 |
|------|------|-------------|-----------|----------------------------------|---------|------|------|----------|--|----|
|      |      |             |           |                                  |         |      |      |          | 灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。                                    |    |
| 酸漿   | 雜草   | 2.14公升      | 700       | 定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |         |      |      |          | 1. 避免噴及作物之生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 |    |
| 樹番茄  | 雜草   | 2.14公升      | 700       | 定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |         |      |      |          | 1. 避免噴及作物之生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 |    |
| 胡瓜   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 | 播種後均勻噴施於畦面。                      |         |      |      |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬           |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|-------------|-----------|-------------|---------|------|------|----------|---|----|
|      |      |             |           |             |         |      |      |          | 齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。   |    |
| 苦瓜   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 | 播種後均勻噴施於畦面。 |         |      |      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 絲瓜   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 | 播種後均勻噴施於畦面。 |         |      |      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 扁蒲   | 雜草   | 1.25-1.67公升 | 900-1,200 | 播種後均勻噴施於畦面。 |         |      |      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤</li> </ol>   |    |

| 作物名稱      | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數          | 使用時期                     | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法       | 安全採收期(天) | 注意事項   | 說明 |
|-----------|------|---------|---------------|--------------------------|---------|------|------------|----------|--|----|
|           |      |         |               |                          |         |      |            |          | 態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。          |    |
| 豆科豆<br>菜類 | 雜草   | 2.5 公升  | 稀釋至<br>600 公升 | 播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。 |         |      |            |          | 施用時土壤需維持濕潤。                                      |    |
| 大豆        | 雜草   | 2.5 公升  | 稀釋至<br>600 公升 | 播種覆土後。                   |         |      | 全面噴濕於土壤表面。 |          | 限毛豆園使用。施藥時田間應保持濕潤狀態。                             |    |
| 菜豆        | 雜草   | 2.5 公升  | 稀釋至<br>600 公升 | 播種覆土後，全面噴施於土壤表面。         |         |      |            |          | 1. 施藥時田間應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：通泉草、刺莧、龍葵、牛筋草、芒稷、野莧。 |    |

## 34% 施得圃 乳劑 (EC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量  | 稀釋倍數    | 使用時期         | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                           | 安全採收期(天) | 注意事項   | 說明 |
|------|------|----------|---------|--------------|---------|------|--------------------------------|----------|--|----|
| 落花生  | 雜草   | 5-6 公升   | 180-200 | 雜草萌芽前。       |         |      | 播種覆土後，雜草萌芽前全於土面噴。              |          |  |    |
| 紅豆   | 雜草   | 5-6 公升   | 180-200 | 播種覆土後，雜草萌芽前。 |         |      | 全面噴施於土壤表面。                     |          | 1. 播種覆土後，雜草萌芽前，全面噴施於土壤表面。<br>2. 防除對象：牛筋草、旱辣蓼、龍葵、野萵、小葉灰藿、滿天星。 |    |
| 大豆   | 雜草   | 2.5 公升   | 240     |              |         |      | 整地耙平後，將藥劑全均噴於土壤表面，並與土壤混合後開始播種。 |          | 限採收乾大豆者使用。   |    |
| 大豆   | 雜草   | 3-4.5 公升 | 350     | 播種後。         |         |      | 整地播種後全於土壤表面噴。                  |          | 限採收乾大豆者使用。   |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量  | 稀釋倍數      | 使用時期                     | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                   | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|----------|-----------|--------------------------|---------|------|------------------------|----------|---|----|
| 甘藍   | 雜草   | 2 公升     | 500       | 定植前。                     |         |      | 定植前一天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。 |          | 土壤表面濕潤後施藥。  |    |
| 結球白菜 | 雜草   | 1.5-2 公升 | 750-1,000 |                          |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。            |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 結球白菜 | 雜草   | 2 公升     | 1,000     | 定植前 1 天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。 |         |      |                        |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土壤表面濕潤後施藥。</li> <li>2. 防除對象：小葉灰藿、牛筋草、野莧、馬齒莧、珠仔草。</li> </ol>         |    |
| 結球萵苣 | 雜草   | 2 公升     | 1,000     | 定植前 1 天，田面保持濕潤時，均勻噴射     |         |      |                        |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土壤表面濕潤後施藥。</li> <li>2. 防除對</li> </ol>                               |    |

| 作物名稱   | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數      | 使用時期       | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|--------|------|-----------|-----------|------------|---------|------|-------------|----------|---|----|
|        |      |           |           | 於畦面。       |         |      |             |          | 象：小葉灰藿、牛筋草、野萵、馬齒莧、珠仔草。  |    |
| 結球萵苣   | 雜草   | 1.5-2公升   | 750-1,000 |            |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 萵菜     | 雜草   | 1.5-2公升   | 750-1,000 |            |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 豆科小葉菜類 | 雜草   | 2.5-4.5公升 | 240-350   | 播種覆土後，雜草萌芽 |         |      |             |          | 施用時土壤需維持濕潤。   |    |



| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數      | 使用時期           | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|---------|-----------|----------------|---------|------|-------------|----------|---|----|
|      |      |         |           | 前，全面均勻噴施於土壤表面。 |         |      |             |          |   |    |
| 小白菜  | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 |                |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 油菜   | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 |                |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 青江菜  | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 |                |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> </ol>  |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數      | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|---------|-----------|------|---------|------|-------------|----------|---|----|
|      |      |         |           |      |         |      |             |          | 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。                     |    |
| 芥藍   | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 |      |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 |    |
| 芥菜   | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 |      |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 |    |

| 作物名稱        | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數      | 使用時期   | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|-------------|------|---------|-----------|--------|---------|------|-----------------------------|----------|---|----|
| 不結球萵苣與半結球萵苣 | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 |        |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。                 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 茼蒿          | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 |        |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。                 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 蒜           | 雜草   | 3.5公升   | 180       | 雜草萌芽後。 |         |      | 栽植後畦田禾本科雜草萌發至1-2葉時，將藥劑均勻噴施。 |          | 施藥時田間應保持濕潤狀態  |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量  | 稀釋倍數      | 使用時期                          | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|----------|-----------|-------------------------------|---------|------|------|----------|---|----|
| 蔥    | 雜草   | 2.0 公升   | 500       | 定植後2-4天畦面濕潤時，均勻噴施於畦面及畦溝兩側之畦脊。 |         |      |      |          | 施藥時田間應保持濕潤狀態。   |    |
| 韭    | 雜草   | 3.5 公升   | 600       | 畦面雜草萌芽至1~2葉時將藥劑均勻全面噴施。        |         |      |      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後田間應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野萵、龍葵、馬齒莧。</li> </ol> |    |
| 芹菜   | 雜草   | 1.5-2 公升 | 750-1,000 | 播種後均勻噴施於畦面                    |         |      |      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年</li> </ol>          |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量    | 稀釋倍數      | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法        | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|------------|-----------|-------------|---------|------|-------------|----------|---|----|
|      |      |            |           |             |         |      |             |          | 草。  |    |
| 芫荽   | 雜草   | 1.5-2.0 公升 | 750-1,000 | 播種後均勻噴施於畦面。 |         |      |             |          | 施藥時田間應保持濕潤狀態。   |    |
| 菠菜   | 雜草   | 1.5-2 公升   | 750-1,000 |             |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 莧菜   | 雜草   | 1.5-2 公升   | 750-1,000 |             |         |      | 播種後均勻噴施於畦面。 |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 甘藷   | 雜草   | 2 公升       | 300       | 播植後第一天。     |         |      | 均勻噴施於畦面。    |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 防治對象：龍葵、小藜、馬齒</li> </ol>  |    |

| 作物名稱  | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量    | 稀釋倍數      | 使用時期                     | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                   | 安全採收期(天) | 注意事項                    | 說明 |
|-------|------|------------|-----------|--------------------------|---------|------|------------------------|----------|-------------------------|----|
|       |      |            |           |                          |         |      |                        |          | 莧、芒稷。<br>2. 適合秋作及塊根用品種。 |    |
| 豆科根菜類 | 雜草   | 2.5-4.5 公升 | 240-350   | 播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。 |         |      |                        |          | 施用時土壤需維持濕潤。             |    |
| 蘿蔔    | 雜草   | 1.5-2 公升   | 500       | 播種後。                     |         |      | 播種後均勻噴射於畦面。            |          |                         |    |
| 洋蔥    | 雜草   | 2.5 公升     | 400       | 定植後。                     |         |      | 定植後2-4天畦面濕潤時噴於畦面及畦溝兩道。 |          | 土壤表面濕潤後施藥。              |    |
| 胡蘿蔔   | 雜草   | 1.5-2.0 公升 | 750-1,000 | 播種後至雜草萌芽前均勻噴施於畦面。        |         |      |                        |          | 施藥後土壤應保持濕潤狀態。           |    |
| 金針    | 雜草   | 3.5 公升     | 180       | 雜草萌芽至1-2葉時均勻噴施           |         |      |                        |          | 施藥時田間應保持濕潤狀態。           |    |
| 番茄    | 雜草   | 2.5 公升     | 240       | 雜草萌芽後。                   |         |      | 定植第一次培土後俟              |          | 避免噴及作物之生長點。             |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期                               | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                       | 安全採收期(天) | 注意事項   | 說明 |
|------|------|---------|------|------------------------------------|---------|------|----------------------------|----------|--|----|
|      |      |         |      |                                    |         |      | 雜草 1-2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |          |  |    |
| 甜椒   | 雜草   | 2.5 公升  | 600  | 定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |         |      |                            |          | 1. 避免噴及作物之生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 |    |
| 辣椒   | 雜草   | 2.5 公升  | 600  | 定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。 |         |      |                            |          | 1. 避免噴及作物之生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 |    |
| 枸杞   | 雜草   | 2.5 公升  | 600  | 定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶             |         |      |                            |          | 1. 避免噴及作物之生長點。<br>2. 防除對象：芒                      |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期                          | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|---------|------|-------------------------------|---------|------|------|----------|---|----|
|      |      |         |      | 狀將藥劑均噴施於土面。                   |         |      |      |          | 稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。                           |    |
| 香瓜茄  | 雜草   | 2.5 公升  | 600  | 定植第一次土後雜草1~2葉時，以定向狀將藥劑均噴施於土面。 |         |      |      |          | 1. 避免噴及作物生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 |    |
| 酸漿   | 雜草   | 2.5 公升  | 600  | 定植第一次土後雜草1~2葉時，以定向狀將藥劑均噴施於土面。 |         |      |      |          | 1. 避免噴及作物生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 |    |
| 樹番茄  | 雜草   | 2.5 公升  | 600  | 定植第一次土後雜草1~2葉時，以定向狀將藥         |         |      |      |          | 1. 避免噴及作物生長點。<br>2. 防除對象：芒稷、牛筋                  |    |



| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數      | 使用時期        | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|------|------|---------|-----------|-------------|---------|------|------|----------|---|----|
|      |      |         |           | 劑均勻噴施於土面。   |         |      |      |          | 草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。   |    |
| 胡瓜   | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 | 播種後均勻噴施於畦面。 |         |      |      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 苦瓜   | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 | 播種後均勻噴施於畦面。 |         |      |      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。</li> <li>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。</li> </ol> |    |
| 絲瓜   | 雜草   | 1.5-2公升 | 750-1,000 | 播種後均勻噴施於畦面。 |         |      |      |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施藥後土壤應保持濕潤狀</li> </ol>  |    |

| 作物名稱  | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數        | 使用時期                     | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項  | 說明 |
|-------|------|-----------|-------------|--------------------------|---------|------|------|----------|---|----|
|       |      |           |             |                          |         |      |      |          | 態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。               |    |
| 扁蒲    | 雜草   | 1.5-2公升   | 750-1,000   | 播種後均勻噴施於畦面。              |         |      |      |          | 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 |    |
| 豆科豆菜類 | 雜草   | 2.5-4.5公升 | 240-350     | 播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。 |         |      |      |          | 施用時土壤需維持濕潤。   |    |
| 菜豆    | 雜草   | 3-4.5公升   | 1,000-1,500 | 整地播種後全面噴施於土壤表面。          |         |      |      |          | 1. 施藥時田間應保持濕潤狀態。<br>2. 防除對                            |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數      | 使用時期                          | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                             | 說明    |
|------|------|---------|-----------|-------------------------------|---------|------|------|----------|----------------------------------|-------|
|      |      |         |           |                               |         |      |      |          | 象：牛筋草、大指草、小指草、旱辣蓼、山芥菜、野萵。        |       |
| 高粱   | 雜草   | 1.5 公升  | 加水至600 公升 | 整地後，土壤表面濕潤時，藥液均勻噴施於土壤表面後7日播種。 |         |      |      |          | 高粱種子及幼苗對除草劑極為敏感，勿任意提高用藥量，以免發生藥害。 | 本項新增。 |

5% 施得圃 粒劑 (GR)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                           | 說明 |
|------|------|---------|------|------|---------|------|------|----------|--------------------------------|----|
| 水稻   | 雜草   | 30 公斤   |      | 插秧後。 |         |      |      |          | 防除移植本田雜草。雜草萌後處理(對螢蘭發生多之稻田不適用)。 |    |

75% 施得圃 可溼性粉劑 (WP)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法           | 安全採收期(天) | 注意事項           | 說明 |
|------|------|---------|------|------|---------|------|----------------|----------|----------------|----|
| 水稻   | 雜草   | 1.33 公斤 | 750  | 定植後。 |         |      | 定植後將藥劑均勻噴射於畦面。 |          | 施藥前後土壤應保持濕潤狀態。 |    |