

「左旋莫多草」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 1 月 11 日農授防字第 1111488057B 號公告修正

87.3% 左旋莫多草 乳劑 (EC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|---------|------------|--------|---------|------|------|----------|--|----|
| 落花生 | 雜草 | 1.2 公升 | 稀釋至 600 公升 | 播種覆土後。 | | | | | 將藥劑噴於土壤表面。施用時土壤需要潮濕，如土壤乾燥時，施藥後輕輕拌土或鬆土，可增加藥效。 | |

960 G/L (96% W/V) 左旋莫多草 乳劑 (EC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|---------|------------|---------------------------------|---------|------|------|----------|--|-------|
| 落花生 | 雜草 | 1.2 公升 | 稀釋至 600 公升 | 播種覆土後。 | | | | | 將藥劑噴於土壤表面。施用時土壤需要潮濕，如土壤乾燥時，施藥後輕輕拌土或鬆土，可增加藥效。 | |
| 高粱 | 雜草 | 1.2 公升 | 加水至 600 公升 | 整地後，土壤表面濕潤時，藥液均勻噴施於土壤表面後 7 日播種。 | | | | | 高粱種子及幼苗對除草劑極為敏感，勿任意提高用藥量，以免發生藥害。 | 本項新增。 |