# 114 年高雄市衛生性別統計圖像

## 一、平均餘命：本市市民女性較男性長壽，惟兩性零歲平均餘命均低於全國水準

114 年本市男、女零歲平均餘命，分別為 76.48 歲及 83.25 歲且皆少於全國。以 100 年~114 年兩性間零歲平均餘命差距觀察，本市女性較男性多出約 6.3~6.9 歲，差距情形與全國相似。

**圖 1 高雄市及全國零歲平均餘命趨勢**





**表 1 高雄市及全國零歲平均餘命差距分析**

單位：歲

| 年別 | 高雄市 | | | 全國 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 男(A) | 女(B) | 差距(B-A) | 男(C) | 女(D) | 差距(D-C) |
| 100 | 74.92 | 81.35 | 6.43 | 75.96 | 82.63 | 6.67 |
| 110 | 76.76 | 83.38 | 6.62 | 77.67 | 84.25 | 6.58 |
| 111 | 76.35 | 83.22 | 6.87 | 76.63 | 83.28 | 6.65 |
| 112 | 76.02 | 82.92 | 6.90 | 76.94 | 83.74 | 6.80 |
| 113 | 76.01 | 82.91 | 6.90 | 77.42 | 84.30 | 6.88 |
| 114 | 76.48 | 83.25 | 6.77 | 77.93 | 84.75 | 6.82 |


資料來源：內政部統計處

## 二、死亡率：

### (一)隨人口老化本市呈兩性粗死亡率漸增，標準化死亡率漸減趨勢

由於本市人口持續老化，高齡死亡人數愈高，致粗死亡率逐年增加。由近年資料觀察，男性粗死亡率及標準化死亡率皆高於女性，100 年男性粗死亡率及標準化死亡率皆為女性 1.7 倍，114 年則各為 1.4 倍及 1.8 倍，男、女間死亡率差距並未有明顯變動；另兩性標準化死亡率呈長期減勢，應與衛生醫療保健進步有關。

## 圖 2 高雄市兩性死亡率趨勢





資料來源：衛生福利部統計處

### (二)本市兩性十大死因大致相同，女性死亡率較男性低

觀察 114 年本市兩性的十大死因，其中女性多數主要死因死亡率較男性低，係造成兩性平均餘命差距的主要原因。

## 圖 3 114 年高雄市兩性十大主要死因死亡率




資料來源：衛生福利部統計處

### (三)本市男性主要死因死亡年齡中位數皆較女性低

114 年本市男性死亡年齡中位數為 73 歲，女性為 80 歲，男性較女性低 7 歲，十大死因中男性死亡年齡中位數皆低於女性，其中以「心臟疾病(高血壓性疾病除外)」年齡差距 10 歲最多、「高血壓性疾病」差距 9 歲次之、「事故傷害」及「糖尿病」均差距 8 歲再次之，可能係男性活動力較強、粗心、擔任較危險的工作環境有關。

表 2 114 年高雄市主要死因死亡年齡統計


| | 男性 | | 女性 | |
|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 死亡年齡中位數(歲) | 順位 | 死亡年齡中位數(歲) |
| 所有死因 | | 73 | | 80 |
| 惡性腫瘤 | 1 | 70 | 1 | 72 |
| 肺炎 | 3 | 81 | 2 | 85 |
| 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 2 | 72 | 3 | 82 |
| 高血壓性疾病 | 5 | 77 | 4 | 86 |
| 腦血管疾病 | 4 | 76 | 5 | 82 |
| 糖尿病 | 6 | 74 | 6 | 82 |
| 衰老/老邁/年老 | 8 | 87 | 7 | 90 |
| 事故傷害 | 7 | 63 | 9 | 71 |
| 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 10 | 76 | 8 | 81 |
| 慢性下呼吸道疾病 | 9 | 81 | 12 | 83 |

## 三、癌症死亡率

### (一)本市男性癌症粗死亡率及標準化死亡率皆高於女性

由近年資料觀察，男性粗死亡率及標準化死亡率皆高於女性，100 年男性粗死亡率及標準化死亡率皆為女性 1.9 倍，114 年則各為 1.5 倍及 1.8 倍，男、女間癌症死亡率差距並未有明顯變動；另粗死亡率與標準化死亡率差距呈漸增趨勢，應與人口結構老化有關。

圖 4 高雄市兩性癌症死亡率趨勢




資料來源：衛生福利部統計處

### (二)114 年本市男、女兩性癌症死亡率差距最大者為「口腔癌」與「食道癌」

114 年本市男、女兩性癌症粗死亡率及標準化死亡率倍數比分別為 1.5 及 1.8 倍；如以除去男、女性單一性別特有癌症外，主要癌症死因標準化死亡率均為男性高於女性，男、女兩性差距最大者為口腔癌與食道癌，男性分別為女性 18.9 倍與 16.5 倍，其餘癌症死因男性分別為女性 1.5~2.5 倍。

## 表 3 114 年高雄市兩性主要癌症比較

單位：人/每十萬人口

| 癌症死亡原因 | 男性 | | | 女性 | | | 男/女倍數比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 粗死亡率 | 標準化死亡率 | 順位 | 粗死亡率 | 標準化死亡率 | 粗死亡率 | 標準化死亡率 |
| 惡性腫瘤 | | 313.9 | 158.7 | | 211.0 | 90.6 | 1.5 | 1.8 |
| 氣管、支氣管和肺癌 | 1 | 60.8 | 30.0 | 1 | 39.2 | 16.1 | 1.6 | 1.9 |
| 肝和肝內膽管癌 | 2 | 52.2 | 25.6 | 4 | 26.9 | 10.3 | 1.9 | 2.5 |
| 結腸、直腸和肛門癌 | 3 | 42.6 | 21.4 | 2 | 30.2 | 12.7 | 1.4 | 1.7 |
| 口腔癌 | 4 | 35.1 | 19.3 | 16 | 2.2 | 1.0 | 15.8 | 18.9 |
| 胰臟癌 | 5 | 17.3 | 8.5 | 5 | 14.1 | 5.8 | 1.2 | 1.5 |
| 胃癌 | 8 | 12.2 | 6.0 | 7 | 6.6 | 2.8 | 1.8 | 2.1 |
| 食道癌 | 7 | 15.9 | 8.5 | 18 | 1.2 | 0.5 | 13.0 | 16.5 |
| 膀胱癌 | 9 | 8.3 | 3.8 | 11 | 4.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
| 非何杰金氏淋巴瘤 | 11 | 6.9 | 3.3 | 10 | 5.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 |
| 白血病 | 10 | 7.1 | 3.9 | 12 | 4.7 | 2.3 | 1.5 | 1.7 |


資料來源：衛生福利部統計處

## 四、疾病預防

### (一)自殺概況：本市男性自殺死亡人數高於女性，自殺通報人次卻女多於男

114年本市男性自殺死亡人數為306人，女性為194人，男性自殺身亡者近女性1.5倍，然觀察自殺通報人次，男性反而僅為女性通報人次二分之一，顯示女性雖較容易有自殺意圖，但男性一旦有自殺想法，往往死意堅決，且較不願對外尋求協助，故需特別加強重視。

### 圖 5 高雄市自殺死亡人數、通報人次





資料來源：衛生福利部自殺防治通報系統

## (二)婦女癌症篩檢：114 年本市女性乳房癌篩檢率較上期增加 1.34 個百分點，子宮頸抹片篩檢率則減少 0.81 個百分點

114 年女性特有癌症「女性乳房癌」及「子宮頸及部位未明示子宮癌」，分占本市癌症死因第 4 及第 12 位，因癌症初期並無症狀，定期檢查能早期發現，癌症治癒的機會亦相對較高。114 本市乳癌防治篩檢率 28.84%較 113 年增加 1.34 個百分點，另 114 年子宮頸抹片篩檢率為 17.83%，則較上期減少 0.81 個百分點。

**圖 6 高雄市婦女癌症篩檢率**




註: (1)子宮頸癌篩檢：30 歲以上之婦女，每年 1 次。
(2)乳癌篩檢：45-70 歲之婦女，每 2 年 1 次。
(3)篩檢率：符合設定篩檢年齡之本市篩檢人數÷本市符合設定篩檢年齡之年中戶籍人口數x100%。
篩檢人數年齡區間定義如下：
a.子宮頸癌篩檢：30-70 歲符合篩檢資格之婦女。 b.乳癌篩檢：45-70 歲符合篩檢資格之婦女。
(4)年中戶籍人口數：配合國健署公告篩檢率報表並與其他縣市計算基準一致，年中戶籍人口數係採 6 月人口數資料。

# 高雄市按性別分類之主要衛生統計指標

| 類別 | 指標項目 | 序號 | 單位 | 113 年 | | 114 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 死亡統計 | 新生兒死亡人數 | 1 | 人 | 30 | 34 | 21 | 23 |
| | 新生兒死亡率 | 2 | ‰ | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.7 |
| | 嬰兒死亡人數 | 3 | 人 | 41 | 47 | 29 | 35 |
| | 嬰兒死亡率 | 4 | ‰ | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.6 |
| | 孕婦死亡人數 | 5 | 人 | - | -- | 1 | -- |
| | 孕婦死亡率 | 6 | 0/0000 | - | -- | 8.2 | -- |
| 死因統計 | 零歲平均餘命 | 7 | 歲 | 82.91 | 72.01 | 83.25 | 76.48 |
| | 零歲死亡機率 | | ‰ | 4.33 | 5.83 | 4.67 | 5.29 |
| | 死亡年齡中位數 | | 歲 | 80 | 73 | 80 | 73 |
| | 粗死亡率 | 8 | 人/每十萬人 | 762.0 | 1,095.2 | 763.1 | 1,074.9 |
| | 惡性腫瘤 | | 人/每十萬人 | 201.4 | 325.5 | 211.0 | 313.9 |
| | 肝和肝內膽管癌 | | 人/每十萬人 | 25.7 | 56.8 | 26.9 | 52.2 |
| | 氣管、支氣管和肺癌 | | 人/每十萬人 | 35.9 | 60.7 | 35.9 | 60.7 |
| | 結腸、直腸和肛門癌 | | 人/每十萬人 | 29.6 | 41.6 | 30.2 | 42.6 |
| | 女性乳房癌 | | 人/每十萬人 | 29.8 | -- | 29.5 | -- |
| | 口腔癌 | | 人/每十萬人 | 2.4 | 36.0 | 2.2 | 35.1 |
| | 前列腺(攝護腺)癌 | | 人/每十萬人 | -- | 19.6 | -- | 16.5 |
| | 胃癌 | | 人/每十萬人 | 6.7 | 11.6 | 6.6 | 12.2 |
| | 食道癌 | | 人/每十萬人 | 1.4 | 18.1 | 1.2 | 15.9 |
| | 胰臟癌 | | 人/每十萬人 | 11.6 | 15.6 | 14.1 | 17.3 |
| | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | | 人/每十萬人 | 5.4 | -- | 6.1 | -- |
| | 心臟疾病 | | 人/每十萬人 | 69.0 | 102.8 | 65.7 | 100.7 |
| | 肺炎 | | 人/每十萬人 | 59.8 | 95.4 | 69.6 | 97.1 |
| | 糖尿病 | | 人/每十萬人 | 47.0 | 52.1 | 42.3 | 52.3 |
| | 腦血管疾病 | | 人/每十萬人 | 49.3 | 67.2 | 48.9 | 72.1 |
| | 事故傷害 | | 人/每十萬人 | 19.6 | 44.8 | 19.0 | 42.5 |
| | 慢性下呼吸道疾病 | | 人/每十萬人 | 12.2 | 29.4 | 12.1 | 28.4 |
| | 慢性肝病及肝硬化 | | 人/每十萬人 | 9.9 | 24.3 | 10.1 | 24.2 |
| | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | | 人/每十萬人 | 23.3 | 24.5 | 24.4 | 25.9 |
| | 蓄意自我傷害（自殺） | | 人/每十萬人 | 13.5 | 23.5 | 13.9 | 23.0 |
| | 標準化死亡率 | 9 | 人/每十萬人 | 324.6 | 590.2 | 312.9 | 560.4 |
| | 惡性腫瘤 | | 人/每十萬人 | 90.7 | 169.3 | 90.6 | 158.7 |
| | 肝和肝內膽管癌 | | 人/每十萬人 | 10.3 | 29.6 | 10.3 | 25.6 |
| | 氣管、支氣管和肺癌 | | 人/每十萬人 | 15.1 | 30.4 | 16.1 | 30.0 |
| | 結腸、直腸和肛門癌 | | 人/每十萬人 | 13.1 | 21.4 | 12.7 | 21.4 |
| | 女性乳房癌 | | 人/每十萬人 | 15.0 | -- | 14.4 | -- |

| 類別 | 指標項目 | 序號 | 單位 | 113年 | | 114年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 |
| | 口腔癌 | | 人/每十萬人 | 1.0 | 19.6 | 1.0 | 19.3 |
| | 前列腺(攝護腺)癌 | | 人/每十萬人 | -- | 9.4 | -- | 7.5 |
| | 胃癌 | | 人/每十萬人 | 2.8 | 6.0 | 2.8 | 6.0 |
| | 食道癌 | | 人/每十萬人 | 0.7 | 9.8 | 0.5 | 8.5 |
| | 胰臟癌 | | 人/每十萬人 | 4.9 | 7.9 | 5.8 | 8.5 |
| | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | | 人/每十萬人 | 2.8 | -- | 2.8 | -- |
| | 心臟疾病 | | 人/每十萬人 | 26.7 | 54.1 | 24.5 | 51.7 |
| | 肺炎 | | 人/每十萬人 | 21.4 | 47.2 | 24.3 | 46.2 |
| | 糖尿病 | | 人/每十萬人 | 18.1 | 26.3 | 15.6 | 25.7 |
| | 腦血管疾病 | | 人/每十萬人 | 19.1 | 34.7 | 19.1 | 35.9 |
| | 事故傷害 | | 人/每十萬人 | 11.4 | 30.5 | 11.1 | 28.4 |
| | 慢性下呼吸道疾病 | | 人/每十萬人 | 4.4 | 14.3 | 4.5 | 13.4 |
| | 慢性肝病及肝硬化 | | 人/每十萬人 | 4.1 | 14.2 | 4.1 | 13.7 |
| | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | | 人/每十萬人 | 9.2 | 12.3 | 8.9 | 12.6 |
| | 蓄意自我傷害（自殺） | | 人/每十萬人 | 10.3 | 18.3 | 10.8 | 17.4 |
| 疾病治療統計 | HIV感染者存活人數 | 10 | 人 | 213 | 4,686 | 223 | 4,746 |
| | HIV感染者死亡人數 | 11 | 人 | 91 | 1,248 | 96 | 1,308 |
| | AIDS發病者存活人數 | 12 | 人 | 95 | 2,061 | 99 | 2,106 |
| | AIDS發病者死亡人數 | 13 | 人 | 52 | 752 | 57 | 793 |
| 疾病預防統計 | 子宮頸抹片篩檢人數(30~69歲) | 14 | 人 | 237,640 | -- | 248,580 | -- |
| | 子宮頸抹片篩檢率 | 15 | % | 27.51 | -- | 28.8 | -- |
| | 乳癌篩檢人數 | 16 | 人 | 102,314 | -- | 101,804 | -- |
| | 乳癌防治篩檢率 | 17 | % | 18.6 | -- | 17.8 | -- |
| | 自殺個案通報數人次 | 18 | 人次 | 4,032 | 2,054 | 4,210 | 2,030 |
| | 移工參加健檢合格人數 | 19 | 人 | 33,030 | 35,047 | 36,757 | 39,411 |
| | 移工參加健檢不合格人數 | 20 | 人 | 105 | 182 | 102 | 178 |
| | 移工健檢不合格率 | 21 | % | 0.32 | 0.52 | 0.19 | 0.41 |
| | 移工依規定健檢率 | 22 | % | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 100.00 |