# 高雄市政府衛生局統計通報

# 114 年各縣市惡性腫瘤死因統計地圖

以衛福部發布114年各縣市惡性腫瘤每十萬人標準化死亡率觀察，最高為雲林縣138.5人，最低為新竹市86.5人，最高為最低者之1.6倍，本市以121.8人居第9高，惟仍為6都最次高者，僅低於台南市之126.9。考量部分縣市因人口規模較小，致死因資料各年間變動較大，為消彌資料跳動過大影響分析結果，本文以下有關死亡率資料除特別註明外，均採3年移動平均數呈現，例如114年資料係112年至114年3年之算術平均數。

**一、114 年各縣市惡性腫瘤之標準化死亡率，以台東縣、花蓮縣及屏東縣較高，連江縣、台北市及金門縣較低。**

114年各縣市惡性腫瘤每十萬人標準化死亡率，以嘉義縣140.8人最高，次為台東縣140.6人，及雲林縣139.7人。最低為金門縣僅89.4人，次為台北市91.1人，及新竹市92.7人。本市125.0人則排名第7高。（詳表1、圖1）。

表1. 114年各縣市惡性腫瘤標準化死亡率

單位：人/十萬人


| 縣市別 | 標準化死亡率 | 縣市別 | 標準化死亡率 | 縣市別 | 標準化死亡率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | 140.8 | 南投縣 | 122.4 | 新竹縣 | 101.0 |
| 台東縣 | 140.6 | 彰化縣 | 120.5 | 桃園市 | 98.5 |
| 雲林縣 | 139.7 | 嘉義市 | 117.7 | 連江縣 | 96.5 |
| 屏東縣 | 136.1 | 宜蘭縣 | 115.8 | 新竹市 | 92.7 |
| 花蓮縣 | 133.3 | 基隆市 | 115.5 | 台北市 | 91.1 |
| 台南市 | 126.7 | 台中市 | 114.0 | 金門縣 | 89.4 |
| 高雄市 | 125.0 | 澎湖縣 | 112.4 | | |
| 苗栗縣 | 123.7 | 新北市 | 104.5 | | |

資料來源：由衛福部統計處資料設算。

# 高雄市政府衛生局統計通報

# 114 年各縣市惡性腫瘤死因統計地圖

**圖**1. 114年各縣市惡性腫瘤每十萬人標準化死亡率




**二、114年本市惡性腫瘤標準化死亡率男性居各縣市第6高，及6都最高者，女性居第5高，且為6都次高者。**

若依性別觀察，雲林縣、嘉義縣及台東縣為男性前 3 高，台東縣、屏東縣及台南市則為女性較高者。本市男性 165.6 人居第 6 高,6 都中為最高者。女性 90.6 人則居第 5 高，且為 6 都次高者，僅低於台南市。(詳表 2)

# 高雄市政府衛生局統計通報

# 114 年各縣市惡性腫瘤死因統計地圖

表 2. 114 年各縣市惡性腫瘤每十萬人標準化死亡率-依性別

| 排名 | 縣市別 | 標準化死亡率男 | 縣市別 | 標準化死亡率女 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲林縣 | 194.7 | 台東縣 | 98.1 |
| 2 | 嘉義縣 | 192.0 | 屏東縣 | 94.9 |
| 3 | 台東縣 | 186.1 | 台南市 | 94.2 |
| 4 | 屏東縣 | 180.8 | 花蓮縣 | 93.0 |
| 5 | 花蓮縣 | 178.5 | 高雄市 | 90.6 |
| 6 | 高雄市 | 165.6 | 嘉義縣 | 90.2 |
| 7 | 南投縣 | 164.9 | 苗栗縣 | 89.1 |
| 8 | 台南市 | 164.1 | 台中市 | 87.8 |
| 9 | 苗栗縣 | 159.6 | 宜蘭縣 | 86.7 |
| 10 | 彰化縣 | 159.3 | 雲林縣 | 86.2 |
| 11 | 嘉義市 | 157.7 | 嘉義市 | 85.4 |
| 12 | 基隆市 | 153.6 | 彰化縣 | 85.3 |
| 13 | 澎湖縣 | 150.4 | 基隆市 | 83.8 |
| 14 | 宜蘭縣 | 147.9 | 南投縣 | 82.5 |
| 15 | 台中市 | 145.8 | 新北市 | 79.2 |
| 16 | 新北市 | 136.0 | 澎湖縣 | 78.1 |
| 17 | 桃園市 | 126.9 | 新竹縣 | 77.5 |
| 18 | 新竹縣 | 125.7 | 台北市 | 75.5 |
| 19 | 金門縣 | 119.0 | 新竹市 | 74.8 |
| 20 | 新竹市 | 114.6 | 桃園市 | 74.5 |
| 21 | 台北市 | 111.4 | 連江縣 | 69.0 |
| 22 | 連江縣 | 110.9 | 金門縣 | 62.8 |

資料來源：由衛福部統計處資料設算。