



# 高雄市政府衛生局統計通報

## 高雄市原住民十大死因概況

一、本市 110 年原住民死亡人數 220 人，標準化死亡率每十萬人口 691.4 人比 109 年 658.6 人增加 32.8 人，以惡性腫瘤死亡人數 58 人位居首位，占比 26.4%；癌症（惡性腫瘤）標準化死亡率中以「肝和肝內膽管癌」每十萬人口 38.6 人占最多數。

110 年本市原住民死亡 220 人，比 109 年死亡人數 204 人增加 16 人，粗死亡率每十萬人口 611.4 人高於 109 年 575 人約 36.4 人，標準化死亡率每十萬人口 691.4 人相較 109 年每十萬人口 658.6 人增加 32.8 人。

前十大死因排序以惡性腫瘤 58 人（占 26.4%）居冠，心臟疾病（高血壓性疾病除外）26 人（占 11.8%）居次，肺炎 17 人（占 7.7%）位居第三順位（詳表 1）。

表 1、高雄市 110 年原住民十大主要死因

順位	死亡原因	死亡人數	粗死亡率	人、人/每十萬人口、%	
				標準化死亡率	占總體比例
	所有死亡原因	220	611.4	691.4	100.0
1	惡性腫瘤	58	161.2	172.5	26.4
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	26	72.3	88.6	11.8
3	肺炎	17	47.2	65.5	7.7
4	腦血管疾病	16	44.5	51.3	7.3
5	慢性肝病及肝硬化	14	38.9	38.2	6.4
6	事故傷害	11	30.6	35.7	5.0
7	糖尿病	10	27.8	30.9	4.5
8	高血壓性疾病	10	27.8	33.5	4.5
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	16.7	18.9	2.7
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	13.9	13.5	2.3

資料來源：衛生福利部統計處


就癌症（惡性腫瘤）標準化死亡率觀察，以「肝和肝內膽管癌」每十萬人口 38.6 人占最多數，「女性乳房癌」每十萬人口 34 人次之，「氣管、支氣管和肺癌」每十萬人口 32.6 人再次之（詳圖 1）。



# 高雄市政府衛生局統計通報

## 高雄市原住民十大死因概況

圖 1、高雄市 110 年原住民主要死因




資料來源：衛生福利部統計處

二、六都之中，本市 110 年原住民男性及女性死亡人數皆排行第三名，僅次於桃園市及新北市；本市 108 至 110 年原住民死因均以「惡性腫瘤」人數最多，占總體比例均超過 2 成 5。

六都之中，本市 110 年原住民男性死亡人數 119 人，女性死亡人數 101 人皆排行第三名，僅次於桃園市及新北市（詳圖 2）。

圖 2、全國原住民死亡概況-按六都分



資料來源：衛生福利部統計處



# 高雄市政府衛生局統計通報

## 高雄市原住民十大死因概況

本市 108 年至 110 年原住民死因均以「惡性腫瘤」人數最多，占總體比例均超過 2 成 5，與上年度標準化死亡率比較增減以「惡性腫瘤」減少每十萬人口 14 人降幅最大，而「肺炎」增加每十萬人口 40.8 人增幅最多（詳表 2）。

表 2、本市 108-110 年原住民死亡概況

死亡原因	人、人/每十萬人口、%							
	108 年		109 年			110 年		
	死亡人數	標準化死亡率	死亡人數	標準化死亡率	與上年度標準化死亡率比較增減	死亡人數	標準化死亡率	與上年度標準化死亡率比較增減
所有死亡原因	221	779.8	204	658.6	-121.2	220	691.4	32.8
惡性腫瘤	57	175.0	63	186.5	11.4	58	172.5	-14.0
心臟疾病(高血壓性疾病除外)	18	75.0	16	62.2	-12.8	26	88.6	26.5
肺炎	16	67.3	7	24.7	-42.6	17	65.5	40.8
腦血管疾病	11	49.6	20	65.2	15.7	16	51.3	-13.9
事故傷害	12	37.5	11	29.8	-7.7	11	35.7	5.9
糖尿病	11	31.3	11	40.3	9.0	10	30.9	-9.4
蓄意自我傷害(自殺)	6	15.6	3	7.5	-8.1	5	12.6	5.1

資料來源：衛生福利部統計處