

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

高雄市常見行道樹導覽手冊 / 海平面文化創意有限公司企劃製作。— 高雄市：高市工務局養工處，2013.02

面：公分

ISBN 978-986-03-6054-7(平裝)

1.行道樹 2.高雄市

436.13333

102002273

高雄市常見行道樹導覽手冊

發行單位：高雄市政府工務局養護工程處

高雄市苓雅區四維三路2號5樓

TEL (07)337-3334

發行人：趙建喬

編審小組：許瑞娟、王妙珍、李淑美、李郁淳、李靜蕙、陳建竹、洪志忠、陳士豪

照片提供：史乾佑、莊溪、許斐清、藍本榮、張敏儀、王妙珍、李淑美、盧宏文、陳士豪、王臻瑜、林昀熹、凌卓民、蔡淑真

植栽顧問：陳德順

企劃製作：海平面文化創意有限公司

出版日期：2013年02月

定價：新台幣450元

GPN：1010200284

ISBN：978-986-03-6054-7



本著作係採用 創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣 授權條款授權，僅限於非營利、禁止改作且標示著作人姓名之條件下，得利用本著作。

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Taiwan (CC BY-NC-ND 3.0) The work can be freely shared and provided it used for noncommercial purposes and no there are derivative works.



風鈴木



海棗



水黃皮



黃槐

高雄市政府

四維行政中心 80203高雄市苓雅區四維三路2號 (07)336-8333

鳳山行政中心 83001高雄市鳳山區光復路二段132號 (07)3799-5678

24小時服務專線

四維行政中心 1999、(07)335-8080

鳳山行政中心 0800-733-833

GPN 1010200284

ISBN 978-986036054-7



9 789860 360547

高雄市常見行道樹導覽手冊

高雄市政府工務局養護工程處



高雄市
常見
行道樹
導覽手冊





漫步行道樹下

四季如意幸福



高雄擁有山、海、河、港，天然條件得天獨厚，近年也正朝向生態城市的目標邁進。在高雄，所謂「生態」建設，不僅止於特定的濕地、園區、建築，「生態」更深入融進市民生活的每一個角落。尤其身為台灣第一個加入 ICLEI（地方環境行動國際委員會）會員的城市，高雄更肩負著成為東南亞氣候變遷與永續發展生態城市標竿的使命。

隨處可見的行道樹就是高雄市生態建設重要的一環，城市中大小街道所形成的線狀綠帶，將高雄的自然生態區塊，如：大高雄濕地生態廊道、田寮月世界埕地形、美濃黃蝶翠谷、雙溪地區，以及遍布市區的公園綠地、城市花田等串連在一起，讓城市的生態環境品質得以全面連結並逐步提升。



同時市府團隊在建設中亦注入美學手法，以綠蔭及各色花木，讓街道在一年四季間呈現多樣的色彩。像是粉嫩的紅花風鈴木、羊蹄甲，以及亮麗的火焰木，即為市區與山林間帶來春天的浪漫繽紛；串串澄黃的阿勃勒、一片火紅的鳳凰木，與灑落滿地金黃花瓣的印度紫檀，則讓城市夏日充滿活力；而台灣原生種的欒樹，在怡人秋風中上演色彩豐富的變裝秀；色澤濃郁的豔紫荊與滿樹桃紅的美人樹，更陪伴著市民度過神采奕奕的冬天。

這些行道樹，讓高雄成為一座清新又美麗的城市，也讓高雄的生活充滿美好而確切的幸福。高雄市不僅於 2012 年國際宜居城市（Liveable Communities）獎獲得一金、一銀、三銅的佳績，更朝著 2050 年達到減碳 80% 的目標前進，在邁向低碳健康城市的同時，相信每位生活在高雄、造訪高雄的朋友都能感受到，每當漫步在高雄的行道樹下，享受林蔭與色彩的時刻，不論哪個季節，都是人生最美好的時節！



高雄市長 **陳菊**





高雄街道風格

人文美學展現



行走或乘車行駛於高雄寬敞而筆直的街道間，即使南台灣的陽光熱情而直接，卻總有成排的行道樹提供清涼降溫的遮蔭，而在樹梢間傾瀉舞動的燦爛光影，更為市民帶來心情的愉悅舒暢！

行道樹有淨化都市空氣、調節微氣候、減少噪音、提高行車安全、美化市容、陶冶性情及增進精神健康等多重功能。它們除

了提供遮蔭，更是動、植物的生長空間，具有城市生態保育功能。同時，樹木往往需經數十年的悉心培育，才能茁壯成為林蔭大道或綠色隧道，因此行道樹也在漫長歲月中，見證了城市的發展，甚至成為地方文化的一部分，可說是市民共有的珍貴綠色資產。

高雄市在不同道路上種植著各異其趣的行道樹，讓街道呈現出多元獨特的風格。例如二十年前種下的雨豆樹，已使大順路成為有如熱情展開雙臂的綠色隧道，迎接過往旅人；美術館園區及凹仔底森林公園周邊道路，則因小葉欖仁筆直青翠的身影，讓人們也跟著精神抖擻；杉林月光山隧道外的火焰木，在開花時節充分展現出高雄山間的活力與熱情；而民權路、民生路台灣欖樹綠園道與四維路林蔭大道，更在寬敞舒適的視覺與體驗中，展現高雄這座城市的開闊大器。



「水」與「綠」是市府團隊建構城市空間的思維主軸，行道樹綠帶的規劃，便是市政建設融合人文美學具體而微的展現；尤其近年高雄市公共建設多次榮獲如「建築園冶獎」、「國家卓越建設獎」、「全球卓越建設獎」、「國際宜居城市獎」、「公共工程金質獎」、「中華建築金石獎」等國內外獎項肯定，不但帶給工務團隊很大鼓勵，更顯示高雄市民的生活品質正迅速提升，細細品味行道樹為高雄街道帶來獨特風格之同時，高雄成為生態城市的進程又往前跨了一步！

高雄市政府工務局局長

楊明州

植物形態觀察

認識我們身邊的行道樹，就從它們的外觀開始。最容易被觀察的，就是樹木的葉、花與果實。本單元介紹常見的各種葉、花、果之型態，供民眾觀察時用以對照、辨別。

葉——葉是樹木行光合作用的營養器官，在觀察植物時多半由葉子開始，因此也可說是樹木的「名片」。觀察時可由葉形、葉緣與葉序（葉子生長的排序方式）來辨認。

花——花是植物的繁殖器官。有些植物葉形、樹形相近，這時可由其花朵區別。觀察時可由花序（指花排列於花軸上的次序；個別花的柄叫花梗，整個花枝的軸稱總花軸）以及花冠形狀（單朵花的形狀）認出不同植物。

果實——孕育種子的果實也是植物的繁殖器官，通常是在雌花受精後由子房發育而成，但也有由萼和花托形成的假果，或是裸子植物的毬果等；種類繁多，令人讚嘆造物之奧妙。

目錄

漫步行道樹下 四季如意幸福	2
高雄街道風格 人文美學展現	4
植物形態觀察	7
認識高雄行道樹.....	10
賞花行道樹	12
觀葉遮蔭行道樹	46
濱海植物與其他	88
自行車道沿線行道樹之旅	104
索引	119
高雄市常見行道樹索引	
行道樹路段介紹	
城市美學 從關心身旁行道樹開始	127

葉形—單葉



植物形態觀察

葉形—複葉



單身複葉 三出複葉 掌狀複葉 奇數羽狀複葉 偶數羽狀複葉

葉序



互生 對生 輪生



二回羽狀複葉



三回羽狀複葉

葉緣




全緣 圓鋸齒狀 齒牙狀 鋸齒狀 重鋸齒狀




微波狀 深波狀 波皺狀 緣具纖毛狀 掌狀深裂 深裂狀

植物形態觀察

花序



穗狀花序 總狀花序 莖荑花序 繖房花序 繖形花序 複繖形花序



頭狀花序 肉穗花序 聚繖花序 輪繖花序 圓錐花序 密錐花序 隱頭花序

花冠



盆形 輪形 漏斗形



鐘形 壺形 筒形 舌形



唇形 蝶形 十字形

果實




仁果 分離果 堅果



蓇葖果 核果 漿果



瘦果 翅果



蒴果 蓋果 長角果 莢果 節果 隱花果



認識高雄 行道樹

賞花行道樹	12
觀葉與遮蔭行道樹	46
濱海植物與其他	88

生活在城市中，滿眼綠意的林蔭大道或是色彩繽紛的開花樹木，總是為工作或上學的路途增添許多美好體驗與記憶；即使艷陽高照的日子，樹梢間灑落的陽光卻能讓身心都立即舒緩，而當花季到來，成排的開花行道樹更讓城市隨四季有了豐富的表情。

然而對於這些時時陪伴在我們身邊的行道樹，我們瞭解多少呢？本書藉由「賞花行道樹」、「觀葉與遮蔭行道樹」與「濱海與其他行道樹」等三大類別，來介紹高雄市內常見的行道樹，部分相近的樹種為便於比較，則會安排在一起。

每種行道樹之介紹，皆包含該樹種之學名、科別、生物特徵、整體特色，相關小故事、傳說，以及生態知識等；同時文中註有主要觀賞路段，市民朋友可以依照花季、天氣或心情來規劃出門路線，享受高雄行道樹所帶來美好的一天。



大花紫薇

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.



科名：千屈菜科

別名：大葉紫薇

原產地：熱帶亞洲

樹：落葉喬木，高可達 24 公尺，樹皮黑褐色。

葉：橢圓形至長橢圓形，平滑無毛。

花：5 至 7 月開花，大花豔麗，圓錐花序頂生，花瓣 6 枚，紫紅色。

果：蒴果直徑約為 3.5 公分，種子扁平。



大花紫薇在紫薇屬 53 個種當中，為葉、花最大且較豔麗者，但是它的花並非一成不變的紫，而是由清晨的玫瑰紅漸漸轉為紫紅色，替高雄街道帶來變化萬千的姘紫嫣紅。生長快速、抗污染又遮蔭，還能開出滿枝頭的美艷花朵，讓它成為受歡迎的觀賞樹與行道樹。花落後，枝頭豐盈的果實又是城市中另一幅風景。

觀賞路段

三民區：九如路、中華路、澄清路（九如一路至本館路）

前金區：中華路、成功路

鹽埕區：七賢二路

九芎

Lagerstroemia subcostata Kochne



科名：千屈菜科
 別名：拘那花、南紫薇、怕癢樹
 原產地：台灣、中國大陸
 樹：落葉灌木或小喬木，高 2 至 8 公尺，樹皮白色，小枝近圓柱形或有約 4 條稜線，被微毛或無毛。
 葉：對生或近對生，上部的葉互生，矩圓形或矩圓狀披針形，長 4 至 8 公分，寬 2 至 4 公分，無毛或上面散生柔毛。
 花：花期 7 至 9 月，圓錐花序頂生，花序軸被微柔毛，花白色，直徑約 1 公分，花萼半圓形，外面具 10 至 12 條稍微凸起縱肋；花瓣 5 到 6 枚，近圓形，呈皺縮狀，寬 0.35 公分，邊緣有不規則缺刻。
 果：蒴果近橢圓形或卵狀橢圓形，直徑約 0.7 公分，呈 4 至 5 瓣裂。

身為台灣原生樹種的九芎，有超強的生命力，台灣各地如宜蘭、新竹、美濃等地都有以九芎或芎林為名的聚落。由於生長快速，每年脫一次皮，樹皮剝落後枝幹由原本的茶褐色變為白色，據說，因為秋冬含水量少，撫樹時枝葉會顫動如同人怕癢，所以又有「怕癢樹」之稱。

觀賞路段 六龜區：台 20 線 65K-66K

吉貝棉

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.



科名：木棉科
 別名：非洲木棉
 原產地：南美洲、非洲
 樹：落葉大喬木，高可達 70 公尺，枝輪生，樹幹初時有瘤刺。
 葉：掌狀複葉，小葉 5 至 9 枚，橢圓狀披針形，先端為尾狀漸尖形，托葉緣早落。
 花：花期 11 至 12 月，白色，花瓣 5 枚，長橢圓形先端鈍，雄蕊多枚，花瓣長，總花梗 2 至 8 枚簇生葉腋。
 果：蒴果長 7.5 至 15 公分，5 瓣裂內有多數被有棉纖維種子。

吉貝棉長得與高雄人熟悉的木棉非常相似，但是樹形比木棉更高大，吉貝棉樹幹的下半部，長有瘤刺，樹皮顏色也比較綠，而且還會長出板根。吉貝棉的木材可以用來做火柴、箱櫃，木屐等，過去還是製作彈藥箱的板材。

觀賞路段 苓雅區：四維路（苓南路至光華路）



科名：木棉科
 別名：斑芝樹、英雄樹
 原產地：印度、中國、東南亞

樹：落葉大喬木，樹高可達 25 公尺，樹幹上具有多數粗短的圓錐形瘤刺，枝輪生。

葉：互生，掌狀複葉，小葉 5 至 7 枚，長橢圓形至長橢圓狀披針形，先端漸尖，全緣，托葉早落，冬季落葉。

花：花期 2 至 3 月，先葉而開，叢生於枝梢旁，花色橙紅，花瓣 5 枚，肉質，雄蕊多數，集合為 5 束，花開時滿樹花團錦簇；花朵花蜜極多，是極佳誘鳥植物。

果：蒴果為橢圓形，5 至 6 月成熟開裂。



木棉一年四季有不同形象，秋風一吹葉子便開始變黃，冬天枝桠光禿，天氣還暖時，霎時間枝桠就開滿了火紅的花。曾經是風靡全台的行道樹種，但由於肉質花瓣掉落後易造成行車不便，飛舞的棉絮也可能引起過敏，讓木棉漸漸消失於街道上。不過若種植在公園綠地，它還是很賞心悅目的觀賞樹種。



觀賞路段 楠梓區：清豐路（楠梓路至寶溪南街）
 德民路（藍昌路至高楠公路）

木棉小故事

木棉高大英挺的樹形，讓它有英雄樹的稱號，民國 60 年代末的一首民歌「木棉道」，讓木棉花盛開的形象深植人心。木棉蒴果內的種子纖維短，缺乏伸縮性，早年只能用作填充枕頭，近年日本開始研發木棉纖維織物；木棉樹材質鬆軟，以前用來製作蒸籠、箱櫃等，當時具有很高的經濟價值。



科名：木棉科
別名：巴西木棉、南美木棉
原產地：巴西、阿根廷
樹：落葉大喬木，高達 15 公尺以上，樹幹生有瘤狀刺，樹皮青綠色，樹幹基部肥大，側枝水平伸長。
葉：掌狀複葉，小葉 5 至 7 枚，有細鋸齒緣。
花：花期 9 至 11 月，先花後葉，花短總狀花序，腋生，紫紅色。
果：蒴果長橢圓形，種子具白色棉毛纖維。



美人樹在 1967 年引進台灣，由於同屬木棉科，在不開花時神似高雄人熟悉的木棉樹，木棉樹別名英雄樹，而美人樹開花綻放滿樹嬌豔粉紅，因而稱為美人樹。仔細觀察，木棉樹皮呈灰褐色，美人樹則為綠色；小葉葉緣有細鋸齒狀，也與木棉的全緣葉緣不同。



觀賞路段

三民區：愛河之心周邊
苓雅區：成功路（新光路至青年二路）
鳳山區：國泰路
岡山區：高 28 嘉新東路



科名：紫葳科

別名：噴泉樹

原產地：熱帶非洲

樹：常綠喬木，高達 20 公尺，樹冠茂密。

葉：奇數羽狀複葉或偶有三出複葉，小葉全緣，9 至 19 枚。

花：花期 2 月～ 4 月，在南部會提早開花，甚至一年四季皆開花；頂生圓錐花序或總狀花序，花形大；闊鐘形花朵密集生於枝端，大紅色的花，遠遠望去酷似燃燒的火球，極為豔麗。



火焰木在 1937 年引進台灣，直到近 20 年才做為行道樹種，源自非洲的火焰木在南台灣生長特別好，花期也較北部長，花朵不僅大而且花型奇特，革質花萼彎曲，鐘形花冠由外往內開，近觀彷彿一朵蓮花。



觀賞路段

苓雅區：三多路（高速公路至中正路）

鼓山區：鼓山路（臨海二路至青峰路）

杉林區：清水路（台 21 線）

火焰木小故事

原產於非洲的火焰木，因為花萼可以儲存雨水、露水，又被稱為噴泉樹。而花朵有豐沛的花蜜，是極佳的誘鳥植物，常可見白頭翁在花四周打轉食蜜。若撿起地上落花，在花底端看見小洞，大多就是鳥兒啄洞採蜜的傑作。



科名：無患子科

別名：苦苓舅

原產地：台灣

樹：落葉喬木，高 18 公尺，樹冠廣圓頭形。

葉：二回羽狀複葉，大小變異大，長 6 至 10 公分，寬 2 至 3 公分，網鋸齒緣。

花：初秋開頂生圓錐花狀，金黃色花叢。

果：蒴果膨大燈籠狀，由粉紅轉紅褐，也有白色品種。



台灣欒樹是台灣特有原生樹種，抗污染性高，是城市中極受歡迎的行道樹種，不開花時羽狀複葉與苦楝（苦苓）十分相似，因而又被稱為苦苓舅、苦苓公。在入秋後，枝頭綻放出黃色小花，花期甚短大約只有兩週，接著結起紅褐色蒴果，霎時間整條街道被染成一片嫩紅色，堪稱是最有秋味的城市風景！

觀賞路段

苓雅區：民權路

新興區：民生路

六龜區：三民路

大寮區：光明路

楠梓區：興楠路



台灣欒樹小故事

台灣欒樹讓位處熱帶的高雄，也能享受美麗的秋紅景緻，同時還是利用台灣原生樹種作行道樹，而與生態環境融合的典範！每到春夏台灣欒樹總吸引赤腰燕盤旋，原來是紅姬緣椿象喜食欒樹枝幹與種子汁液，而赤腰燕趕來吃群集的椿象大餐。

印度紫檀

Pterocarpus indicus Willd.



科名：蝶形花科

別名：紫檀

原產地：熱帶亞洲

樹：落葉喬木，偶有常綠者，高可達 15 至 25 公尺，樹冠傘狀，樹幹通直，有淺縱剝落裂紋。

葉：奇數羽狀複葉，下垂互生，革質光亮。

花：花期 4 至 5 月間，圓錐花序腋生或頂生，蝶形黃色小花具芳香。

果：蒴果扁圓形具寬翅，像極了小飛碟，可乘風傳播至各地生長。

樹形優美的印度紫檀是四季分明的行道樹，秋冬落葉，春天冒出嫩葉，夏天濃密的樹冠是很好的遮蔭。花期時，開花與落花更是將樹頭與地面染得一片鵝黃，既然花為黃色，為何叫紫檀呢？原來剖開樹幹後會流出紫紅汁液而名之。印度紫檀與菲律賓紫檀長得極為相似，差別在於菲律賓紫檀的翅果上，長滿凸出小刺。

觀賞路段 三民區：九如路（同盟路至民族路）
大順路（河堤南路至九如路）
小港區：高坪 23 路（高坪 18 路至太平路）
苓雅區：三多路（光華路至國泰路）
楠梓區：卓越路（高雄第一科大西端至東端）


印度紫檀小故事

「檀」在梵語中是布施的意思，其木質堅硬、香氣芬芳，民間更相信可以驅邪避凶。血赤色的心材，俗稱紅木，是很好的傢俱材料。



羊蹄甲

Bauhinia variegata L.



科名：蘇木科

別名：蘭花木

原產地：中國大陸、東亞

樹：落葉喬木，高可達 12 公尺。

葉：單身複葉，互生，葉圓形，先端如羊蹄狀深凹；葉幼枝時具有絨毛，老漸變光滑。

花：花期 3 至 5 月，落葉之後開花，花具芳香，粉紅色與紫紅色相間。

果：莢果條形長 15 至 25 公分，扁平，有種子 10 至 15 粒。

羊蹄甲花開於落葉之後，在滿頭枯枝間綻放粉紅、紫紅的花朵，由於花形酷似洋蘭（Cattleya），故英文有 Orchid tree 蘭花木之稱。

觀賞路段 小港區：台機路（光和路至大業北路）
美濃區：中正路一段（181 縣道）

洋紫荊

Bauhinia purpurea L.



科名：蘇木科
 別名：紫花羊蹄甲
 原產地：印度、斯里蘭卡、中國南部
 樹：小喬木，枝條無毛。
 葉：葉寬卵形至圓形，約6至12公分，兩面無毛，先端二裂；裂片通常向中肋彎折，先端圓形至銳形。
 花：花期11月，花瓣窄披針形，粉紅色轉白色或淺紫色。
 果：莢果長20至25公分。



羊蹄甲、洋紫荊、豔紫荊的區別

項目	羊蹄甲	洋紫荊	豔紫荊
花色	粉紅至紫	粉白	薔薇紅色或紅紫
花期	3月前後	11月前後	10月至4月前後
花序	短總狀或繖房，腋生	繖房，腋生或頂生	總狀，腋生或頂
雄蕊數	5~6	3~4	5
花冠(公分)	6~8，較小	7~10	12~15，最大
葉長(公分)	6~8，較小	7~10	8~15，最大
莢果	數量少	最常見	不結果

觀賞路段 苓雅區：凱旋一路（憲政路至建國路）

豔紫荊

Bauhinia × blakeana Dunn.



科名：蘇木科
 別名：香港櫻花
 原產地：香港（天然雜交種
Bauhinia purpurea
 × *B. variegata*）
 樹：常綠喬木，枝條開展而下垂，高可達12公尺。
 葉：單身複葉，葉脈13條，排列如龍骨狀。
 花：花期於10月至翌年4月，兩性花，頂生總狀花序，薔薇紅色或紅紫色，花大豔麗芳香。
 果：為雜交3倍體，未見結果。

1908年於香港薄扶林近海邊破屋附近發現豔紫荊，以香港總督 Sir Henry Blake 之姓氏命名。



觀賞路段

苓雅區：凱旋路（三多路至建國路）
 鼓山區：華榮路（平交道至明誠路）
 甲仙區：新興路
 鳥松區：濱湖路（大埤路至文前路）

雜交三倍體

指含有三組染色體的細胞或生物。三倍體生物因為難以進行減數分裂形成配子，故未見結果。



阿勃勒落花時，黃色花瓣隨風飄落，英文名字就叫做黃金雨（Golden Shower Tree），阿勃勒黑黑長長的圓柱狀莢果，像極了西遊記中倒掛在枝頭的人蔘果。莢果十分堅硬，不過只要泡在水中一陣子，就可以軟化，莢果中還有像瀝青般黏黏的物質可以保護種子，在潮濕溫暖的雨季來臨時發芽。

觀賞路段

苓雅區：和平路（五福路至三多路）
光華路、林德街、廣州一街
鼓山區：九如四路
（九如大橋至左營圓環）
美濃區：成功路、泰安路、福美路



藝術中的阿勃勒

阿勃勒肯定是高雄人再熟悉不過的行道樹，不管是校園、街道上或公園裡都能瞧見這熟悉的身影。嫩黃的花串隨風搖曳，迎接夏天的到來，它還是現代詩人吟詠的對象，像是余光中、向陽都曾為阿勃勒作詩呢。

科名：蘇木科

別名：波斯皂莢

原產地：印度、緬甸、斯里蘭卡

樹：落葉喬木，高達 20 公尺，樹皮灰白色，老時暗褐色。

葉：偶數羽狀複葉，小葉 4 至 8 對，寬卵形或橢圓狀卵形，先端漸鈍尖。

花：5 到 6 月花開，總狀花序，腋生於枝端，長 30 至 50 公分下垂，花純黃、金黃。

果：果實成熟需一年，翌年 4 月成熟，常見今年的花與去年的莢果並存於枝上；莢果為圓柱狀，長 30 到 72 公分，種子味甜可食。

雨豆樹

Albizia saman (Jacq.) F.Muell.



科名：含羞草科

原產地：熱帶美洲


樹：落葉大喬木，高達 30 公尺。

葉：二回偶數羽狀複葉，羽片 2 至 6 對，

小葉 4 至 8 對，斜方形或卵狀長圓形。

花：花期 4 至 5 月，頭狀花序，頂生，總花梗長 10 至 12.5 公分，球形花冠，長約 1.7 公分，雄蕊粉紅色，被絲狀絨毛，雄蕊 20 枚。

果：莢果無柄，長 15 至 20 公分，7 至 8 月果熟。



樹形優美的雨豆樹擁有寬廣的樹冠層，花期時如粉撲狀的花朵帶著粉紅色，點綴在一片綠海之中，夏季茂盛的枝葉形成良好的遮蔭，在大順路一整排的雨豆樹樹齡已達 20 年，綿延不絕的樹冠成了都市中難得一見綠色隧道。

觀賞路段 三民區：大順路（自由路至九如路）

小港區：中山四路（平和東路至飛機路）

苓雅區：中正路（高速公路至建軍路）

刺桐

Erythrina variegata L. var. *orientalis* (L.) Merr.



科名：蝶形花科

別名：梯枯、木本象牙紅

原產地：台灣、中國大陸、

太平洋諸島、北澳、波里尼西亞、西

印度群島、東非、馬達加斯加

樹：落葉大喬木，高達 27 公尺，樹皮灰色，圓錐形有瘤刺。

葉：小葉 3 枚，互生。

花：花期 3 至 4 月，2 至 3 朵簇生排列成密集的總狀花序，花大深紅色。

果：果期 9 月，為念珠狀，種子暗紅色。

早春火紅的花朵，色豔奪目，一般緯度差一度花期早晚即差 5 天，所以在台灣本島刺桐尚未開花時，在蘭嶼已能看見花開繁茂的情景。

觀賞路段 旗津區：旗津二路、三路（廟前路至敦和街）

刺桐小故事

刺桐一年四季變化明顯，早春氣候還暖時先開花，接著新芽嫩葉冒出，再由秋天的濃綠到冬天葉片掉落，對早期原住民平埔族人來說，是重要的歲時象徵，〈番社采風圖考〉便記載「番無年歲，不辨四時，以刺桐花開為一度。」

花旗木

Cassia barkeriana Craib



- 科名：蘇木科
別名：泰國櫻花、三月櫻、陣雨花、陣雨樹
原產地：泰國
樹：落葉性大喬木，樹高可達 15 公尺，枝條平展長伸，分枝較少。
葉：偶數羽狀複葉，互生，小葉對生 10 對以上，卵狀長橢圓形，背面有絨毛。
花：春夏開花，花期達 2 個月，長穗狀花序，腋生，花瓣玫瑰紅色。
果：幼果綠色具絨毛，長條狀，熟果黑褐色。

原產泰國的花旗木 1973 年才引入台灣，在高雄美濃地區生長適應良好，盛開時節有如櫻花，遇雨則花落滿地情景浪漫。花色為豔麗的玫紅色，是 cassia 屬最美麗的樹種之一。



觀賞路段

六龜區：茂林國家風景區六龜遊客中心前
鼓山區：河西路與馬卡道路交接之槽化島

盾柱木

Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex Heyne



- 科名：蘇木科
別名：雙翅果
原產地：熱帶亞洲、澳洲
樹：落葉大喬木，高可達 25 公尺，小枝被柔毛。
葉：二回羽狀複葉 7 至 20 對，小葉 7 至 24 對，先端圓或微缺左右不對稱，12 月落葉，2 到 3 月展新葉。
花：花期 5 至 10 月，圓錐花序或腋生的總狀花序，花瓣 5 枚，黃色，倒卵形。
果：果熟 5 至 12 月，莢果狹矩圓形，扁而薄，有翅呈赤褐色，長約 10 公分。



盾柱木樹形高大挺直，常與同屬蘇木科的鳳凰木易混淆，兩者皆是二回羽狀複葉，冬季落葉枝桠光禿，但仔細近瞧，盾柱木的小枝被有紅褐色細絨，花期時，滿頭綻放溫柔婉約的黃色花朵，與熾焰的鳳凰木不同。木質莢果中藏有扁平的種子，邊緣具翅圍繞，也是雙翅果得名由來。



觀賞路段

左營區：翠華路
楠梓區：大學南路（藍昌路至德中路）
岡山區：聖森路
彌陀區：高 26 南寮路、高 23 海尾路



風鈴木

Tabebuia impetiginosa (Mart.exDC.) Standl.



洋紅風鈴木

紅花風鈴木

- 科名：紫葳科
別名：洋紅風鈴木
原產地：中南美洲
樹：落葉喬木，樹幹灰白色平滑。
葉：葉為掌狀複葉，小葉5枚，小葉長19至22公分、寬1.5至8.3公分，卵狀或長橢圓狀卵形，先端銳尖，基部楔形或心形，緣全緣或鋸齒，紙質，具毛。
花：花期12至3月，花頂生，圓錐花序或總狀花序單生，花冠漏斗狀鐘形，花色粉紅，花蕊4枚，雄蕊2枚。
果：蒴果扁平長橢圓形，成熟後裂開，帶翅的種子隨風到處飄散。

風鈴木種類繁多，其中的 *Tabebuia* 是最早引進台灣的系統，行道樹中常見的紫紅色花系的風鈴木有紅花風鈴木與洋紅風鈴木，春末至夏天開花的紅花風鈴木顏色較深，11月開花的洋紅風鈴木顏色較淺，盛開時如同成串風鈴掛吊在樹枝上，隨風搖曳如風鈴般美麗，故而命名之。

觀賞路段

苓雅區：中正路（河東路至建軍路）
前鎮區：和平二路（廣西路至一心路）
左營區：博愛路（文自路至華夏路）
新興區：七賢路
內門區：台3線實踐大學前



黃花風鈴木

Cybistax donnell smithii (Rose) Seib



攝影／張敏儀

- 科名：紫葳科
原產地：中南美洲
樹：常綠喬木，開花前短暫落葉，樹幹平滑灰白色。
葉：掌狀複葉，小葉7枚，長橢圓形至卵形。
花：花期5月，於新芽萌發前開花，頂生圓錐花序或總狀花序，花金黃色。
果：蒴果長橢圓形，少扁平，成熟時裂開，帶翅的種子隨風飄散各地繁殖。



攝影／張敏儀

Cybistax 屬一般是為紫紅色花系，黃花風鈴木屬於稀有金黃色的種類，原產於南美洲的黃花風鈴木，滿樹花開金黃十分美觀，常被栽作庭院用樹，性喜高溫多水的環境，十分適合台灣南部的氣候。

觀賞路段

楠梓區：土庫一路（土庫陸橋至旗楠路）、援中路

南洋櫻

Gliricidia sepium (Jacq) Kunth ex Walp.



科名：蝶形花科
 原產地：熱帶美洲
 樹：落葉喬木，樹高可達 14 公尺。
 葉：葉互生，奇數羽狀複葉，小葉對生，5 至 19 對，卵狀橢圓形，長 7 公分、寬 3 公分。
 花：早春開花，總狀花序腋生或簇生於短小舊枝節上，花淡紅色。旗瓣大、反捲，翼瓣鑷狀長橢圓形，龍骨瓣內曲。
 果：莢果長約 10 至 15 公分，闊線形、扁壓狀無翅，內含種子 6 至 9 枚。

雖然原產於熱帶美洲，不過卻是從南洋地區引入台灣，由於盛開時如同櫻花般美麗，而名為南洋櫻，但它與薔薇科的櫻花並無關係。早春時花先葉而綻放，粉紅花朵十分美觀。性喜高溫濕熱，是適合台灣南部氣候的觀賞樹種。

觀賞路段

鳳山區：衛武營都會公園

鳥松區：環澄清湖一帶

鹽埕區：五福路（高雄橋）



桃樹

Prunus Persica (L.) Batsch

科名：薔薇科
 別名：千桃、白桃
 原產地：中國大陸
 樹：落葉小喬木，小枝紅褐色或褐綠色。
 葉：葉橢圓狀披針形，先端漸長尖，基部闊楔形邊緣有粗鋸齒，無毛。
 花：花期 4 月，單生幾無柄，花瓣 5 枚，多粉紅色，變種有絳紅、緋紅、純白或紅白混雜等色，多為單瓣與重瓣 2 種。
 果：6 至 9 月果熟。



攝影／莊溪



攝影／莊溪

桃樹原產中國大陸中部、北部，喜陽光、耐旱耐寒，不喜水濕，由於桃子受消費者喜愛，台灣山區現也常見農人種植，如高雄的那瑪夏、桃源都是著名產區，花期時山間綻放的嬌柔花朵引人駐足。在民間，桃樹的枝幹具有避邪效果，因此古典中國式庭院也常見桃樹身影。

文學中的桃花

去年今日此門中

人面桃花相映紅

人面不知何處去

桃花依舊笑春風

～唐朝詩人崔護〈題都城南莊〉



李花



梅花



攝影／許斐清

觀賞路段

桃源區：台 20 線 (80K+500-94K、
96K-98K、104K-113K、117K-124K)

桃梅李的差異

桃葉卵狀披針形或矩圓狀披針形，花開於早春，核果卵球形有溝；梅葉矩圓狀倒卵形或橢圓狀倒卵形，花開於寒冬，花瓣卵形，有芳香，核果近球形，兩邊扁有溝；而李樹的葉矩圓狀倒卵形或橢圓狀倒卵形，花開於 3 至 4 月，核果卵球形，先端常尖，基部凹陷有深溝。

黃槐

Senna surattensis (Burm.f) Irwin & Barneby



科名：蘇木科

原產地：印度、澳洲、波里尼西亞

樹：常綠大灌木，高 5 至 7 公尺。

葉：偶數羽狀複葉，葉柄及最下位 2 至 3 對小葉間，其葉軸上有 2 至 3 枚棍棒狀腺體，小葉 14 至 18 枚，長橢圓形或卵形，長 2 至 5 公分，寬 1 至 1.5 公分，先端圓，微凹，基部圓，常偏斜，背面粉綠色。

花：花期 10 月至次年 3 月，總狀花序生於枝條上部的葉腋，長 5 至 8 公分，花黃色或深黃色，長 1.5 至 2 公分，雄蕊 10 枚。

果：莢果條形，全年開花結果，長 7 到 10 公分，寬 0.8 到 1.2 公分。

花朵耀眼的黃色，讓黃槐被稱為 Sunshine tree，適合做觀賞用樹。原產熱帶地區，引進台灣後，普遍栽植於低海拔地區。本種易與金邊黃槐混淆，黃槐花期較長，金邊黃槐於秋季開花，除了花期顯著差異外，金邊黃槐枝軟，葉緣黃金邊，果為念珠狀圓柱形，與黃槐的扁平念珠狀莢果亦是明顯差別。

觀賞路段 六龜區：台 20 線 (65K-66K)

棟樹

Melia azedarach L.

科名：棟科

別名：苦棟

原產地：台灣、中國大陸、印度、緬甸

樹：落葉喬木，高可達 15 至 20 公尺，樹皮縱裂。

葉：葉 2 至 3 回奇數羽狀複葉，互生，長約 20 至 40 公分，小葉卵形至橢圓形長 3 到 7 公分，寬 2 至 3 公分，邊緣有鈍鋸齒，幼時被星狀毛。

花：春夏開花，圓錐花序與葉等長，腋生，花紫色或淡紫色，長約 1 公分，花萼 5 裂，花瓣 5 枚，雄蕊 10 枚，花絲合生。

果：核果短矩圓狀至近球形，長 1.5 到 2 公分，淡黃色，果室 4 到 5 室，每室有種子 1 粒。



四季呈現不同風情的棟樹，是台灣本土樹種，春天開藍紫色花，有芳香，淡雅秀麗，秋冬葉轉為金黃色，遍生於平地與中低海拔山區，具抗旱性，能在貧瘠土地生長，樹皮、果實味苦等特點，高雄市勞工公園工殤紀念區旁便栽植許多棟樹，象徵勞工吃苦耐勞的精神。

觀賞路段 小港區：博學路（山明路至沿海路）
前鎮區：中山路（凱旋路至五甲路）

棟樹小故事

棟樹常在文學與民間故事出現，如席慕容《寫給幸福》、林雙不《深秋天涯異鄉人—安安靜靜莊秋雄》都以棟樹訴說對土地的懷念。民間故事中，棟樹便是受了臭頭皇帝朱元璋的詛咒，才會在冬天凋零。古時還有蛟龍怕棟葉的傳說，梁朝吳均《續齊諧記》便記載了楚人將投入江中給屈原的食物，塞入棟葉以避蛟龍偷食。



科名：蘇木科

原產地：馬達加斯加

樹：落葉大喬木，樹高 10 公尺，樹冠廣闊水平，向外伸長，大樹具有板根。

葉：二回羽狀複葉，有 20 至 50 對，長橢圓形，每羽片有小葉 40 到 80 枚，邊緣略反捲，2 至 3 月落葉。

花：5 至 7 月盛開，總狀花序頂生或腋生，花瓣 5 枚，花大鮮紅，有光澤，開放時一片火紅。

果：莢果條形，長 50 公分，寬 5 公分，木質，具多數種子。



鳳凰木的英文俗名為 Flame of the Forest(森林之火)，據說是因為以前有位航海家經過一座海島時，見到森林中花開正盛的鳳凰木火紅一片，便驚呼：森林大火！至於中文為何稱其「鳳凰木」，據傳是因此樹引入中國時，最早是在澳門鳳凰山種植而得名。台灣是在日治時代由日人引進。由於鳳凰木盛開的時節，正值盛夏、驪歌高唱的六月畢業季，於是蟬鳴不斷的「鳳凰花開季節」，就是台灣學子最難忘的回憶。

觀賞路段

三民區：中華路（同盟路至建國路）

鼓山區：中華一路（環河街至美術館東路；美術東五路至馬卡道路）

甲仙區：忠孝路

藝術中的鳳凰木

蓬萊五月此花燃

屋角牆頭道路邊

漫說石榴紅似火

鳳凰氣燄欲焚天

~台灣的前輩詩人葉榮鐘



緋櫻

Prunus campanulata Maxim



攝影／許斐清



攝影／莊溪



科名：薔薇科

別名：櫻花、山櫻花

原產地：台灣、中國大陸、琉球

樹：落葉小喬木，高達 5 至 10 公尺。

葉：葉較薄，卵形、橢圓狀卵形或卵狀矩圓形，長 4 至 9 公分，寬 2 至 3.5 公分，先端漸尖，邊緣有銳利細單或微重鋸齒，近頂端有 2 腺體。

花：冬春開花，花先葉而開，3 到 5 朵叢生葉腋，下垂，直徑 1.2 至 1.5 公分，深玫瑰色，花瓣倒卵形，先端凹，雄蕊多數，離生，比花瓣短。

果：核果卵球形，紅色，核平滑。

緋櫻是近年台灣春季賞花的要角之一，早春在海拔 500 公尺以上的山區渲染出一片紫紅的色彩。秋冬落葉，隔年在新葉長出前，花苞就已垂吊在枝頭，景緻極為浪漫。為山區常見誘鳥植物。



攝影／許斐清

觀賞路段 桃源區：台 20 線 (124K-145K)
那瑪夏區：瑪雅聯絡道

藍花楸

Jacaranda mimosifolia P.Don



科名：紫葳科

別名：非洲紫葳、巴西紫葳

原產地：阿根廷、玻利維亞

樹：半落葉喬木，可達 15 公尺。

葉：葉對生，2 回羽狀複葉，羽葉通常在 16 對以上，每一羽葉有小葉 14 至 24 對，小葉狹矩圓形，先端銳尖。

花：花期 4 至 6 月，圓錐花序頂生，花較大型，藍色，花二唇形，5 裂。

果：蒴果木質，扁圓形，種子有翅。



原產南美洲的藍花楸，引入台灣後，由於串串紫藍色花朵，成為常見行道樹與園藝花樹，一般栽培地區須經過寒冬春化作用，才會繁花盛放，開花時一片藍紫色，十分浪漫。未開花時，樹型酷似鳳凰木，但其葉為對生，鳳凰木為互生。藍花楸木質較軟，是製作木雕工藝品的材料。

觀賞路段 三民區：布里斯本公園
苓雅區：海邊路 (苓安路至五福路)
左營區：新庄仔路 (博愛路至河堤路)

鐵刀木

Senna siamea (Lamk.) H.S.Irwin & RC.Barneby



科名：蘇木科
別名：鐵道木
原產地：熱帶亞洲
樹：半落葉大喬木，高可達 22 公尺，樹皮灰白色，平滑，老時暗褐色粗糙。
葉：對生，偶數羽狀複葉，小葉 4 至 8 對，長橢圓形，先端較鈍，2 月落葉，3 月抽芽。
花：花期 9 至 10 月，花序圓錐花叢，花黃而芳香。
果：扁平近圓形黑褐色。

1896 年由印度引進，樹幹萌芽性極強，木材易燃、熱量高、火力強，且燃燒時沒有火花，是優良薪炭材料。每 3 至 5 年採伐一次，可連續利用數十年而不衰，種子耐貯，貯存十多年後，種子發芽率仍可達 20 ~ 30%。
由於喜陽光、耐旱，對土壤要求不高，是常見的觀賞與行道樹種。



觀賞路段

苓雅區：凱旋路（三多路至二聖路）
楠梓區：德民路（啟昌街至高楠公路）

鐵刀木小故事

日治末期日本人在高雄美濃雙溪谷地廣植鐵刀木，做為製作槍托及鐵道枕木的樹材，卻意外引來大量銀紋淡黃蝶產卵繁殖，形成黃蝶漫天飛舞的情景，是美濃雙溪黃蝶翠谷名稱的由來。

紅花鐵刀木

Cassia grandis L. f.



科名：蘇木科
別名：大果鐵刀木
原產地：熱帶美洲
樹：樹高可達 25 公尺，樹幹通直，樹枝初有柔毛或光滑無毛。
葉：偶數羽狀複葉長 12 至 25 公分，小葉 10 至 21 對，長橢圓形，總柄、葉背均被淡褐色絨毛。
花：春夏開花，總狀花序，腋生或頂生圓錐花叢，花 15 至 50 朵、紅色，先花後葉。
果：果莢扁圓筒形，長 40 至 60 公分，直徑約 3 至 4 公分。

攝影／藍本榮

紅花鐵刀木 1937 年 5 月由日本人引進美濃雙溪種植，常用作園藝景觀用樹及行道樹，花初開時為艷紅色再逐漸變成淡紅色，最後則轉變成橘紅色，其垂掛樹枝上的果實形似阿勃勒，但更為粗大。



攝影／藍本榮

觀賞路段 旗山區：旗山公園

土肉桂

Cinnamomum osmophloeum Kanehira



科名：樟科
別名：山肉桂、假肉桂
原產地：台灣

樹：常綠喬木，樹皮平滑富肉桂香氣。

葉：葉互生或近對生，革質、卵形或卵狀橢圓形，長8至10公分，寬3.5至5公分，先端漸尖、基部鈍或楔型、三出脈，脈之表面平，下面突起。

花：具繖花圓錐花序腋生。

果：果卵形長1公分。



土肉桂又名假肉桂，是台灣特有種的常綠木本植物，生長於400至1200公尺之中低海拔天然闊葉林中，在70年代，土肉桂就被認定為是肉桂的替代品。

觀賞路段 前金區：民生路中央分隔島間斷補植

土肉桂與陰香的辨別

土肉桂的小枝為淡綠色，葉片為亞革質，葉表淡綠色，葉背灰白；而陰香小枝紅色，葉片有淡紅色，葉片為紙質，葉表深綠色，葉背淡綠色；陰香果實之宿存花被片先端呈現出截斷狀；而土肉桂幾乎完整保存。此外，土肉桂葉片具有強烈肉桂醛，甜度大約是蔗糖200倍，而陰香則無。

陰香

Cinnamomum burmannii (Nees) Blume

科名：樟科

別名：山玉桂、桂樹

原產地：中國大陸

樹：常綠喬木、無毛，樹皮灰褐色至黑褐色，光滑有肉桂香味。

葉：葉不規則對生或散生。革質、卵形至長橢圓形，長6至10公分，寬2.5至4公分。上面綠色、下面帶綠蒼白色；離基三出脈，葉腋內無腺體，葉柄長0.6至1.2公分。

花：圓錐花序頂生或腋生，長2至6公分，花綠白色，花被片6片，近相等。

果：果實卵形，長0.8公分，直徑0.5公分，果托有一半殘存的花被片。



原產於中國大陸的陰香，外觀與土肉桂非常相似，引進台灣後由於適應力強，蹤跡遍及全台，影響到台灣原生種土肉桂的生存。為配合行政院農業委員會林業試驗所政策，日後行道樹如有缺株，不再補植陰香。

觀賞路段 四維路、民生路、民族路
(往左營楠梓方向)



土肉桂葉背偏灰白色

陰香葉背淡綠色



土肉桂小枝為淡綠色



陰香小枝為淡紅色



科名：使君子科

別名：非洲欖仁、雨傘樹

原產地：馬達加斯加、肯亞、莫三比克

樹：落葉大喬木，高達5至8公尺，樹皮灰褐色，枝條輪生，水平狀伸展。

葉：葉面光滑，葉小叢生枝端，小提琴狀倒卵形，先端圓，長約5公分，全緣，亮綠色。

花：花期9至11月，穗狀花序，乳白色、腋生，花小不顯著。

果：核果長橢圓狀，倒卵形類似橄欖，長約1.5公分，果肉甚薄，黑褐色；植物體耐鹽分，種子可依靠海漂及蝙蝠傳播。



小葉欖仁外觀最大的特徵在於層次分明的樹形，渾圓挺直的主幹，枝枒分層輪生、井然有序，樹形雖挺拔但枝幹卻柔軟，根群穩固能抗強風，並耐鹽份，是優良的海岸樹種。由於原產地多為海岸，種子也具海漂特性，其樹皮及果皮具鞣質，可作染料。它是四季分明的樹種，春天冒出嫩綠新芽，夏天轉為濃綠，冬天落葉後光禿的枝桠亦別具情調。

觀賞路段

左營區：翠華路

鼓山區：美術館路

鳳山區：五甲路、

澄清路（自強路橋至中山西路）

美濃區：福美路、忠孝路、光明街

前鎮區：時代大道



小葉欖仁小故事

台灣的小葉欖仁由馬達加斯加引進，當時因為樹型似傘狀，苗圃商就稱之為雨傘樹，當時因樹形優美，造成搶購而缺貨源，遂想出以欖仁樹作嫁接，結果不太成功，常有砧負現象。

大葉桃花心木

Swietenia macrophylla King



科名：楝科

原產地：墨西哥、中美洲

樹：常綠大喬木，樹幹通直，高可達 30 公尺。

葉：偶數羽狀複葉，小葉 3 至 7 對，卵形，先端漸尖尾狀。

花：圓錐花序腋生，花瓣 5 枚，白色。

果：蒴果大，卵形，木質。長 16 公分、直徑 8 公分，每果內含種子 50 至 60 粒。

原產中美洲的大葉桃花心木性喜陽光高溫，樹幹挺拔樹形優美，冬至至早春有半落葉現象，長成後枝葉茂密，遮蔭效果好，是優良的庭園樹、行道樹。

觀賞路段

三民區：同盟路（二號運河至民族路）、金鼎路（鼎力路至本館路）

小港區：山明路（營口路至北林路）

旗山區：台 28 中學路、旗甲路一段、忠孝街

鳳山區：建國路、鳳屏路

大葉桃花心木小故事

大葉桃花心木在 20 世紀初引進台灣，其木材是製傢俱、器具、建材及雕刻的材料。碩大的卵形果實，成熟後會木質化，其中紅褐色的翅果會像竹蜻蜓般飄落，可當作童玩。

桃花心木

Swietenia mahagoni Jacq.



科名：楝科

原產地：南美洲

樹：常綠喬木，高達 25 公尺以上，樹皮淡紅色，鱗片狀剝落。

葉：偶數羽狀複葉，長約 35 公分。

小葉 4 至 6 對，革質，卵形或卵狀披針形，兩側不等，長 10 至 16 公分，寬 4 至 6 公分，全緣或有時有 1 至 2 波狀鈍齒。

花：圓錐花序腋生，長 6 至 15 公分，花瓣 5 枚，白色，雄蕊 10 枚。

果：蒴果大，卵形木質，直徑約 8 公分，5 瓣裂，種子多數有翅膀，長達 7 公分。

桃花心木在 1901 年由日本人田代安定氏由日本引入台灣，由於生長快速，台灣林業界廣為推廣栽種，這種來自中南美的樹木，木材帶有紅色且紋理美麗，所以中文把它稱作桃花心木，能抗蟲蝕，是製手提琴的良好材料。

觀賞路段

左營區：翠華路（世運大道至中華陸橋）

楠梓區：左楠路

六龜區：台 28 三民路



桃花心木小故事

有人形容桃花心木是個有愛心的媽媽，因為這類陽性植物需要充足陽光才能生長，偏偏桃花心木樹冠寬大，若是種子直接落在地表，會因為光線不足無法成長，因此演化出種子有薄翅膀，風一吹便落在林間空隙。

白千層

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S. T. Blake



科名：桃金娘科

別名：百千層

原產地：澳洲

樹：常綠大喬木，高達 25 公尺，樹皮灰白色，厚而疏鬆。

葉：互生、近革質，狹橢圓形或披針形，長 5 至 10 公分，寬 1 到 1.5 公分，有縱脈 3 到 7 條。

花：4 到 7 月開花，穗狀花序頂生，有多數密集之花，落花後繼續生長成新枝，花乳白色，狀似小瓶刷子。

果：蒴果頂部 3 裂，杯狀或半球形，頂端槭形。



白千層最大的特點是多層樹皮，每年白千層都會長出新皮，並將老皮往外推擠，但老樹皮仍會一層一層的留在樹幹上，像是千層派一樣，撕下一片樹皮在手上搓揉，會有淡淡的清香味。花朵外觀則像是支模樣可愛的奶瓶刷。



觀賞路段

三民區：自由路（九如路至河堤路）中華二、三路

楠梓區：後昌路和區東路（右昌街至捷運）

前鎮區：一心路（三多路至凱旋路）、中華三、四路

白千層小故事

白千層樹皮厚而疏鬆，堆疊的老樹皮，撕下後可拿來寫字、當橡皮擦，當作孩童的玩具；農委會林業試驗所化學系還曾將葉片萃取類似綠油精的芳香油，是日常衛生和化工醫療用品的原料。

毛柿

Diospyros philippensis (Desr.) Gurke



- 科名：柿科
別名：黑檀、烏木
原產地：台灣、菲律賓、印尼
樹：常綠大喬木，高達 20 公尺，樹皮黑色。
葉：葉互生，橢圓狀，披針形革質，葉表面光滑，背面有黃褐絨毛。
花：花期 4 至 6 月，總狀花序單生或腋生，花乳白色。
果：果期 7 至 9 月，漿果扁球形，成熟時暗紅色，表皮佈滿紅棕色絨毛。

柿屬植物的果實多光滑無毛，但毛柿卻佈滿絨毛，果實夏季成熟，據說掛在枝頭上的果實味道苦澀，要熟透自然掉落的果實才會香甜，不過毛柿的枝葉都有毒。其邊材淡紅色，心材黑色，材質堅硬，是製作工藝品、手杖、刀劍等的高級木材，俗稱黑檀木。

觀賞路段 前鎮區：金福路（新生路至中山路）

毛柿小故事

台灣原生種的毛柿生長於東部及南部闊葉林，與原住民生活息息相關，如蘭嶼達悟族人稱毛柿為 kamala，意即「沉重」，除了取枝幹製作各種生活用品，還是打造拼板舟的木材種類之一。卑南族更以刺桐、毛柿作為歲時曆法指標。

台灣赤楠

Syzygium formosanum (Hayata) Mori



- 科名：桃金娘科
別名：大號犁頭樹、紅芽赤楠
原產地：台灣
樹：常綠喬木，枝細柔。
葉：葉對生，革質，橢圓形或倒卵形，長約 5 至 6 公分；斜基，頭長有尾，側脈兩面明顯，約 22 對，葉柄長 0.8 至 1.2 公分。
花：花頂生，花瓣離生，花梗明顯。
果：漿果歪球形，直徑 1 公分。

台灣赤楠是台灣特有種，生長於中南部及恆春半島之闊葉林內。新葉褐紅色，漸漸轉變為綠色，春天時白色小花開滿枝頭，吸引成群蜜蜂、蝴蝶，夏秋結果，果實頂端冠狀突出物，狀似小氣球，小巧可愛。木材富韌性，可供建築及製造工具。

觀賞路段 甲仙區：台 20 線 (64K-66K)
橋頭區：隆豐路（竹林公園前）

欖樹

Zelkova serrata (Thunb.) Makino



- 科名：榆科
別名：雞油、台灣欖
原產地：台灣、中國大陸、日本、韓國
- 樹：落葉大喬木，樹高可達 30 公尺，皮灰褐色，呈鱗片狀有雲型落痕，外皮膜質，內皮後約 1 至 1.2 公分。
- 葉：葉互生，羽狀脈，紙質，長卵形，長 4 至 6 公分，單鋸齒緣，托葉早落，表面粗糙，初春時嫩葉呈淡紅色。
- 花：花期為 2 至 3 月，單性花，雌雄同株，雄花簇生於新枝下部葉腋及苞腋，雌花單生或數朵生於枝上部葉腋。
- 果：核果具短柄，歪斜卵狀圓錐形，秋熟，果實直徑僅 3 毫米。

欖樹是台灣原生植物，其葉形小而青綠，壽命長，除園藝用樹外，也是上等木材，木材鮮紅赭色，質粗而硬重，是闊葉樹中最優良的木材之一，木材刨光後，油膩般的質感如同塗過雞油，是其別名的由來。

觀賞路段 苓雅區：四維三路



光臘樹

Fraxinus griffithii C. B. Clarke



- 科名：木樨科
別名：白雞油、台灣白臘樹、山苦棟
原產地：台灣、中國大陸、琉球、菲律賓、印尼、印度
- 樹：半落葉喬木，樹皮灰紅褐色或灰綠色，小薄片狀剝落，留有雲形剝落痕。
- 葉：奇數羽狀複葉，小葉 5 至 10 枚，全緣長橢圓形，5 至 6 公分，兩端漸尖。
- 花：花灰白色，花瓣 4 枚，橢圓形，柱頭顯著分歧。



觀賞路段

- 小港區：高鳳路
（過埤路至高松路）
左營區：新庄仔路
（博愛路至河堤路）

光臘樹是台灣原生樹種，對氣候適應範圍大，從台灣引進日本後，倍受喜愛，比在台灣更受歡迎。它除了是重要造林樹種、庭園樹外，亦可作為建築、家具的材料。樹皮薄片狀剝落，留有雲形剝落痕，十分奇特。此外還深具生態教學價值，5、6 月在光臘樹上常可見獨角仙在吸食樹液。

杜英

Elaeocarpus decipiens Hemsl.



- 科名：椴樹科
別名：杜鶯
原產地：台灣、中國大陸、日本、琉球
樹：常綠大喬木，高可達 18 公尺。
葉：葉互生，紙質，倒披針形，有鋸齒緣、波狀緣，兩面平滑，叢聚枝端，長 7 至 12 公分，寬 1.6 至 3 公分，頂端漸尖，基部漸狹，葉柄長 0.6 到 1.2 公分。
花：夏季開花，總狀花序，腋生，花白色，花瓣先端絲狀分裂，花瓣與萼片等長。
果：核果橢圓形，長 2 到 3 公分。

在落葉前，葉片會轉成紅色，是為本屬的特徵。

在台灣中低海拔地區常見，亦是受到推廣的行道樹種。杜英在秋天落葉前，樹葉會轉成漂亮的紅色，是極具觀賞價值的樹種，落葉還可撿回來當做書籤，而種子可利用做為潤滑油、肥皂。由於白色小花瓣邊緣有如羽狀的裂片，所以又被稱為「杜鶯」。而它的樹幹更是培育香菇的優良樹種呢！



觀賞路段

左營區：大中路（民族路至高鐵路）

直幹相思樹

Racosperma mangium (Willd.) L. Pedley



- 科名：含羞草科
別名：闊葉相思樹、大葉相思樹、旋莢相思樹
原產地：澳洲
樹：常綠喬木，高達 8 公尺。
葉：互生，假葉卵狀橢圓形，背略直，橢圓狀彎曲，最寬處 2.5 公分，4 至 5 條明顯縱脈。
花：夏季開花，頭狀花序，直徑約 1 公分，花黃色有微香。
果：莢果扁圓條形，捲曲或扭曲狀，內縫線無缺刻，總梗長約 10 公分。



1978 年由澳洲引進，本是造紙原料，沒想到果莢竟成為插花配飾的搶手材料，往往才從產地採收上車後，旋即被收購。它的葉子是假葉，由葉柄演化而來，取代葉子的功能，只有在小苗時，才會長出二回羽狀複葉真葉。

觀賞路段

小港區：營口路（高松路至山明路）

肯氏南洋杉

Araucaria cunninghamii D.Don



科名：南洋杉科

別名：尖葉南洋杉、鱗葉南洋杉

原產地：東澳

樹：常綠大喬木，高達 60 公尺，樹皮剝落後有如金屬般亮光澤，樹幹挺直，上部枝條上舉，下部水平發展。

葉：葉硬而尖銳直，或近於直，形如柳杉，葉長 4 至 7 公分。

花：雌雄異株。

果：球果卵圓形，長 6 到 10 公分，苞鱗上部寬厚開向上彎曲。

1901 年由日本引入，台北植物園內因只剩單株無法正常結實，在嘉義中山公園林試所分所辦公室旁有二株巨大的南洋杉，台灣各地的後代幾乎都是從它們所產生種子繁衍而來。它的木材是優良的小木屋板材，在原產地澳洲亦是很重要的木板用材及樹脂來源。

觀賞路段

三民區：中華路（同盟路至九如路）

新興區：民生圓環

長葉垂榕

Ficus maclellandii King



科名：桑科

別名：黃果勁直榕

原產地：東南亞

樹：常綠大喬木，枝平滑或幼時被毛。

葉：葉全緣，革質，長橢圓狀披針形，長 9 至 17 公分，寬 3.2 到 5.5 公分，先端短漸尖，基部圓鈍，側脈 11 至 14 對。

果：榕果成對腋生，黃熟，直徑 0.8 到 1 公分。

長葉垂榕的樹冠修長，枝細直常下垂，樹型優美，引進栽培觀賞，常被用做景觀植物或行道樹。

觀賞路段

岡山區：岡燕路





- 科名：大戟科
 別名：重陽木、秋楓樹
 原產地：台灣、中國大陸、琉球、東南亞與太平洋諸島。
 樹：常綠喬木，高達 40 公尺，樹皮灰褐色。
 葉：三出複葉、互生。
 花：圓錐花序腋生，花小，不具花瓣，單性，雌雄異株，雌花序較長，達 15 至 27 公分。
 果：果實不開裂，球形或略扁肉質，直徑約 1.3 公分，淡褐色。



茄冬樹喜生長於低海拔濕度高區域，樹冠呈扇形至闊卵形，面積寬大，樹幹多粗壯 不但耐颱風侵襲、抗污染力強、枝葉繁盛是很好的庭園樹與行道樹。它的樹幹粗糙，生長快速，樹皮褐色肥厚多汁，木質硬度中等，可以製作桶、臼等器具，有時也會拿來做建築木材。台灣有名的茄冬雞，即是將葉塞入雞體內料理，果實醃製後可食。



觀賞路段 小港區：中林路（沿海三路至沿海四路）
 三民區：澄清路（九如一路至本館路）
 岡山區：柳橋西路

茄冬樹小故事

由於生命力強，壽命長，所以被稱為重陽樹，鄉間常見到動輒百年的茄冬樹，成為民眾膜拜的對象，台中大里有千年茄冬，相傳是全台最老。邵族有茄冬樹王的傳說故事，相傳枝葉繁茂的茄冬樹王保佑邵族的興盛，一直到被漢人砍斷後，邵族才逐漸凋零。

青剛櫟

Quercus glauca Thunb. ex A. Murr.



從青剛櫟、鐵桐、鐵櫟種種樹名，就可以體會它的木材堅硬，傳說中要砍9次才會斷，所以又稱為「九斬」，除了可用於建築，也常被用來當鐵路上的枕木，青剛櫟更是種香菇的優良木材。

觀賞路段 新興區：中正路（和平路至河東路）

青剛櫟小故事

殼斗科植物的果實擁有豐富的澱粉與脂肪，深受許多動物喜愛，不管是《莊子·齊物論》中那群「朝三暮四」的猴子，或是龍貓 Totoro，還是冰原歷險記中那隻永遠吃不到橡實的鼠奎特，都是這些殼斗科植物果實的擁護者。而真實世界裡，青剛櫟果實是台灣黑熊的食物之一，它的結果量甚至還會影響台灣黑熊的活動模式！

- 科名：殼斗科
別名：鐵桐、鐵櫟
原產地：台灣、中國大陸、日、韓
樹：常綠喬木，高5到20公尺，小枝無毛。
葉：葉倒卵狀橢圓形或長橢圓形，長6至13公分，寬2至5.5公分，先端漸尖，基部圓形或寬楔形，邊緣中部以上有疏鋸齒，上面無毛，下面有白色毛，側脈9至13對。
花：雌雄異株，雌花序具花2至4朵，殼斗杯形。
果：堅果卵形或近球形，直徑0.9至1.2公分，長1至1.6公分，無毛，果臍隆起。



烏柏

Sapium sebiferum (L.) Roxb.



- 科名：大戟科
別名：瓊仔
原產地：中國大陸
樹：落葉喬木，樹皮有明顯的縱裂痕，皮孔明顯，含油性樹脂。
葉：單葉互生，稜形全緣，前端尾狀漸尖，平滑無毛，秋冬時葉子由綠轉紅色。
花：花期為5至6月，穗狀花序長5至10公分，不見花瓣，雄花常每3朵生於一苞之下，雌花孤立於花序基部。
果：蒴果橢圓狀球形，子房3室，成熟時成黑褐色，種子外面包有一層富含蠟質的假種皮。

烏柏在傳入美國後成為有名民俗植物，在台灣則是平地少見的紅葉植物。早期台灣引入是為了取其富臘質的種子，製造蠟燭、肥皂使用；樹幹可當成材薪使用；葉子可做為黑色染料，可說是極具經濟價值的樹種。不過其全株的白色乳汁及葉片均有毒。



觀賞路段 前鎮區：翠亨南北路
鼓山區：美術東一街、美術東七街

翅子木

Pterospermum acerifolium (L.) Willd.



- 科名：梧桐科
別名：槭葉翅子木
原產地：熱帶亞洲、澳洲
樹：常綠大喬木，高可達 15 公尺，樹皮灰褐色，嫩枝黃褐色，冠被灰黃色，絨毛或星狀短柔毛。
葉：葉大型革質，近圓形或長圓形，長 24 至 34 公分，寬 14 至 29 公分。
花：花單生，白色具芳香。
果：蒴果大型成熟時 5 瓣裂，木質，長圓狀角形，長 10 至 15 公分，直徑 5 至 45 公分，初時被紅褐絨毛，後變無毛，種子具有大而薄的翅，隨風四處飄散繁殖。

翅子木於 1910 年被引進台灣成為景觀樹木。花白色有芳香，覆被著金黃色毛，形似像串串小香蕉；其大型種子末端有著大而薄的翅膀，果實裂開後，就會像戴著多啦 A 夢的竹蜻蜓般，隨風四處飄散傳播。

觀賞路段

苓雅區：和平路（三多路至五福路）

無患子

Sapindus mukorossi Gaertner



- 科名：無患子科
別名：木患子、黃目子
原產地：台灣、中國大陸、印度、日本
樹：落葉喬木，高可達 15 公尺以上，樹皮平滑，具多數分枝，枝條淡黃色。
葉：葉互生，偶數羽狀複葉，小葉 8 至 13 對，卵狀披針型，左右不等，長 9 至 15 公分。
花：花期 6 至 8 月，頂生圓錐花序，花序可長達 25 公分，萼片 5 枚、花瓣 5 枚，基部被長絨毛，雄蕊 8 枚，子房卵形，柱頭 3 裂。
果：厚扁球形核果，肉質，成熟時綠黃色，種子紫黑色，外果皮肉質，種子具假種皮，2 至 3 瓣裂。

無患子在秋冬落葉時，葉子轉鮮黃，常被種植為庭園景觀樹及行道樹。成熟時的果實外觀與龍眼有幾分神似，厚肉質狀的果皮含有皂素，是早年農村社會的天然清潔劑，其木材材質粗重而脆，是製作箱板、器具的用材。



觀賞路段

苓雅區：輔仁路



科名：梧桐科

別名：裂葉蘋婆、香蘋婆、豬屎花

原產地：熱帶亞洲、非洲、澳洲等熱帶世界

樹：落葉喬木，高可達 30 公尺，樹幹灰白或淡褐色，落葉後樹姿呈鹿角狀。

葉：掌狀複葉，小葉 5 至 11 枚，幾乎無葉柄，叢生枝頭，12 月至 2 月落葉。

花：3 至 5 月開花，花小、暗紅色，有臭味。圓錐花序，頂生。

果：7 至 10 月果熟，木質種子黑色，炒熟後可食，味如栗子或花生。



春季，掌狀蘋婆的淡紅色新葉與紅色小花高掛枝頭搖曳迎春，夏天濃綠的葉子像一雙雙溫柔的手為人們帶來涼爽的遮蔭。秋天結的木質袋果，形狀酷似木魚，很多人會撿拾賞玩。正由於它遮蔭性高且幾乎沒有病蟲害，以前常被栽種在公園或人行道。



觀賞路段

三民區：同盟路（民族路至中華路）

小港區：光和路（台機路至平和二路）

左營區：翠華路（中華陸橋至世運大道）

前鎮區：凱旋路（成功二路至中山三路）

鳳山區：國泰路、建軍路

掌葉蘋婆小故事

掌葉蘋婆的花和果實有種「特殊」的味道，吸引特定的蟲鳥為其授粉，因此有「豬屎花」之稱，其屬名 *Sterculia* 一字，就是源自羅馬神話中的糞肥之神 (Sterquilinus)。不過還好它的花期不長，看到落花也不要踩去使其味道更加散發，就可以享受它帶給人們的好處了。

菩提樹

Ficus religiosa L.



科名：桑科

別名：印度菩提樹、思維樹

原產地：印度、緬甸、斯里蘭卡、泰國、越南

樹：半落葉大喬木，高可達 20 公尺，樹皮淡灰褐色，樹冠圓形枝條茂密。

葉：葉單葉互生，心型葉片有長長的尾尖，葉面光滑，厚紙質或革質。

花：夏季開花，為隱頭花序，結扁圓形球果，成對腋生，雄花、瘻花、雌花同生於一花序托中。

果：隱花果，成對腋生，無柄暗紫色。



「菩提」的梵語 bodhi 意即「覺悟」，釋迦牟尼佛在此樹下領悟得道，因此印度人視其為具智慧之神聖樹木，特栽植於寺院間以紀念佛祖。小果實為鳥類最喜歡之食物，微小的種子藏在鳥糞裡落下，常在樹上或建築物上發芽成長。與其他樹木不同，菩提樹在春夏交接時落葉，心型的「滴水葉尖」便於在多雨環境排水，是熱帶植物的特色之一。



瘻花

具有短花柱的雌花，本身並不育，但卻提供傳播花粉的昆蟲在其子房內發育。



左營海軍明德賓館前空地上的百年菩提樹。

觀賞路段

三民區：九如路（同盟路至民族路）

建國路（民族路至凱旋路）

苓雅區：和平路（三多路至五福路）

建國路（凱旋路至澄清路）

阿蓮區：高 13 復安路

禪中的菩提

菩提本無樹

明鏡亦非臺

本來無一物

何處惹塵埃

~禪宗六祖慧能

菩提樹小故事

民國 88 年，二苓國小蔡蕊老師發現每當校園菩提樹開花時，就有大量蜻蜓聚集，進一步研究二者關係後發現，原來蜻蜓是趕來吃為菩提樹傳粉的小蜂，這種小蜂幾乎一生都活在隱花果內；此研究獲得當時全國國小科展第二名、高雄市第一名的殊榮。



- 科名：漆樹科
別名：楷樹、爛心木
原產地：台灣、中國大陸、菲律賓
樹：半落葉大喬木，高可達 25 公尺，樹皮薄片剝落。
葉：奇數羽狀複葉，互生，小葉 11 至 13 枚，幼時有毛，隨成長會變光滑，春秋羽葉均呈紅色，十分美麗。
花：雌雄異株，雄花為叢生總狀花序，雌花為淡黃色圓錐花序。
果：核果倒卵圓形，初為黃白色，後變紅或藍紫色。



黃連木的樹心很容易腐爛中空，因此又被稱為「爛心木」，然而它仍是優良木材，質堅緻密，且色澤花紋亮麗，在商用木材的分類中，黃連木屬於台灣產闊葉材的一級木。嫩葉是紅色的，在春、秋兩季都非常美麗。

觀賞路段

- 三民區：九如路（民族路至光武路）、民族路
左營區：華夏路（民族路 - 東門路 - 重愛路）
前鎮區：中山路（凱旋路至三多路）
苓雅區：中山路（三多路至青年路）、五福路（中山路至凱旋路）
新興區：中山路（河南路至民生路）

黃連木小故事

黃連木之幼葉有香味可製茶葉，又名黃鸚茶或黃皂茶。山東曲阜孔子廟前子貢手植之「楷木」，即為黃連木，這也是為何高雄市蓮池潭畔的孔廟門口也有一株黃連木，而且樹圍還頗粗，不妨至此感受聖者風範。

黑板樹

Alstonia scholaris (L.) R. Br.



科名：夾竹桃科
 別名：糖膠樹、麵條樹
 原產地：澳洲、印度、馬來西亞、印尼
 樹：常綠喬木，高達 20 公尺，有白色乳汁。
 樹皮灰褐色，有條狀縱裂，枝輪生，
 樹形呈自然塔型。
 葉：葉 3 至 10 枚輪生，革質。
 花：聚繖花序頂生，花有惡臭。
 果：蓇葖果，圓柱形，長 30 至 60 公分，2
 枚。

樹形英挺的黑板樹於 1943 年日本時代引入台灣，在大陸稱麵條樹。種名 scholaris 與學者、學校有關聯之意，雖然台灣引種確實是為製黑板用，然因寬度不夠而沒應用，所以台灣的黑板其實不是黑板樹做的。全株乳汁豐富。

觀賞路段

- 三民區：民族路（民生路至八德路）
- 小港區：漢民路（沿海路至大業北路）
- 左營區：翠華路（中華陸橋至世運大道）
自由路（河堤路至華夏路）
大順路（自由路至龍華橋）
- 新興區：民族路（民生路至八德一路）
- 前鎮區：中山路（三多路至凱旋路）
- 彌陀區：高 23 公園路、潔底路、高 21 文安路東段
- 永安區：高 20 永安路
- 茄萣區：高 3 仁愛路三段、高 3-1
- 阿蓮區：高 9 石安、高 14 復安路
- 旗山區：延平一路
- 大寮區：光明路三段



楓香

Liquidambar formosana Hance



科名：金縷梅科

別名：楓香樹

原產地：台灣、中國大陸

樹：落葉喬木，高達 40 公尺，小枝有柔毛。

葉：葉寬卵形，革狀 3 裂，長 6 至 12 公分，
 邊緣有鋸齒，背面有柔毛或變無毛，掌
 狀脈 3 至 5 條，葉柄長達 11 公分，托
 葉紅色條形長 1 至 1.4 公分，早落。

花：花單性雌雄同株，雄花排列成葇荑花序，
 無花被，雄蕊多數，花絲與花藥近等長，
 雌花 25 至 40 枚，排列成頭狀花序，直徑 1.5 公分，無花瓣，子
 房下位 2 室，胚珠多數。

果：頭狀果序圓球形，直徑 2.5 至 4.5 公分，宿存花柱和萼齒針刺狀。



楓香是秋冬時其中低海拔常見的紅葉植物，樹幹則是種香菇的優良段木材料。楓香和槭樹看來類似，尤其春夏葉子青綠時亦使人產生混淆，但兩者屬不同科，楓香的葉為互生，果實頭狀圓球形，槭樹葉則為對生，果為翅果，是有分別的。

觀賞路段

楠梓區：大學南路（藍昌路至德中路）、大學西路

塔樹

Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites Pendula



科名：番荔枝科
別名：印度塔樹、垂枝暗羅
原產地：印度、巴基斯坦、斯里蘭卡
樹：常綠喬木，高可達 15 公尺或更高尖塔型，枝條像青皮柳般直線下垂。
葉：葉互生，革質，亮綠，狹披針形，長 20 公分，邊緣波浪狀，側脈明顯，約 15 對。
花：4 至 5 月開花，花似星狀，線瓣，單生於葉腋。
果：果實為漿果狀，平滑無毛圓球形。

塔樹為長葉暗羅的園藝栽培種，下垂的枝葉有時甚至觸及地面，使其樹形好似穿著長裙一般優雅而特殊；其形又像是尖細的佛塔，因此在印度為神聖之佛教樹，常見寺廟外圍一整排矗立如衛兵般整齊列隊，非常壯觀。

觀賞路段 前金區：同盟路（愛河）
楠梓區：大學西路
鳥松區：大埤路

福木

Garcinia subelliptica Merr.

科名：藤黃科
別名：福樹
原產地：台灣（綠島、蘭嶼）、菲律賓賓、琉球
樹：常綠大喬木，高達 15 公尺，樹幹通直，樹皮黑褐色，樹冠略圓錐形。
葉：單葉對生，長橢圓形，先端圓鈍，厚革質。
花：花期 4 至 5 月，總狀花序，雌雄同株。
果：果扁圓黃，熟後有硫磺臭味，直徑 4 公分。

福木因為葉子長得像日本古代貨幣，人們希望藉由栽種此樹發財得福而得名。同時因其樹形整齊有序、給人寧謐莊重的感覺，且落葉不多，因此日本寺廟庭園很喜歡種植福木。屬於深根性的福木也是防風林樹種，即使在海邊遇強勁颱風，樹形仍能完好如初。

觀賞路段

苓雅區：青年路（海邊路至民權路）
左營區：自由路（華夏路至河堤路）
前金區：中華路（中正路至五福路）、民生路（新盛二街至河東路）



福木小故事

家種五株福木，意寫「五福臨門」；聯合報系在苗栗的度假中心，大門前同時栽種著福木與桂花，就是取其「富貴同堂」之吉利。

榕樹

Ficus microcarpa L. f.



科名：桑科

別名：正榕、鳥松

原產地：台灣、華南、印度、馬來西亞、澳洲、琉球、菲律賓

樹：常綠大喬木，高可達25公尺，幹多分枝，幹上多垂下長長的氣根，樹冠能迅速擴大生長，枝根錯綜開展，能成廣蔭。

葉：葉互生，橢圓狀卵形或倒卵形，厚革質，全綠。

花：隱頭花序，無尾梗，單生或成對生於葉腋。

果：扁倒卵球形之隱花果，直徑 5 至 10 公分，乳白色，成熟時黃色或淡紅色，果熟時桔紅色，有甜味，鳥頗喜食之。

詩歌中的榕樹

「路邊一棵榕樹下……」，榕樹不但出現在《榕樹下》這首大家朗朗上口的流行歌中，古代詩詞中就已多見榕樹身影：

客中多病廢登臨 聞說南台試一尋
九軌徐行怒濤上 千艘橫繫大江心
寺樓鐘鼓催昏曉 墟落雲煙自古今
百髮未除豪氣在 醉吹橫笛坐榕陰

～《度浮橋至南台》陸遊



橋頭五爪龍榕樹

早年在鄉間，大榕樹總是會和廟口連結在一起，榕樹下也常成為村里聚會中心，甚至被稱為「榕樹公」，成為人們膜拜的對象。這其實是因為榕樹耐貧瘠、生長快，木材卻對人們來說沒用處，因此不去砍伐。它容易成為優勢樹種，周圍植物若被其氣根纏繞，多半難以活命，榕的根部能夠分泌根酸溶解石灰岩，因此可生長於石灰地質，甚至建物牆上。

觀賞路段

小港區：高坪 23 路（太平路至高坪 18 路）
中林路（沿海三路至沿海四路）
大業北路（中山路至中鋼路）
新興區：民族路（建國路至民生路）
旗津區：旗津二路三路（廟前路至敦和街）

榕樹小故事

台灣最負盛名的榕樹是澎湖的「通樑大榕」，據說是由古時華南移民從船上丟下的一根木棒經若干年代所長成。高雄市珍貴老樹編號第一號就是榕樹，位於楠梓國小操場北側，樹齡超過 130 年，小朋友們甚至給了它「翡翠精靈」的稱號。



銀樺

Grevillea robusta Cunn. ex R. Br.



科名：山龍眼科

別名：絹柏

原產地：東澳

樹：常綠喬木，高達 25 公尺，生長迅速，小枝條被淡赤褐色，絨毛。

葉：葉為二回羽狀複葉，互生，長橢圓形，2 至 5 深裂，表面稍平滑，背面有絲狀毛，邊緣反捲。

花：花期 4 到 5 月，總狀花序，花柄細長，花橘黃色，長 15 公分。

果：果期 8 至 9 月，蓇葖果，球形。

台灣的平地及中南部海拔一千公尺以下山區分布有很多銀樺，其木材質地輕軟有鮮明斑紋，但主幹很直，適合作為小型傢俱或雕刻材料。它的果實為蓇葖果，成熟後會自動裂開。

觀賞路段

左營區：大中路（民族路至高鐵路）
三民區：建國路（河東路至民族路）
前金區：民生路（新盛二街至河東路）



銀葉樹

Heritiera littoralis Dryand.



科名：梧桐科

別名：大白葉仔、銀葉板根

原產地：台灣、海南島、斯里藍卡、菲律賓、日本、澳洲、東非

樹：常綠喬木，高達 10 公尺。

葉：單葉互生，革質，橢圓形或側卵狀橢圓形，長 5.5 至 20 公分，寬 2.2 至 8 公分，下面密生銀色鱗片，葉柄 0.8 至 2 公分。

花：圓錐花序，長約 8 公分，花單性，無花瓣，雄蕊柱長約 0.3 公分，萼 4 至 5 裂，雌花心皮 4 至 5 枚，近分生。

果：成熟心皮木質，狹橢圓狀球形，長 3 到 5 公分，不開裂，有龍骨狀凸起。



葉背

銀葉樹是很好的防風林樹種，木材可以用以造船或傢俱、房屋。其果實木質且輕，可藉由海漂散佈。成年的銀葉樹會有明顯的板根，台灣最有名的一株銀葉樹就是墾丁國家公園內的「銀葉板根」，超過一百公分的板根幾乎可讓小朋友玩躲迷藏。

觀賞路段

鼓山區：九如四路（圓環至九如大橋）



科名：樟科

別名：烏樟、香樟、芳樟

原產地：台灣、中國大陸、日本、琉球

樹：常綠喬木，高可達 30 公尺。枝和葉都有樟腦味，樹皮有深縱裂。

葉：葉互生，薄葉質，卵形，長 6 至 12 公分，寬 3 至 6 公分，下面灰綠色，兩面無毛，離莖 3 出脈，脈腋有明顯的腺體。

花：圓錐花序腋生，長 5 至 7 公分，花小，淡黃綠色，晚間有芳香味。

果：果球形，直徑 0.6 至 0.8 公分，紫黑色，果托杯狀。



樟樹由於樹型美觀、枝葉濃密且全年常綠，因此成為很受歡迎的行道樹。其木材可抗蟲害、耐潮濕，因此是建材、造船、家具、雕刻等愛用的材料。尤其枝幹萃取而製作的樟腦片可防蟲，台灣樟腦的外銷還曾居世界之冠。



觀賞路段

三民區：民族路（建工路至九如路）

建工路（中山高速公路至民族路）

苓雅區：青年一路（民權路至光華路）

民權路（三多路至五福路）

小港區：高坪 18 路（高坪 7 路至高坪 15 路）

高坪 23 路（太平路至高坪 18 路）

中鋼路（大業北路至沿海路）

左營區：博愛路（文自路至大順路）

新興區：民族路、民生路（新盛二街至民族路）

楠梓區：海專路（捷運高架至德民路）

學專路（捷運至後昌路）

美濃區：復興路（181 縣道）、復興街、復興街二段

阿蓮區：高 13-1 復安路

杉林區：司馬路



樟樹小故事

台灣的樟樹事業發展頗早，從清朝即設有專責機構管理；日本時代大量砍伐樟樹，從事樟腦製作的人叫做「腦丁」，從阿里山的「樟腦寮」、「樟腦湖」，許多地方都有「樟山」（高雄市桃源區即有樟山與樟山國小）可知早年樟樹分布之廣。據說樟樹是可能已絕種的台灣雲豹棲息與獵食的場所，一說雲豹的絕跡與樟樹被砍伐有關。然而在化學合成的樟腦油發明後，樟樹的經濟價值就大幅滑落了。

麵包樹

Artocarpus camansi Blanco



科名：桑科

別名：麵包果樹、麵包樹

原產地：菲律賓

樹：常綠大喬木，高達 18 公尺，樹冠大傘形，樹皮灰褐色，全株具有乳汁。

葉：葉叢生於枝端，革質，單葉，全緣或具羽狀深裂，7 至 9 裂片。

花：雌雄異花，雄花小穗狀，長 25 至 40 公分，雌花序球形，多刺，頭狀花序，有海棉狀花托，徑 10 至 15 公分，大型，肉質。

果：聚合果，球形或橢圓形，外皮有如波羅蜜之瘤，瘤初為青綠色，熟時帶黃色，白色的果肉柔軟，為花托肥大而成。

麵包樹的果實含有油質和澱粉，燒烤之後吃起來與麵包相似，是早年南島原住民的主食，早年大溪地原住民甚至會為每個孩子種植一株麵包樹。蘭嶼達悟族人也使用其木材，製作成船上重要配件或屋柱，是當地重要的經濟樹木。

觀賞路段

苓雅區：凱旋路（三多路至建國路）

前鎮區：民權路（三多路至中山路）

麵包樹小故事

麵包樹不但成為歷史事件主角、還曾登上大銀幕。1787 年 12 月英國派船艦轉運上千株麵包樹至西印度群島的途中，發生了有名的《叛艦喋血記》，看過電影的朋友是否還記得這個故事？

臘腸樹

Kigelia africana (Lamk.) Benth.

科名：紫葳科

別名：吊瓜樹、吊燈樹、羽葉垂花樹、非洲臘腸樹

原產地：熱帶非洲

樹：短期落葉大喬木，高達 20 公尺。

葉：奇數一回羽狀複葉對生。

花：頂生圓錐花序，疏散下垂，約 1 公尺之總梗上，花萼鐘形，花朵深紅色，花冠闊鐘狀漏斗形，深夜開放。

果：果實形似臘腸長圓柱形，腫脹粗大，皮厚，掛於長約 1 公尺的總梗上。



雖然有個可口的名字，但其實臘腸樹的果肉很硬，並不能吃。同時它的花果型態都很特殊，長達 80 公分到 1 公尺的總梗上，常吊掛著數顆果實，因此也叫吊燈樹。不過 1922 年引進台灣栽種的臘腸樹，其果實對台灣人來說，外形與色澤可能更像我們熟悉的「地瓜」呢！

觀賞路段

前金區：市中一路（前金二街口）

美濃區：高 140 中山路二段



臘腸樹小故事

有些人會感到奇怪，怎麼幾乎沒見過臘腸樹開花，就見它花落滿地了？這是因為臘腸樹為了吸引蝙蝠幫它傳粉，總選在深夜裡開花，等到人們清晨見到它時，花朵已經落滿一地了。

鐵冬青

Ilex rotunda Thunb. ex A.Murr.



攝影／莊溪



攝影／莊溪

科名：冬青科

原產地：台灣、日、韓、中國大陸、越南

樹：常綠喬木，高5至15公尺，樹皮淡灰色，小枝紅褐色，光滑無毛。

葉：葉薄革質或紙質，橢圓形，卵形或倒卵形，長4至10公分，寬1.5到4公分，全緣，上面有光澤，葉柄長1至2公分。

花：花期3至4月，花白色，雌雄異株，通常4至6(15)花排成聚繖花序，著生葉腋處，雄花4數，雌花5至7數。

果：果期11月，球形，長0.4至0.6公分，熟時紅色，分核6至7顆，背部有條紋和2淺槽，內果皮近木質。

鐵冬青的樹葉又厚又密，可以形成良好遮蔽，營造多層次景觀，是理想的園林觀賞樹種。木材可作為建材，樹皮可做染料，很多鳥類喜歡吃它的果實，是誘鳥植物。不過因其雌雄異株，雄株的鐵冬青是不會結果的。



攝影／莊溪

觀賞路段 左營區：大中路(民族路至高鐵路)

鐵冬青小故事

鐵冬青在寒冷的天氣仍能保持青綠，被西方人視為有神奇力量，哈利波特的魔杖就是用冬青木和鳳凰羽所做成。另傳說其果實原為白色，耶穌被釘十字架時鮮血把祂頭上戴的冬青頭冠染紅了，於是後來果實都變鮮紅色，因此冬青也象徵永生，耶誕節裝飾品中常見的紅色小果，就是冬青的果實。

檸檬桉

Eucalyptus citriodora Hook.



科名：桃金娘科

別名：油桉樹、檸檬香桉樹

原產地：澳洲

葉：單葉互生，卵狀披針形或長卵形，基部銳尖或圓形，先端漸尖，長約13公分；分有腺毛及無腺毛，具強烈的檸檬香味。

花：花期3月，繖房或圓錐花序，腋生，萼筒倒圓錐形、鐘型，或長橢圓形，萼之裂片與花瓣結合為蓋，開花時與白色萼筒分離。

果：蒴果頂端開列，蒴片3至6片，種子多數，長1公分。



檸檬桉生長快速，是速生樹種。葉子只要稍微搓揉，就會有強烈的檸檬香味，莖葉蒸餾後可得6%香油；亦是製紙漿優良木材之一。春夏生長旺盛的季節裡，因形成層生長速度加快，韌皮部向外推擠，造成表皮剝落，呈現光滑的灰白色樹幹。

觀賞路段 烏松區：環湖路
茄萣區：濱海路一段

大王椰子

Roystonea regia (H. B. K.) O. F. Cook

科名：棕櫚科

別名：王棕

原產地：古巴

樹：常綠喬木狀，高 10 至 20 公尺，樹幹幼時基部明顯膨大，老時則轉為中部膨大。

葉：葉聚生於葉頂，羽狀全裂，長達 3.5 公尺，裂片呈條狀披針形長 60 到 90 公分，通常 4 列排列，頂端漸尖，基部稍外向折疊，葉鞘長，緊包著桿頂。

花：肉穗花序，生於葉鞘下，多分枝，排成圓錐花序式，長 50 至 60 公分或更長，花小，白色，雌雄同株。

果：果近球形，長 0.8 至 1.3 公分，基部稍狹，紅褐色至淡紫色，種子 1 顆，卵形。



大王椰子，顧名思義，其樹型是棕櫚科中最高大、足以稱王的！它是台灣大學的校樹，其花則是海地的國花，具有耐熱、耐寒、耐旱、耐濕、耐鹼、耐瘠、抗風、抗污染及壽命長等特性。台灣於 1898 年引入，屬於重瓣、耐熱的品種，因其果實會吸引鳥類食用，也是誘鳥植物。



觀賞路段 三民區：博愛路（愛河至河北路）
左營區：世運大道

華盛頓椰子

Washingtonia filifera (Linden ex Andre) Wendl.



科名：棕櫚科

別名：老人棕、華盛頓棕櫚、翁櫚、絲葵

原產地：美國加州、亞歷桑那州、墨西哥

樹：常綠喬木，樹高可達 15 公尺，樹幹圓柱形，基部膨大具環紋。

葉：葉掌狀生於枝幹頂端，葉徑 1.05 至 1.5 公尺，葉身有多數裂片呈現白色絲狀的纖維。

花：6 月開花，肉穗花序較葉為長，多分岐，花白色。

果：8 至 10 月結果，核果橢圓形，長 0.7 公分，黑色有光澤。

生性強健的華盛頓椰子長得高大挺拔，是常見的行道樹及庭園樹種。其外型有點像蒲葵，但是掌狀的葉基佈滿絨毛，枯葉不會自動掉落，宿存之枯葉層層掛在樹幹上，葉裂片間具有白色纖維絲，看似老翁的白鬍鬚，所以又稱老人棕。

觀賞路段 苓雅區：青年路（民權路至光華路）



科名：山欖科

別名：台灣膠木黑欖

原產地：台灣蘭嶼、菲律賓

樹：常綠喬木，高 5 至 7 公尺，有乳汁，小枝粗、柱狀。

葉：葉厚、革質，互生，倒卵形至匙形，長 10 至 17 公分，寬 4.5 到 7 公分，頂端圓或鈍，有時凹頭，側脈 10 到 12 對，直或稍弧形。

花：花腋生，單朵或幾朵簇生，花梗長 1.5 至 2 公分，花冠白色，長 1.5 至 1.7 公分，有 6 個近披針形的裂片，雄蕊通常 12 至 18 枚。

果：漿果狹橢圓形，長 4 到 5 公分，宿存花柱長 1.5 公分，種子紡錘狀，褐色，光亮，側面常具胎座痕跡，幾佔種子表面一半。



大葉山欖的樹皮含有豐富的乳汁，類似橡膠乳液，因此有台灣膠木黑欖的別名。而它的木材呈紅褐色，軟硬適中，可作為建築或傢俱材料，在它的原生地蘭嶼，達悟人就常用以製作拼板舟，樹皮還能當作漁網的染料。

觀賞路段

小港區：世全路

（沿海路至與高坪 22 路交界之中油門口）

左營區：大中路（民族路至高鐵路）

鼓山區：美術館路（中華一路至馬卡道路）

大順路（中華路至自由路）

蘭嶼芒果

大葉山欖的果實因為長得像橄欖，一般稱為黑欖，8 至 9 月成熟期時常見其掉落滿地，果可食，據說香甜多汁，因此在蘭嶼有「蘭嶼芒果」之稱！



科名：使君子科
 別名：枇杷樹
 原產地：台灣、中國大陸、馬來西亞、菲律賓、太平洋諸島、波里尼西亞
 樹：落葉大喬木，高可達 15 公尺以上，起初樹皮較平滑，隨樹齡增長有縱向裂紋呈剝落狀，枝條水平狀，輪生。
 葉：葉螺旋生於枝端倒卵形，全緣圓頭，長 20 至 25 公分，葉基偶有一對蜜腺。
 花：花穗狀花序，腋生，雄花著生於頂端，雌花或兩性花著生於下方。
 果：核果扁橢圓形，周邊有萼筒狀突起。

欖仁樹因果實狀似橄欖核而得名，是海漂植物的一種。生長在高溫、陽光充足、土質排水良好的地方，耐旱、抗風、耐鹽性強，台灣的高屏、蘭嶼等地多有生長。由其生態可感受季節變化：春季嫩葉生長，由於葉基部常有蜜槽，會有蜜蜂群集，夏季樹葉轉濃綠，秋冬變成紅或黃葉，冬季落葉，隔年春又生出嫩芽。

觀賞路段 旗津區：旗津二路、三路

小港區：高坪 22 路（高坪 39 街附近至高坪 15 路）

欖仁小故事

欖仁的木材細緻厚重，早年常被台灣南部的排灣族做為房子建材，蘭嶼達悟族人民則用其板根造船。花蓮沿海吉安鄉南埔地區的阿美族舊名「Talakay」，意思就是「欖仁很多的地方」。



科名：蝶形花科
 別名：九重吹、掛錢樹
 原產地：台灣、印度、馬來西亞、澳洲、波里尼西亞

樹：半落葉性喬木，高達 15 公尺。
 葉：奇數羽狀複葉，互生，5 至 7 枚，革質對生，卵形至寬橢圓形，長 6 到 17 公分，寬 3.5 到 10 公分。
 花：花開 4 月，9 至 10 月，總狀花序，腋生，花常 2 朵簇生於花序總軸的節上，花冠淡紫色。
 果：莢果木質，矩形不開裂。



環境適應能力強、又開著淡紫花朵的水黃皮，是很好的景觀、行道與防風樹種。由於它是深根性，根部深入土中後，能抵抗強風，因此又被稱為「九重吹」。而長橢圓形的莢果一顆顆掛在樹上，有如古代銅錢，故又稱「掛錢樹」，不過其種子與根部皆有毒性，勿嘗試食用。

觀賞路段 前金區：六合路（自立路至市中路）

楠梓區：德民路（啟昌街至高楠公路）

左營區：自由路（河堤路至華夏路）

旗津區：旗津三路、二路（廟前路至敦和街）

燕巢區：高 35 四林路



科名：夾竹桃科

別名：牛心荔、海欖仔、山欖果、海欖果

原產地：台灣、中國大陸、澳洲、熱帶亞洲

樹：常綠喬木，高 4 至 8 公尺，樹皮灰褐色，枝輪生無毛，全株有白色乳汁，此汁液有毒。

葉：葉互生，倒卵狀矩圓形或倒卵狀披針形，長 6 到 37 公分，寬 2.3 至 7.8 公分，無毛。

花：花期為 3 至 10 月，聚繖花序，頂生，花冠白色，喉部紅色，高腳，碟狀，花冠裂片 5 枚，倒卵狀鐮刀形，向左覆蓋雄蕊 5 枚，著生在花冠筒喉部。

果：果：核果單生或雙生，球形或闊卵形，長 5 至 7.5 公分，直徑 4 到 5.6 公分，有劇毒勿食，成熟時橙黃色，種子通常 1 顆。



海欖果因果實形體酷似芒果，又生長於海邊而得名，是很好的防風、防潮樹種。由於樹形優美、花期長，白色的花朵又散發芳香，因此常被用為園藝觀景或行道樹。果實表皮光滑、內含纖維層，因此可以藉由海漂傳播種子，但是含有劇毒，誤食可能致命，要特別小心。

觀賞路段

旗津區：旗津一路北端近二路

楠梓區：後勁溪步道

海漂植物

海岸林植物中許多皆為海漂植物，海欖果就是其中之一。海漂植物的一大特性就是其果實構造多半有著堅硬的外殼或果仁以阻隔海水鹽分，又具有纖維層或是部分中空以利漂浮，因此這類植物便能漂洋過海、靠岸成林，不但有著強韌的生命力，聰明的結構設計更展現造物的智慧！

海棗

Phoenix dactylifera L.



科名：棕櫚科

別名：中東海棗、波斯棗

原產地：西亞、北非

樹：常綠喬木狀，高達 35 公尺，莖直立具殘存葉柄。

葉：基部上部葉斜升，下部葉斜垂組成稀疏，頂狀樹冠，葉長達 6 公尺，一回羽狀全裂，裂片長達 45 公分，窄而硬，被灰白粉，2 到 3 片聚生。

花：密集圓錐花序，雌雄異株，雄花長圓形具短梗，近球形。

果：漿果長圓形或圓筒形，長 3.5 至 7 公分，成熟時橙黃色，果肉肥厚甜美可食。

由高雄的國際門戶小港機場一出來，寬敞的中山路分隔島上，成排富有熱帶風情的海棗在艷陽下迎風搖曳，彷彿歡迎著造訪高雄的遊客。海棗對小生物也很大方，果子成熟時，很多松鼠和麻雀會群聚在葉冠，取食其甘美果實，樹下如果散落著被啃食後的殘缺果實，就是小動物們造訪過的痕跡。

觀賞路段 三民區：同盟路（建國路至中華路）

前鎮區：中山四路（凱旋路至平和東路）

小港區：中山四路（大業北路至平和東路）

沿海一、二路（飛機路至中林路）

黃槿

Hibiscus tiliaceus L.



科名：錦葵科

別名：粿仔葉

原產地：台灣、馬來西亞、澳洲及太平洋小島等熱帶海岸。

樹：常綠小喬木，高達 8 公尺，樹皮灰色，有縱向裂紋，樹冠傘型，多纖紙質，多分枝而少有直幹。

葉：葉互生，嫩葉及花序有短柔毛，圓形先端短而漸尖，葉基心型，全緣或有小鋸齒，表面平滑無毛，背面灰白色有毛，托葉寬、早落。

花：花期 5 至 8 月，頂生或為腋生，總狀花序，花冠黃色、鐘狀，中心為暗紅色。

果：蒴果背長 2 公分，5 瓣裂，木質，種子多數平滑。

耐鹽、耐旱的黃槿，是典型的海岸線林木，也常見於紅樹林周邊。鐘形的花起初為黃色，將凋時轉為紅粉褐色，在防風、遮蔭功能之外，為漁村、海岸帶來優美的景緻。同時黃槿的葉子以往被用來當作蒸糕時的襯墊，讓粿仔散發特殊香氣，故也稱粿仔葉。

觀賞路段 小港區：飛機路（高松路至中山路）

苓雅區：成功路（新光路至青年二路）

前金區：河東路（二號運河至五福路）

棋盤腳

Barringtonia asiatica (L.) Kurz

科名：玉蕊科

別名：濱玉蕊、墾丁肉粽

原產地：台灣、馬來西亞、
澳洲、太平洋諸島、
馬達加斯加

樹：常綠喬木，高 20 公尺，
是海岸林中較高大的
樹種。

葉：葉互生，呈倒卵形或
長橢圓形，長 30 至
40 公分，寬 15 到 20
公分，先端鈍，全緣，
革質，光滑無毛無柄。

花：花期 7 至 9 月，總狀花序，頂生直立，花徑 10 公分，
花瓣乳白色，雄蕊淡紅色，長達 12 公分，於夜間開花。

果：壓縮陀螺形，4 稜，長 10 公分，似棋盤之腳，藉海水散布各地傳播。



棋盤腳在台灣多分布於東、南海岸和蘭嶼、墾丁一帶，有「墾丁之花」美稱。陀螺狀果實的方形基部如同古代棋盤的四隻腳而得名，因為長得像粽子，故又被戲稱為「墾丁肉粽」。花在深夜開放，晨間即萎謝，狀似煙火相當美麗。不過它在蘭嶼不受歡迎，由於其常與墓地相伴，因此被稱為「魔鬼花」或「死人樹」。

觀賞路段 小港區：山明路（北林路至營口路）

穗花棋盤腳

與棋盤腳十分相似的穗花棋盤腳，又名水茄苳，是國寶級的原生種植物。其與棋盤腳最大的不同，在於穗花棋盤腳的花呈穗狀懸垂，長達 20 到 60 公分，葉子也較小，因此也被稱為「細葉棋盤腳」。



稜果榕

Ficus septica Burm. f.

科名：桑科

別名：常綠榕、豬母乳、大冇樹、大葉榕

原產地：台灣、爪哇、琉球。

樹：常綠小喬木，高達 6 公尺。

葉：葉卵形或橢圓形，紙質，亮綠色，
全緣平滑，長 15 至 25 公分。

花：花雌雄同株，隱頭花序。

果：扁球形隱花果，外表有 10 至 12 突
出的稜線，直徑 1.5 到 2 公分，幹
生果。

台灣原生種的稜果榕，因果實外表有稜線而得名。其隱花果成熟時頂會稍微開裂，讓榕小蜂鑽進，待其翅膀沾滿花粉，再前往另一榕果產卵、順便採粉，形成非常奇妙的生態系統。性喜高溫、潮濕及陽光充足的環境，能抗強風，生長迅速，以臺灣低海拔的地區，尤其山邊或溪邊分布最多。



觀賞路段 鹽埕區：七賢三路（五福路至河西路）



科名：木麻黃科
別名：木麻黃
原產地：雜交種
樹：常綠喬木，高可達 20 公尺，枝淡褐色，纖細，有密生的節，下垂，小枝呈灰綠色。
葉：鱗片狀，淡褐色，多板輪生，各節有鞘齒。
花：花期 4 至 6 月，花單性，雌雄同株，雄花為穗狀花序，雌花不具被，為頭狀花序。
果：果實近球形，或寬橢圓形，直徑約 1.2 公分。



木麻黃這種生命力強韌，又耐旱、抗風、耐鹽的植物，在大家的印象中，幾乎已成了沙灘防風、攔砂林的代名詞。其針狀的「葉子」常讓人誤以為跟松樹是親戚，但其實木麻黃屬於闊葉樹，灰綠色針狀的部分其實是它的小枝，而它真正的葉子，已經退化為輪狀鱗片一般，藏在小枝的節上。

觀賞路段 苓雅區：三多路（中山高速公路至國泰路）
旗津區：中洲二路、三路（大關路至旗津路）
橋頭區：高 34 通燕路
阿蓮區：高 13 復安路

雜交木麻黃小故事

木麻黃原產於澳洲、馬來西亞等地，70 年代台灣植物專家陳德順針對木麻黃的耐鹽性進行研究，但採到的標本很雜亂，因此寄到澳洲鑑定，才發現台灣的木麻黃因各種類混植，產生多重雜交現象，因此在台灣可見、具有鞘齒 15 枚的木麻黃其實是雜交種。同時木麻黃根瘤內的菌種 *Franhia* 可提高其固氮效率，因此使之耐貧瘠。

蒲葵

Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. var.



科名：棕櫚科

別名：扇葉葵、木葵

原產地：中國南部、中南半島

樹：常綠喬木，單幹且直立不分枝，挺直粗壯，黑褐色，具有不規則環紋，表皮粗糙。

葉：單葉叢生於頂端，葉大且呈掌狀分裂成線形，中肋突出，呈弧形下垂。葉長可達一公尺，葉柄斷面略呈三角形，下半部兩側有刺。

花：花期3月初至5月初，有時9月中至10月底也會開花。肉穗花序，長而分歧，呈直立狀。

果：橢圓形核果，成熟後呈黑褐色。

蒲葵抗風、耐鹽，很能適應沿海環境。早年與人們生活關係密切，葉片可製成笠帽或蒲扇，樹幹可製成傘柄、手杖或工藝品，葉腋間的纖維還可製成繩索、蓑衣、掃帚等。蒲葵的葉子乍看常年不變，其實每年會從株頂中心生出十幾枚新葉，每批葉子約維持兩年，再逐漸往外層枯乾、掉落。

觀賞路段 前鎮區：民權路（中山路至三多路）
中華五路（復興路至凱旋路）
苓雅區：民權路（三多路至五福路）

瓊崖海棠

Clophyllum inophyllum L.

科名：藤黃科

別名：胡桐、君子樹、紅厚殼

原產地：台灣、海南島、澳洲、太平洋諸島、南洋、印度、越南、菲律賓、非洲

樹：常綠喬木，高5至12公尺，樹皮厚、呈暗褐色或灰褐色，幼枝為圓柱形。

葉：葉對生，橢圓形或倒橢圓形，厚革質，長10到18公分，寬4到8公分，圓頭略凹形，全緣或波狀，葉柄剛強粗壯，長1至2.5公分。

花：花期為4到5月及7到8月，總狀花序、有時為圓錐花序，萼片4枚，花瓣4枚，白色，直徑2到2.5公分，雄蕊多數。

果：核果球形，直徑約2.5至3公分，成熟時黃色，肉質。



從瓊崖海棠的英文名「Indiapoon Beautyleaf」就知道它擁有「漂亮的葉子」。喜歡陽光充足的環境，不太耐寒，但能抗強風，是優良的海岸防風樹種。壽命很長但生長緩慢，因此木質硬且重，適合作傢俱或建材，不過因為它是直根性，側根很少，所以不耐移植。

觀賞路段


左營區：大中路（民族路至高鐵路）
小港區：世全路（沿海路至與高坪22路交界之中油門口）



高雄市 自行車道沿線行道樹之旅

樣貌豐富、路網綿密的自行車道，是高雄市最為人稱道的建設之一。依照多元而獨特的地理環境所設計，高雄市自行車道涵蓋海港、山林、河湖、田野、都會通勤、特殊景觀、運動挑戰，以及鄉間社區等八大類型。不論是沿著濱海自行車道貫穿生態濕地、觀光漁市與港灣，前往山區挑戰自我，或是在都會區內每日通勤，騎乘自行車不僅是欣賞行道樹的最佳方式之一，行道樹更提供騎士最佳的休憩遮蔭與清新空氣，是自行車騎士的最佳拍檔。

騎上鐵馬、御風馳騁的同時，多認識一些沿途遇到的行道樹好朋友，兩輪前行的旅程將充滿更多樂趣！




市區自行車道 — 愛河沿線

- ① 河東路：黑板樹、黃連木、黃槿、鳳凰木、雨豆樹
- ② 同盟路：大葉桃花心木、掌葉蘋婆、鐵刀木、黑板樹、黃花風鈴木、鳳凰木、中東海棗
- ③ 美術館路：小葉欖仁、大葉山欖
- ④ 新庄仔路：黑板樹、掌葉蘋婆、藍花楹
- ⑤ 天祥路：美人樹
- ⑥ 博愛路：樟樹、黃花風鈴木、小葉欖仁、雨豆樹、風鈴木、大王椰子



—— 已建置自行車路線
- - - - 建置中自行車路線



市區自行車道 — 主要幹道與捷運沿線




- ❶ 凱旋路：鐵刀木、印度紫檀、榕樹、樟樹
- ❷ 民權路：台灣欒樹、樟樹、蒲葵
- ❸ 新光路：美人樹
- ❹ 四維路：吉貝棉、陰香、欖樹
- ❺ 民生路：台灣欒樹、陰香、土肉桂、樟樹
- ❻ 中正路：風鈴木、雨豆樹、印度紫檀、青剛櫟



市區自行車道 — 蓮池潭周邊



- ❶ 蓮潭路：榕樹
- ❷ 翠華路：阿勃勒、掌葉蘋婆、小葉欖仁、盾柱木、黑板樹
- ❸ 左楠路：小葉桃花心木
- ❹ 世運大道：小葉欖仁、大王椰子



市區自行車道 — 後勁溪流域



- ❶ 德民路：黑板樹、木棉樹、印度紫檀、鐵刀木、掌葉蘋婆
- ❷ 高雄大學路：雨豆樹
- ❸ 創新路：印度紫檀、大葉桃花心木

市區自行車道 — 澄清湖周邊



- ❶ 大埤路：塔樹、印度紫檀、雨豆樹
- ❷ 環湖路：大王椰子
- ❸ 環湖內側：南洋櫻



市區自行車道 — 旗津




- ① 旗津一路：海欖果
- ② 旗津二路、三路：欖仁樹、刺桐、海棗、水黃皮、榕樹
- ③ 中洲二路、三路：雜交木麻黃、欖仁樹



海岸自行車道 — 茄萣、永安



- ① 永安路：黑板樹
- ② 仁愛路一段：小葉欖仁
- ③ 仁愛路三段：黑板樹



海岸自行車道 — 岡山、彌陀、梓官、橋頭




- ① 公園路：黑板樹
- ② 南寮路：盾柱木
- ③ 芋寮路：台灣欒樹
- ④ 柳橋西路：茄冬
- ⑤ 阿公店路：小葉欖仁
- ⑥ 岡燕路：長葉垂榕
- ⑦ 嘉新東路：美人樹
- ⑧ 河華路：印度紫檀



高屏溪沿岸自行車道

① 高屏溪堤側：台灣欒樹





旗山美濃自行車道



- ① 中華路：鐵刀木
- ② 中學路：大葉桃花心木
- ③ 延平一路：黑板樹、阿勃勒
- ④ 旗南一路：台灣欒樹





旗山美濃自行車道



- ① 中正路一段：羊蹄甲
- ② 福美路：台灣欒樹、阿勃勒、小葉欒仁
- ③ 中山路：臘腸樹
- ④ 民權路：小葉欒仁
- ⑤ 民族路：小葉欒仁





阿公店中寮山周邊



- ① 復安路：雜交木麻黃、樟樹、菩提樹



鳳山溪前鎮河自行車道




- ① 澄清路：小葉欖仁
- ② 鞞汽路：風鈴木
- ③ 翠亨南北路：烏柏
- ④ 前鎮河兩側：大葉桃花心木
- ⑤ 擴建路：榕樹



高雄市常見行道樹索引

依中文名稱筆畫順序

筆畫	中文名	學名	頁碼
2 畫	九芎	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Kochne	14
3 畫	土肉桂	<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira	46
	大花紫薇	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	12
	大葉桃花心木	<i>Swietenia macrophylla</i> King	50
	大王椰子	<i>Roystonea regia</i> (H. B. K.) O. F. Cook	88
	大葉山欖	<i>Palaquium formosanum</i> Hayata	90
	小葉欖仁	<i>Terminalia boivinii</i> Tul.	48
4 畫	木棉	<i>Bombax ceiba</i> L.	16
	火焰木	<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	20
	毛柿	<i>Diospyros philippensis</i> (Desr.) Gurke	54
	水黃皮	<i>Derris indica</i> (Lamk.) Barnett	93
5 畫	台灣欒樹	<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A. C. Smith	22
	台灣赤楠	<i>Syzygium formosanum</i> (Hayata) Mori	55
	印度紫檀	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	24
	白千層	<i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S. T. Blake	52
6 劃	吉貝棉	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	15
	羊蹄甲	<i>Bauhinia variegata</i> L.	25
	光臘樹	<i>Fraxinus griffithii</i> C. B. Clarke	57
7 畫	杜英	<i>Elaeocarpus decipiens</i> Hemsl.	58
8 畫	阿勃勒	<i>Cassia fistula</i> L.	28
	雨豆樹	<i>Albizia saman</i> (Jacq.) F. Muell.	30
	刺桐	<i>Erythrina variegata</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr.	31
	花旗木	<i>Cassia barkeriana</i>	32
	直幹相思樹	<i>Racosperma mangium</i> (Willd.) L. Pedley	59
	肯氏南洋杉	<i>Araucaria cunninghamii</i> D. Don	60



大坪頂林園自行車道



- ① 高松路：樟樹、雨豆樹
- ② 高坪十五路：小葉欖仁
- ③ 高坪二十二路：印度紫檀、欖仁、樟樹
- ④ 高坪十八路：樟樹

筆畫	中文名	學名	頁碼
8 畫	長葉垂榕	<i>Ficus maclellandii</i> King	61
	青剛櫟	<i>Quercus glauca</i> Thunb. ex A. Murr.	64
9 畫	洋紫荊	<i>Bauhinia purpurea</i> L.	26
	盾柱木	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) Backer ex Heyne	33
	紅花鐵刀木	<i>Cassia grandis</i> L. f.	45
	風鈴木	<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. exDC.) Standl.	34
	美人樹	<i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil	18
	南洋櫻	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq) Kunth ex Walp.	36
	茄冬	<i>Bischofia javanica</i> Blume	62
10 畫	桃樹	<i>Prunus Persica</i> (L.) Batsch	37
	桃花心木	<i>Swietenia mahagoni</i> Jacq.	51
	烏柏	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	65
	翅子木	<i>Pterospermum acerifolium</i> (L) Willd.	66
	無患子	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertner	67
	海棗	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	96
	海欖果	<i>Cerbera manghas</i> L.	94
11 畫	陰香	<i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees) Blume	47
12 畫	黃花風鈴木	<i>Cybistax donnell smithii</i> (Rose) Seib	35
	黃槐	<i>Senna surattensis</i> (Burm.f) Irwin & Barneby	38
	黃連木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	72
	黃槿	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	97
	掌葉蘋婆	<i>Sterculia foetida</i> L.	68
	菩提樹	<i>Ficus religiosa</i> L.	70
	黑板樹	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	74
	華盛頓椰子	<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex Andre) Wendl.	89

筆畫	中文名	學名	頁碼
12 畫	棋盤腳	<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz	98
13 畫	楝樹	<i>Melia azedarach</i> L.	39
	楓香	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	75
	塔樹	<i>Polyalthia longifolia</i> (Sonn.) Thwaites Pendula	76
	稜果榕	<i>Ficus septica</i> Burm. f.	99
14 畫	鳳凰木	<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf .	40
	緋櫻	<i>Prunus campanulata</i> Maxim	42
	福木	<i>Garcinia subelliptica</i> Merr.	77
	榕樹	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	78
	銀樺	<i>Grevillea robusta</i> Cunn. ex R. Br.	80
	銀葉樹	<i>Heritiera littoralis</i> Dryand.	81
	蒲葵	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. var.	102
15 畫以上	樟樹	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl	82
	雜交木麻黃	<i>Casuarina × hybrid</i> hort. (c.cunninghamia × c. glauca)	100
	藍花楹	<i>Jacaranda mimosifolia</i> P. Don	43
	瓊崖海棠	<i>Clophyllum inophyllem</i> L.	103
	鐵刀木	<i>Senna siamea</i> (Lamk.) H.S.Irwin & RC. Barneby	44
	麵包樹	<i>Artocarpus camansi</i> Blanco	84
	臘腸樹	<i>Kigelia africana</i> (Lamk.) Benth.	85
	鐵冬青	<i>Ilex rotunda</i> Thunb. ex A.Murr.	86
	樺樹	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	56
	欖仁	<i>Terminalia catappa</i> L.	92
	豔紫荊	<i>Bauhinia × blakeana</i> Dunn.	27
檸檬桉	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	87	

行道樹路段介紹

	路段	樹名
三民區	九如路	黃連木、鐵刀木、大花紫薇、印度紫檀、菩提樹
	大順路	印度紫檀、雨豆樹
	中華路	大王椰子、大花紫薇、肯氏南洋杉、印度紫檀、鳳凰木
	天祥路	美人樹
	民族路	木棉、黃連木、黑板樹、樟樹
	同盟路	大葉桃花心木、海棗、鳳凰木、掌葉蘋婆
	自由路	白千層
	金鼎路	大葉桃花心木
	建工路	樟樹
	建國路	菩提樹、銀樺
	澄清路	茄冬、大花紫薇
	博愛路	大王椰子、美人樹
	鼎力路	印度紫檀
大社區	旗楠路	可可椰子、木麻黃、樟樹、榕樹
	三民路	黑板樹
	中正路	黑板樹、榕樹
	中山路	黑板樹、榕樹、小葉欖仁
大寮區	力行路	欖仁、樟樹、大葉山欖
	光明路	台灣欖樹、黑板樹
	會結路	台灣欖樹
	鳳屏一、二路	大葉桃花心木、小葉欖仁、台灣欖樹、黑板樹、桃花心木
大樹區	中正路	小葉欖仁
	三和路	台灣欖樹、大花紫薇、桃花心木
	九曲路	大花紫薇、大王椰子、桃花心木
小港區	大業北路	風鈴木、榕樹
	山明路	大葉桃花心木、棋盤腳
	中山四路	海棗、雨豆樹
	中安路	印度紫檀
	中林路	茄冬、榕樹
	中鋼路	茄冬、樟樹
	世全路	大葉山欖、瓊崖海棠
	台機路	羊蹄甲、瓊崖海棠
	光和路	掌葉蘋婆
	明聖街	陰香
	沿海一路	海棗、美人樹
	沿海二路	海棗
	飛機路	美人樹、黃槿
	高坪 18 路	樟樹
	高坪 22 路	印度紫檀、欖仁樹
高坪 23 路	印度紫檀、榕樹、樟樹	
高鳳路	台灣欖樹、光臘樹	

	路段	樹名
小港區	博學路	印度紫檀、棟樹
	漢民路	黑板樹
	營口路	棟樹、直幹相思樹
六龜區	台 20 線	九芎、黃槐
	台 28 三民路	桃花心木、台灣欖樹
	茂林國家公園風景區六龜遊客中心前	花旗木
內門區	台 3 線實踐大學前	風鈴木
仁武區	水管路	海棗、大花紫薇
	水管路二、三段	海棗、大花紫薇、茄冬、桃花心木
	學府路	桃花心木
	仁林路	黃花風鈴木
左營區	大中路	大葉山欖、杜英、銀樺、鐵冬青、瓊崖海棠
	大順路	雨豆樹、黑板樹
	世運大道	大王椰子
	民族路	黑板樹
	自由路	水黃皮、福木、黑板樹
	博愛路	小葉欖仁、風鈴木、黃花風鈴木、樟樹
	華夏路	黃連木
	新庄仔路	光臘樹、藍花楹
翠華路	小葉欖仁、桃花心木、盾柱木、陰香、掌葉蘋婆、黑板樹	
永安區	高 20 永安路	黑板樹
田寮區	崗安路	榕樹、桃花心木
甲仙區	台 20 新興路	台灣欖樹
	台 20 線 (56-63K)	艷紫荊
	台 20 線 (64K-66K)	台灣赤楠
	台 20 線 (65K-66K)	黃槐
	台 20 線 (67K-68K) 新興路	九芎
	忠孝路	鳳凰木
	新興路	艷紫荊
杉林區	山仙路	台灣欖樹
	司馬路	樟樹
	清水路(台 21 線)、縣道 181 0-2.5K	火焰木
那瑪夏	瑪雅聯絡道	緋櫻
岡山區	岡燕路	長葉垂榕
	阿公店路二段	大花紫薇、小葉欖仁
	柳橋西路	茄冬
	高 28 河華路	印度紫檀
	高 28 嘉新東路	美人樹
	聖森路	盾柱木
林園區	鳳林路一、二段	小葉欖仁、大葉桃花心木、黑板樹、榕樹

	路段	樹名
阿蓮區	復安路	雜交木麻黃、菩提樹、樟樹、黑板樹
	高9石安	黑板樹
前金區	七賢路	風鈴木
	中正路	青剛櫟
	中華路	大花紫薇、白千層、福木
	六合路	水黃皮
	市中一路	臘腸樹
	民生路	土肉桂、台灣樂樹、陰香、楓香、福木、銀樺
	成功路	大花紫薇
	河東路	黃槿、鳳凰木
	一心路	白千層
前鎮區	中山路	海棗、阿勃勒、棟樹、雨豆樹、黃連木、黑板樹
	中華五路	蒲葵
	民權路	台灣樂樹、麵包樹、蒲葵
	光華路	蒲葵、陰香
	和平二路	風鈴木
	金福路	毛柿、棟樹
	時代大道	小葉欖仁
	凱旋路	小葉欖仁、掌葉蘋婆
	翠亨南北路	烏柏
	中正路一段(181縣道)	羊蹄甲
美濃區	美中路	羊蹄甲
	中華路	台灣樂樹
	中興路一段(台28)	阿勃勒
	中興路二段(台28)	印度紫檀
	成功路	阿勃勒
	泰安路	阿勃勒、小葉欖仁
	福美路	阿勃勒、小葉欖仁
	忠孝路	小葉欖仁
	光明街	小葉欖仁
	中山路二段(高140)	臘腸樹
	復興路(181縣道)	樟樹
茄萣區	高3仁愛路一段、三段	小葉欖仁、黑板樹
苓雅區	三多路	雜交木麻黃、火焰木、印度紫檀
	大順路	大花紫薇
	中山路	黃連木
	中正路	雨豆樹、風鈴木
	五福路	黃連木
	四維路	吉貝棉、陰香、樺樹
	民權路	台灣樂樹、蒲葵、樟樹
	光華路	阿勃勒
	成功路	美人樹、黃槿

	路段	樹名
苓雅區	和平路	菩提樹、翅子木、阿勃勒
	青年路	福木、樟樹、華盛頓椰子
	海邊路	藍花楸
	凱旋路	鐵刀木、麵包樹、艷紫荊、洋紫荊
	輔仁路	無患子
	廣州一街	阿勃勒
茂林區	高132線	台灣樂樹、桃花心木、火焰木、鳳凰木
	情人谷聯絡道	台灣樂樹、桃花心木、火焰木、鳳凰木
桃源區	台20線(124K-145K)	緋櫻
	台20線(80K+500-94K、96K-98K104K-113K、117K-124K)	桃樹
	台20線(82K-84K)	銀合歡
梓官區	高30芋寮路	台灣樂樹
鳥松區	大埤路	塔樹、垂榕
	澄清路	大花紫薇
	澄清湖	南洋櫻
	中正路	大花紫薇、樟樹、土肉桂
	圓山路	印度紫檀、台灣樂樹、樟樹、茄冬
	環湖路	大王椰子、黃連木、檸檬桉
	濱湖路	豔紫荊
湖內區	高5民族街	羊蹄甲
	高6忠孝街	小葉欖仁
新興區	中山路	黃連木
	中正路	青剛櫟、雨豆樹
	民生路	台灣樂樹、陰香、樟樹、土肉桂、肯氏南洋杉
	民族路	榕樹、黑板樹、樟樹
	民權路	台灣樂樹
楠梓區	土庫一路	黃花風鈴木
	大學南路	盾柱木、楓香
	外環西路	印度紫檀
	卓越路	印度紫檀
	後昌路、區東路	大葉桃花心木、白千層、印度紫檀
	海專路	樟樹
	高楠公路	陰香
	清豐路	木棉
	援中路	洋紫荊、黃花風鈴木
	楠陽路	鐵刀木
	旗楠路	印度紫檀
	德民路	木棉、水黃皮、鐵刀木
	學專路	樟樹
興楠路	台灣樂樹	

	路段	樹名
路竹區	高 10 大仁路	火焰木
	高 10-1 一甲路	小葉欖仁
	高 12 新生街	阿勃勒
鼓山區	九如四路	阿勃勒、銀葉樹
	大順路	大葉山欖
	中華一路	大王椰子、印度紫檀、鳳凰木
	河西路與馬卡道路交接槽化島	花旗木
	美術館路	大葉山欖、小葉欖仁
	美術東一街、七街	烏柏
	博愛路	黃連木
	華榮路	艷紫荊
鼓山路	火焰木	
旗山區	台 28 中學路、旗甲路一段、忠孝街	大葉桃花心木
	延平一路	阿勃勒、黑板樹
	華中街、旗南一路	台灣欖樹
旗津區	旗山公園	紅花鐵刀木
	中洲二路、三路	雜交木麻黃
	旗津一路北端近二路	海欖果
鳳山區	旗津二路、三路	水黃皮、刺桐、榕樹、欖仁樹
	五甲一、二路	小葉欖仁
	南京路	黃花風鈴木
	澄清路	小葉欖仁、茄冬
	國泰路	美人樹、掌葉蘋婆
	建國路	大葉桃花心木
	鳳屏路	大葉桃花心木
橋頭區	衛武營都會公園	南洋櫻
	高 34 橋燕路	印度紫檀
	高 34 安新路	台灣欖樹
燕巢區	高 34 通燕路	雜交木麻黃
	高 186 角宿路	台灣欖樹
	高 35 四林路	水黃皮
	高 36 大學路	美人樹
彌陀區	高 36 大學路	美人樹
	高 21 文安路東段	黑板樹
	高 23 公園路	黑板樹
	高 23 海尾路	盾柱木
鹽埕區	高 23 漂底路	黑板樹
	高 26 南寮路	盾柱木
	七賢二路	大花紫薇
鹽埕區	七賢三路	梭果榕、塔樹
	五福路	南洋櫻



城市美學

從關心身旁行道樹開始

行道樹，這看似理所當然、處處可見的植栽，其實是需要投入大量心力規劃與維護的重要市政建設。高雄市政府工務家族的養護工程處，不僅持續經營市區各地綠園道、安全島及公園綠地，使城市植栽生態維持在最佳狀況，更栽植多樣開花行道樹，搭配時序草花，運用植物自然變換的色彩，豐富市容面貌，為城市注入美學精神。



由於行道樹的生長與形態攸關市容景觀、道路安全及環境品質，其維護便愈顯重要。高雄市政府養護工程處於 2012 年特別成立「樹木修剪小組」，由養工處專業人員及聘請之學者專家組成，更與民間



的福田樹木保育基金會合作，理論與實務雙管齊下，提升高雄市公園、綠地及人行道樹木修剪維護品質。

專業的樹木修剪除了防範颱風時傾倒、傷害用路人，還能增加樹冠內部通風、透光而減少病蟲害，更可以提昇市容景觀。像是中正路中央分隔島雨豆樹的樹木養成、修剪，便使得樹勢及生育形態已漸趨完善，雨豆大道的成形指日可待，此一專業修剪維護工作，正逐步推廣至全高雄市各轄區，讓全高雄皆能以嶄新的行道樹風貌建構各具特色的主題道路。

同時市府亦制訂有「植栽修剪作業施工說明書及作業規範」作為行道樹修剪的依據，並逐年進行更新及辦理樹木修剪講習會，顯見高雄市政府對於行道樹相關建設的重視。

然而最重要的，還是市民朋友對於身旁行道樹所付出的關懷與愛護，上班、逛街途中會看到哪些路樹？住家巷口的又是什麼樹？欣賞並享受這些綠色精靈帶給我們生活美好的同時，它們的生長狀況如何？何時開花？上頭住了哪些小生物呢？……每位市民都多一份關心，高雄的生活品質就多一分進步，而高雄的城市美學，就在這潛移默化間，優雅而獨特的顯現！

高雄市政府工務局養護工程處處長

趙建喬

高雄市 常見 行道樹 導覽地圖

賞花行道樹



- 1 大花紫薇 D11,D12,D13,E12
- 2 九芎 I14
- 3 吉貝棉 D12
- 4 木棉 D9,E9
- 5 美人樹 D7,D11,D13,E12
- 6 火焰木 C12,E12,K3
- 7 台灣樂樹 D9,D12,G14,L5
- 8 印度紫檀 D11,D12,E9,E12,G14
- 9 羊蹄甲 E14,K4
- 10 洋紫荊 E12
- 11 豨薟草 D11,E12,F11,I14
- 12 阿勃勒 C11,D12,E12,K4,K5
- 13 再蕊樹 E12,F14
- 14 刺桐 C13
- 15 花旗木 D12,J14
- 16 盾柱木 B8,D7,D9,D11
- 17 風鈴木 D11,D12,E12,E13,I4
- 18 黃花風鈴木 D9,E9
- 19 南洋櫻 D12,E11,E12
- 20 桃樹 K13
- 21 黃槐 J14
- 22 楝樹 E13,F14
- 23 鳳凰木 D11,D12,I14
- 24 緋櫻 K13,L1
- 25 藍花楸 D11,D12
- 26 鐵刀木 D9,E12
- 27 紅花鐵刀木 I5

觀葉遮蔭行道樹

- 28 土肉桂 D12
- 29 陰香 D12
- 30 小葉欖仁 D11,D13,E12,E13,J4,J5
- 31 大葉桃花心木 D11,E11,F12,F14,I5
- 32 桃花心木 D10,I16
- 33 白千層 D10,D11,D12,D13,E13
- 34 毛楠 E14
- 35 台灣赤楠 D8,I14
- 36 樟樹 D12
- 37 光臘樹 D11,F13
- 38 杜英 D10
- 39 直幹相思樹 F14
- 40 青氏南洋杉 D12
- 41 刺桐 C13
- 42 茄冬 D7,E12,F15
- 43 青剛櫟 E12
- 44 烏桕 D11,E13
- 45 翅子木 E12
- 46 無患子 E12
- 47 掌葉蘋婆 D11,D13,E12,E14
- 48 菩提樹 C12,D12,E6,E12
- 49 黃連木 D10,D11,D12,D13
- 50 黑板樹 A4,B7,B8,D5,D10,D11,D12,D13,E6
E11,E14,G12,I5
- 51 椴香 C9
- 52 塔樹 C9,D12,F11
- 53 福木 D11,D12
- 54 榕樹 D12,D13,E14,F15,G14
- 55 銀禧 D11,D12
- 56 銀葉樹 C11
- 57 楊梅 D9,D10,D12,E6,F14,G14,I15,K5,L2,L6
- 58 雞包樹 E12,D13
- 59 臘腸樹 D12,K4
- 60 鐵冬青 D11
- 61 檸檬桉 A5,F11

濱海植物與其他

- 62 大王椰子 D10,D12
- 63 華盛頓椰子 D12
- 64 大葉山欖 D11,F14
- 65 欖仁 D13,F14
- 66 水黃皮 D9,D11,D12,D13,E8
- 67 海欖果 D9,D14
- 68 海欖 D11,E13,E14,F14
- 69 黃槿 D12,F14
- 70 棋盤腳 F14
- 71 椶櫚 D12
- 72 雜交木麻黃 E6,E8,E12,C13
- 73 蒲葵 D12,D13
- 74 瓊崖海棠 D10,F14



—— 已建置完成自行車道
- - - - 建置中自行車道
- · - · - 尚未通行路段
● 景點
★ 景觀橋
— 國道
— 省道
— 捷運橘線
— 捷運紅線
— 台鐵
— 高鐵

高雄市常見行道樹圖鑑

高雄市政府工務局養護工程處
四維行政中心 80203 高雄市苓雅區四維三路 2 號 (07)336-8333
鳳山行政中心 83001 高雄市鳳山區光復路二段 132 號 (07)799-5678

賞花行道樹

5 美人樹 <i>Chorisia speciosa</i> A. St. Hil 三民區：愛河之心周邊 苓雅區：成功路 岡山區：高 28 鳳山區：國泰路	6 火焰木 <i>Spathodea campanulata</i> Beauv. 苓雅區：三多路 鼓山區：鼓山路 杉林區：清水路	7 台灣欒樹 <i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A. C. Smith 苓雅區：民權路 新興區：民生路 六龜區：三民路 大寮區：光明路 楠梓區：興楠路	8 印度紫檀 <i>Pterocarpus indicus</i> Willd. 三民區：九如路、大順路 小港區：高坪 23 路 楠梓區：卓越路 苓雅區：三多路	9 羊蹄甲 <i>Bauhinia variegata</i> L. 小港區：台機路 美濃區：中正路一段	10 洋紫荊 <i>Bauhinia purpurea</i> L. 苓雅區：凱旋一路	11 豔紫荊 <i>Bauhinia × blakeana</i> Dunn. 苓雅區：凱旋路 鼓山區：華榮路 甲仙區：新興路 鳥松區：濱湖路	12 阿勃勒 <i>Cassia fistula</i> L. 苓雅區：和平路、光華路、林德街、廣州一街 鼓山區：九如四路 美濃區：成功路、泰安路、福美路
---	--	---	--	--	--	---	--

13 雨豆樹 <i>Albizia saman</i> (Jacq.) F. Muell. 三民區：大順路 小港區：中山四路 苓雅區：中正路	14 刺桐 <i>Erythrina variegata</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr. 旗津區：旗津二路、旗津三路	15 花旗木 <i>Cassia barkeriana</i> Craib 六龜區：茂林國家風景區六龜遊客中心前 鼓山區：河西路與馬卡道路交接之槽化島	16 盾柱木 <i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) Backer ex Heyne 左營區：翠華路 楠梓區：大學南路 岡山區：聖森路 彌陀區：高 26 南寮路、高 23 海尾路	17 風鈴木 <i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl. 苓雅區：中正路 新興區：七賢路 前鎮區：和平二路 左營區：博愛路 新莊仔路	18 黃花風鈴木 <i>Cybisstax donnell smithii</i> (Rose) Seib 楠梓區：土庫一路、援中路	19 南洋櫻 <i>Gilgicidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp. 鳳山區：衛武營都會公園 鳥松區：環澄清湖一帶 鹽埕區：五福路	20 桃樹 <i>Prunus Persica</i> (L.) Batsch 桃源區：台 20 線 (80K-500-94K、96K-98K、104K-113K、117K-124K)
---	--	---	--	---	---	--	---

21 黃槐 <i>Senna surattensis</i> (Burm. f.) Irwin & Barneby 六龜區：台 20 線 (65K-66K)	22 楝樹 <i>Melia azedarach</i> L. 小港區：博學路 前鎮區：中山路	23 鳳凰木 <i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf. 三民區：中華路 鼓山區：中華一路 甲仙區：忠孝路	24 緋櫻 <i>Prunus campanulata</i> Maxim 桃源區：台 20 線 (124K-145K) 那瑪夏區：瑪雅聯絡道	25 藍花楹 <i>Jacaranda mimosifolia</i> P. Don 三民區：布里斯本公園 苓雅區：海邊路 左營區：新莊仔路	26 鐵刀木 <i>Senna siamea</i> (Lamk.) H.S. Irwin & R.C. Barneby 苓雅區：凱旋路 楠梓區：德民路	27 紅花鐵刀木 <i>Cassia grandis</i> L. f. 旗山區：旗山公園
---	---	--	---	---	--	--

觀葉遮蔭行道樹

28 土肉桂 <i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira 前金區：民生路中央分 隔島間補植	29 陰香 <i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees) Blume 四維路、民生路、民族路	30 小葉欖仁 <i>Terminalia boivinii</i> Tul. 左營區：翠華路 美濃區：福美路、忠孝路 鼓山區：美術館路 鳳山區：五甲路、光明街 前鎮區：時代大道	31 大葉桃花心木 <i>Swietenia macrophylla</i> King 三民區：同盟路、金鼎路 小港區：山明路 旗山區：台 28 中興路、旗甲路一段、忠孝街 鳳山區：建國路、鳳屏路	32 桃花心木 <i>Swietenia mahagoni</i> Jacq. 左營區：翠華路 楠梓區：左楠路 六龜區：台 28 三民路	33 白千層 <i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S. T. Blake 三民區：自由路、中華二、三路 楠梓區：後昌路和區東路 前鎮區：一心路、中華三、四路	34 毛柿 <i>Diospyros philippensis</i> (Destr.) Gurke 前鎮區：金福路	35 台灣赤楠 <i>Syzygium formosanum</i> (Hayata) Mori 甲仙區：台 20 線 (64K-66K) 橋頭區：隆豐路
--	---	--	--	---	---	---	---

36 欖樹 <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino 苓雅區：四維三路	37 光臘樹 <i>Fraxinus griffithii</i> C. B. Clarke 小港區：高鳳路 左營區：新莊仔路	38 杜英 <i>Elaeocarpus decipiens</i> Hensl. 左營區：大中路	39 直幹相思樹 <i>Racosperma mangium</i> (Willd.) L. Pedley 小港區：營口路	40 肯氏南洋杉 <i>Araucaria cunninghamii</i> D. Don 三民區：中華路 新興區：民生圓環	41 長葉垂榕 <i>Ficus macleanii</i> King 岡山區：岡南路	42 茄冬 <i>Bischofia javanica</i> Blume 小港區：中林路 三民區：澄清路 岡山區：柳橋西路	43 青剛櫟 <i>Quercus glauca</i> Thunb. ex A. Murr. 新興區：中正路
--	---	--	--	--	--	---	--

44 烏柏 <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb. 前鎮區：翠亨南北路 鼓山區：美術東一街 美術東七街	45 翅子木 <i>Pterospermum acerifolium</i> (L.) Willd. 苓雅區：和平路	46 無患子 <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertner 苓雅區：輔仁路	47 掌葉蘋婆 <i>Sterculia foetida</i> L. 三民區：同盟路 前鎮區：凱旋路 小港區：光和路 鳳山區：國泰路 左營區：翠華路 建軍路	48 菩提樹 <i>Ficus religiosa</i> L. 三民區：九如路、建國路 苓雅區：和平路、建國路 阿蓮區：高 13 復安路	49 黃連木 <i>Pistacia chinensis</i> Bunge 三民區：九如路 民族路 左營區：華夏路 前鎮區：中山路 苓雅區：中山路 五福路 新興區：中山路	50 黑板樹 <i>Alostonia scholaris</i> (L.) R. Br. 三民區：民族路 小港區：漢民路 左營區：翠華路、自由路、大順路 新興區：民族路 前鎮區：中山路、彌陀區：高 23 公明路、漢庭路、高 21 文安路、高 20 永安路、高 20 永安路、高 3 仁愛路三段、高 3-1 阿蓮區：高 9 石安、高 14 復安路 旗山區：延平一路 大寮區：光明路三段	51 楓香 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 楠梓區：大學南路 大學西路
---	---	--	---	--	---	---	--

52 塔樹 <i>Polyalthia longifolia</i> (Sonn.) Thwaites Pendula 前金區：同盟路 楠梓區：大學西路 鳥松區：大埤路	53 福木 <i>Garcinia subelliptica</i> Merr. 苓雅區：青年路 左營區：自由路 前金區：中華路、民生路	54 榕樹 <i>Ficus microcarpa</i> L. f. 小港區：高坪 23 路、中林路、大業北路 新興區：民族路 旗津區：旗津二路、三路	55 銀樺 <i>Grevillea robusta</i> Cunn. ex R. Br. 左營區：大中路 三民區：建國路 前金區：民生路	56 銀葉樹 <i>Heritiera littoralis</i> Dryand. 鼓山區：九如四路	57 樟樹 <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl 三民區：民族路、建工路 苓雅區：青年一路、民權路 小港區：高坪 18 路、高坪 23 路、中林路 左營區：博愛路 新興區：民族路、民生路 楠梓區：海東路、學學路 美濃區：復興路、復興路二段 阿蓮區：高 13-1 復安路 杉林區：高馬路	58 麵包樹 <i>Artocarpus canansi</i> Blanco 苓雅區：凱旋路 前鎮區：民權路	59 臘腸樹 <i>Rigelia africana</i> (Lamk.) Benth. 前金區：市一路 美濃區：高 140 中山路二段
---	---	---	---	--	--	---	--

濱海植物與其他

60 鐵冬青 <i>Ilex rotunda</i> Thunb. ex A. Murr. 左營區：大中路	61 檸檬桉 <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook. 鳥松區：環湖路 茄萣區：濱海路一段	62 大王椰子 <i>Roystonea regia</i> (H. B. K.) O. F. Cook 三民區：博愛路 左營區：世運大道	63 華盛頓椰子 <i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex Andre) Wendl. 苓雅區：青年路	64 大葉山欖 <i>Palaquium formosanum</i> Hayata 小港區：世全路 左營區：大中路 鼓山區：美術館路、大順路	65 欖仁 <i>Terminalia catappa</i> L. 旗津區：旗津二路、三路 小港區：高坪 22 路	66 水黃皮 <i>Derris indica</i> (Lamk.) Barnet 前金區：六合路 旗津區：旗津三路、橋梓區：德民路、二路 左營區：自由路 燕巢區：高 35 四林路 中山路二段	67 海欖果 <i>Cerbera manghas</i> L. 旗津區：旗津一路北端近二路 楠梓區：後勁溪步道	68 海棗 <i>Phoenix dactylifera</i> L. 三民區：同盟路 前鎮區：中山四路 小港區：中山四路、沿海一、二路	69 黃槿 <i>Hibiscus tiliaceus</i> L. 小港區：飛機路 苓雅區：成功路 前金區：河東路	70 棋盤腳 <i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz 小港區：山明路	71 稜果榕 <i>Ficus septica</i> Burm. f. 鹽埕區：七賢三路	72 雜交木麻黃 <i>Casuarina × hybrid</i> hort. (c. cunninghamia × c. glauca) 苓雅區：三多路 旗津區：中洲二路、三路 橋頭區：高 34 通燕路 阿蓮區：高 13 復安路	73 蒲葵 <i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Br. var. 前鎮區：民權路 中華五路 苓雅區：民權路	74 瓊崖海棠 <i>Clophyllum inophyllum</i> L. 左營區：大中路 小港區：世全路
--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	---