

高雄市常見花木導覽手冊

高雄市政府工務局養護工程處






一起進入萬花筒般的創意城市

高雄不僅是綠色城市，更是個「花花世界」！不論是春夏粉嫩的日日春、天使花、馬纓丹，或是秋冬溫暖的矮牽牛、一串紅，及全年的九重葛，這些小小的草花、灌木，不但為市民生活帶來色彩，更在城市發展中扮演著小兵立大功的重要角色。

高雄市近年進行創意城市萬花筒計畫，結合工務局、農業局及都市發展局等14個單位、38個區公所合作，動員3000多位志工、122個社區組織和公會等齊心投入，持續辦理城市花田倍增、閒置空地綠美化、清淨家園社區改造、景觀花藝競賽等工作，讓高雄整體增加了303公頃的綠地，平均每位市民享有10.58平方公尺綠地面積（2013年6月統計）。

市府團隊進行這些規劃時，皆以生態理念配合地區意象與節慶活動，使得各種植栽不僅提高生活與景觀品質，更帶動區域觀光，促進地方發展，讓高雄成為視覺繽紛豐富、生活充滿魅力的城市，且陸續獲得國際宜居城市競賽、2012年行政院「政府服務品質獎」及張榮發基金會2012年「台灣健康城市」環境改造類等獎項肯定。 因此當您來到這萬花筒般的創意城市，不妨多關注高雄的花木，更能感受這城市帶來的活力與喜悅！

高雄市長 陳菊

隨處可得的繽紛生活

致力成為一座充滿綠意與健康環保的幸福城市，是高雄市政府工務局各項建設努力的目標。除了積極推動諸多重大建設、用心打造不同特性的主題公園與濕地生態廊道，工務局亦關注許多看似不起眼、卻對於市容景觀與碳排放量影響甚鉅的市政建設。

「全市植栽色彩計畫」就是重要項目之一，應用各種開花及彩葉植物之生育特性，隨著不同時序展現繽紛色彩，在一片綠意中，營造出城市亮點，或在水域周邊種植濱海、水生植物，塑造城市特色景觀。

同時工務團隊亦推動包括「閒置空地綠美化」、「城市花田」、「清淨家園．社區營造」，以及「高雄景觀花藝競賽」等計畫在內的「創意城市萬花筒計畫」，以生態永續與城市美學的理念與全面性的考量規劃，一舉解決景觀美質、閒置空地，與休耕農田等問題，並且由點延伸至面，全面提升高雄的景觀品質、綠地面積，並有效帶動地區觀光與環境減碳。

因此走在高雄街頭，處處可見令人愉悅的花朵以及具有南台灣海洋城市特色的植物，散佈高雄各角落的城市花田，更讓人感到振奮；這種隨處可得的繽紛，就是高雄的宜居幸福生活！

高雄市政府工務局局長 楊明州

植物形態觀察

認識我們身邊的花木，就從它們的外觀開始。最容易被觀察的，就是花木的葉、花與果實。本單元介紹常見的各種葉、花、果之型態，供民眾觀察時用以對照、辨別。

葉——葉是花木行光合作用的營養器官，在觀察植物時多半由葉子開始，因此也可說是花木的「名片」。觀察時可由葉形、葉緣與葉序（葉子生長的排序方式）來辨認。

花——花是植物的繁殖器官。有些植物葉形、樹形相近，這時可由其花朵區別。觀察時可由花序（指花排列於花軸上的次序；個別花的柄叫花梗，整個花枝的軸稱總花軸）以及花冠形狀（單朵花的形狀）認出不同植物。

果實——孕育種子的果實也是植物的繁殖器官，通常是在雌花受精後由子房發育而成，但也有由萼和花托形成的假果，或是裸子植物的毬果等；種類繁多，令人讚嘆造物之奧妙。

葉形—單葉



資料提供：國立屏東科技大學森林系植物標本館

植物形態觀察

葉形—複葉



葉序





葉緣



資料提供：國立屏東科技大學森林系植物標本館

植物形態觀察

花序



穗狀花序　總狀花序　棻荑花序　繖房花序　繖形花序　複繖形花序



頭狀花序　肉穗花序　聚繖花序　輪繖花序　圓錐花序　密錐花序　隱頭花序

花冠



盆形　輪形　漏斗形



鐘形　壺形　筒形　舌形



唇形　蝶形　十字形

果實



仁果　分離果　堅果



蓇葖果　核果　漿果



瘦果　翅果



蘋果　蓋果　長角果　莢果　節果　隱花果

資料提供：國立屏東科技大學森林系植物標本館

高雄市常見花木

高雄市屬於熱帶氣候，轄區內有山有海，也有平地、河流。市政府配合氣候、季節以及高雄的山光水色，在市區各地規劃種植了適合南台灣、種類豐富的各色花木。

本書介紹了超過九十種植物，並且依照植栽種類分為「四季草花」、「觀葉植物」、「觀花及香花植物」、「蔓性及藤類」、「濱海及水生植物」等類別。

每種植栽的介紹均包含其學名、別名、生物特徵，相關的小故事，有些植物之特定部位具有毒性，文中亦有註明，請民眾注意觀賞時盡量勿碰觸。另外，許多栽種容易、適合居家種植的花木，本書更提供「植栽小撇步」，提供民眾居家培養時的參考，讓滿街的絢麗順利延伸到每位市民家裡。

目錄

一起進入萬花筒般的創意城市 …… 2
隨處可得的繽紛生活 …… 3
植物型態觀察 …… 4
四季草花 …… 8
觀葉植物 …… 23
觀花及香花植物 …… 34
蔓性及藤類 …… 52
濱海及水生植物 …… 59
高雄城市花田 …… 68
索引 …… 77
健康多彩每一天 …… 80



天使花 *Angelonia salicariifolia* Humb. & Bonpl.





別　名：香彩雀
科　名：玄參科
原產地：中美洲、委內瑞拉、西印度西印度群島

一年生草本花卉，株高可以高達 80 公分，全株被腺毛。葉對生或上部互生，披針形或條狀披針形，長 7 公分，葉緣有彎曲的鋸齒。花單生於葉腋，花梗細長，花萼長 0.3 公分，5 裂達基部，花冠筒短，喉部有一對囊，上唇寬大 2 裂，下唇 3 裂，有紫、淡紫、粉紫、白等花色；蒴果球形。現在還有株高 25 至 30 公分的品種，可用種子繁殖，稱小天使花。

園藝小撇步

天使花喜歡溫暖的氣候，高於 18℃都能生長良好，繁殖時可利用插枝的方式，將枝條插入水中，就可以從缺口處長出根來，再移入土壤中成為一個新株。開花後，修剪殘花老枝，搭配施肥，能促進萌發新枝。



長春花 *Catharathus roseus* (L.) G. Don

別　名：日日春
科　名：夾竹桃科
原產地：馬達加斯加



多年生草本，葉對生，長橢圓狀至倒卵狀，先端圓鈍，葉柄短，全緣兩面光滑無毛。聚繖花序頂生或腋生，花冠高腳狀 5 裂向左覆蓋，全年皆可開花。蓇葖果直立，圓柱形。野生種長春花有很強的適應力，種子落地即到處生長，不用特別管理也可欣欣向榮，花色以粉紅色居多，偶有白色、桃紅色、紫紅等花色。若誤食會有四肢麻痺、無力等症狀。

園藝小撇步

長春花可用種子繁殖，現在國外雜交改良品種很多，有紅、白、紫、粉色花系，還有匍匐品種可以做吊缽懸掛，替居家生活增添色彩。



百日草 *Zinnia elegans* Jacq.

別　名：百日菊
科　名：菊科
原產地：墨西哥、北美洲

一年生直立草本，高 15 至 100 公分，莖被粗毛。葉對生，廣卵形至長橢圓形，基部抱莖全緣。頭狀花序單生於枝端，總梗直而中空，外圍舌狀雌花，花瓣一輪至多輪，瘦果有 1 至 3 芒。



園藝小撇步

用種子繁殖，採種要選花瓣重瓣且厚，不然易退化成單瓣；在短日照開花提早，且多形成管狀花，舌狀花瓣少，長日下開花較晚。

千日紅 *Gomphrena globosa* L.

別　名：圓仔花
科　名：莧科
原產地：巴拿馬、瓜地馬拉



一年生草本花卉，有分高矮品種，株高 50 至 60 公分，植株上部多分枝，莖直立。葉對生，短圓狀倒卵形，全緣葉面有絨毛；花為頂生頭狀花序，單生或 2 至 3 個花序，集生於枝端，每序有一較長的花梗，花序圓球形，膜質苞片粉紅色、橙紅色、玫紅色或白色。胞果近球形。

小故事

每年七夕情人節，民間習俗會以雞冠花和千日紅綁在一起，配以粉餅然後丟上低矮的屋瓦上，當作是給織女和牛郎約會時的配妝。



夏堇 *Torenia fournieri* Lind. ex Fourn.

別　名：花瓜草、花公草、藍豬耳
科　名：玄參科
原產地：越南



一年生草本，株高 20 至 30 公分，叢生狀，莖 4 棱。葉對生，有柄，卵形至卵狀披針形，銳鋸齒緣無毛。花腋生至頂生總狀花序，上唇 2 淺裂，下唇 3 裂，裂片圓形，有紫、桃紅、粉紅等花色。蒴果包於萼內。

園藝小撇步

夏堇可用種子、扦插繁殖，因為耐高溫，適合栽種在屋頂、陽台、花台。





大花松葉牡丹 *Portulaca pilosa* L. ‘Jewel’

別　名：太陽花、午時花、爬地牡丹
科　名：馬齒莧科
原產地：園藝栽培種



匍匐性年生肉質草本；葉圓柱形，長 2.5 公分；6 至 7 月開花，花頂生，2.5 至 4 公分，基部有葉狀苞片，早晨開花、下午閉合，所以又稱為午時花；未見結果。

園藝小撇步

品種很多，有單瓣、半重瓣、重瓣之分，喜陽光充足、溫暖乾燥的環境，耐高溫，一般土壤都能適應，能自播繁衍。

與馬齒牡丹相異處

馬齒牡丹有黃、白、桃紅、粉紅等鮮艷的花色，與大花松葉牡丹最大的差異在於，大花松葉牡丹葉為圓柱形，馬齒牡丹葉為楔狀矩圓形或倒卵形。



馬齒牡丹

彩葉草 *Solenostemon scutellarioides* (L.) Codd ‘Hybridas’

別　名：洋紫蘇、鈴紫蘇
科　名：唇形花科
來　源：栽培種



多年生草本，株高一般為 30 至 50 公分，最高可達 90 公分，少分株。葉對生，卵形，長約 15 公分，葉面綠色，具黃、紅、紫等斑紋色彩。圓錐花序，花小，淡藍或帶白色。夏秋結平滑的小堅果。

繁星花 *Pentas lanceolata* (Forsk.) Deflers.

別　名：五星花、草仙丹
科　名：茜草科
原產地：葉門、東非



直立或半直立灌木；葉對生，膜質，卵形，橢圓形或披針狀矩圓形，先端漸尖基部狹或有短柄；聚繖花序，約由 20 朵小花組成開於枝頭，花小，有藍紫、白粉、紅色等顏色；有高性與矮性種之分。

園藝小撇步

繁殖主用扦插繁殖，因為喜陽光，每天需要有 4 小時以上的直射光照，冬季溫度要求 10℃以上。

黃波斯菊 *Cosmos sulphureus* Cav.



別　名：硫黃菊、黃秋英
科　名：菊科
原產地：墨西哥、中美洲

一年生草本，植株高 60 至 100 公分，多分枝。葉對生，羽狀葉深裂，裂片披針形，有短尖。頭狀花序著生於枝頂，舌狀花之花色有純黃、金黃、橙黃，盤心管狀花呈黃色至褐紅色。瘦果有糙硬毛，有細長喙。

園藝小撇步

黃波斯全年開花，有自播繁衍的特點，適合用種子繁殖，播種後 6 至 7 週就可開花。因為馴化的結果，台灣各處都可以見到它的蹤影。

波斯菊 *Cosmos bipinnatus* Cav.



別　名：大波斯菊、秋英
科　名：菊科
原產地：墨西哥、北美洲南部

一年生草本，株高可達 120 至 150 公分，莖纖細直立，株形灑脫；葉互生，羽狀葉全裂，裂片稀疏，線形，全緣；頭狀花單輪或重瓣多輪，先端截形或有小缺刻，花色從白、粉紅、紫紅，盤心管狀花黃色。在春節前後，高雄常可看到波斯菊花田。

園藝小撇步

波斯菊花期在 11 至 1 月，主要用種子繁殖，在入秋後播種，天氣變涼日照變短後，就會開始開花。各變種和品種之間容易雜交而退化，繁殖時應注意隔離。因為自播能力強，在台灣部分山區已出現馴化的野生族群。



矮牽牛 *Petunia* × *hybrida* Vilm.

別　名：撞羽朝顏
科　名：茄科
原產地：阿根廷

一年生草本花卉，株高約 40 至 50 公分，全株上下都有粘毛，莖直立，花形類似牽牛花，叢生軟枝但不具蔓性，與牽牛花並無關係；葉互生，卵形，全緣幾無柄，嫩葉略對生；花單生於葉腋及頂生，花萼 5 裂，裂片披針形，花冠漏斗狀，花瓣變化多，有單瓣、半重瓣，瓣邊呈皺波狀，花色有白、藍、深紫、紅、紅白相間等色；蒴果有 2 瓣裂。

園藝小撇步

矮牽牛花期長，可從春末持續到秋末，繁殖以播種為主，但重瓣種和大花種常不易採到種子，可用扦插繁殖，溫度需保持 20℃左右，2 週可生根。需有日照，至少四小時以上，花色才會飽滿。



一串紅 *Salvia splendens* Sell. ex Roem. & Schult.



一串紫



別　名：西洋紅、紅花鼠尾草、爆竹紅
科　名：唇型花科
原產地：南美洲

多年生草本花卉，通常作一年生栽培，莖直立株高約 50 至 80 公分，有矮生種，株高約 20 至 30 公分，莖光滑有四棱；葉對生，卵形，先端尖，邊緣有鋸齒；總狀花序頂生，小花 2 至 6 朵輪生，花萼鐘狀與花瓣同色，除了紅色之外，還有白、紫、粉紅、桃紅、橙紅等花色；小堅果橢圓形。

園藝小撇步

繁殖以種子為主，播種的適宜溫度在 15 至 23℃之間，播種在排水良好的地方，長出 4、5 片葉子時就可移植，等幼株長到約 15 公分，就可定植在花盆、花壇，適度摘心可促使分枝，開花多。



四季秋海棠 *Begonia* × *semperflorens-cultorum* hort.

別　名：四季海棠、蜆肉秋海棠、瓜子海棠
科　名：秋海棠科
來　源：園藝雜交種

多年生肉質草本，莖直立，多分枝，肉質光滑，屬鬚根秋海棠；葉互生，卵形，有光澤，邊緣有鋸齒，綠色或帶褐紅色；花腋生，數朵成簇，淡紅色、白色或紅色；蒴果綠色，有帶紅色的翅。

園藝小撇步

繁殖以播種、扦插、分株等法繁殖，若用播種方式，最好使用當年採收的新鮮種子，以提高發芽率。







非洲鳳仙花 *Impatiens walleriana* Hook. f.

別　名：玻璃翠
科　名：鳳仙花科
原產地：坦尚尼亞、莫三比克

多年生草本，株高 20 至 30 公分，全株柔弱的肉質莖，光滑無毛；葉互生，卵狀披針形，葉緣有銳齒；花腋生，花徑約 4 至 5 公分，花色豐富，亦有雙色及重瓣品種；蒴果紡錘形，種子圓形，成熟後會自動爆開彈跳出來，所以要注意採收。



園藝小撇步

繁殖用播種或扦插為主，喜陰涼而濕潤的環境，不耐熱、不耐旱、忌長時夏季高溫日曬，盛夏時一下大雨即不見踪影。

萬壽菊 *Tagetes erecta* L.

別　名：臭芙蓉、臭菊、蜂窩菊
科　名：菊科
原產地：墨西哥、中美洲



一年生或多年生草本，葉粗壯；葉對生或互生，羽狀深裂，裂片披針形或矩圓形，有鋸齒，葉緣背面具油腺點，有異味，可抑制線蟲；頭狀花序單生，花黃色或橘黃色，有改良種乳白色，舌狀花有長爪，邊緣皺曲；瘦果黑色有光澤。

園藝小撇步

繁殖以播種為主，喜半陰環境耐乾旱，在多濕、酷暑下生長不良，也可扦插 2 週生根，播種後 1 個月即可開花。適當修剪、摘心可促進分枝多開花，並控制植株高度，以免倒伏。



孔雀草 *Tagetes patula* L.

別　名：紅黃草、小萬壽菊
科　名：菊科
原產地：墨西哥、瓜地馬拉



一年生草本，莖叢生狀，莖、葉、根的分泌物可抑制土壤線蟲；葉對生或互生，羽狀深裂，裂片披針形成長矩圓形，有鋸齒，葉緣背面具油腺點，有異味；頭狀花序，舌狀花黃色，基部或邊緣紅褐色，亦有全黃或全紅褐色，而邊緣為黃色者，有單瓣、半重瓣及重瓣等變化；瘦果，線形，扁平，一端有冠毛。

園藝小撇步

繁殖用種子播種為主，播種後一個月即可開花。開出的第一朵花苞可以把它摘除，刺激其多生花蕾，多開花。



粉萼鼠尾草 *Salvia farinacea* Benth.

別　名：鼠尾草、藍花鼠尾草
科　名：唇形花科
原產地：墨西哥、北美德州

多年生草本，全株被細毛，株高 60 至 90 公分，多分枝，能耐寒，與食用性的鼠尾草不同；葉對生，卵圓形至披針形，有時似輪生，有粗鋸齒；輪傘花序，多花密集，花萼矩圓狀鐘形，花朵淺藍、深藍或灰白色；小堅果橢圓形。



園藝小撇步

繁殖以播種、扦插為主，扦插繁殖在春、秋季均可進行。花期過後，若予以強剪，可望再萌發新枝，重新生長。

銀葉菊 *Senecio cineraria* DC.

別　名：白妙菊
科　名：菊科
原產地：地中海沿岸



多年生草本，耐寒性，株高 40 至 80 公分，基部分枝叢生；葉互生，羽狀分裂，裂片長橢圓形，莖和葉密布銀白色絨毛，非常適合與其他純色花卉搭配栽種；頭狀花，聚繖花序著生，花黃色，舌狀，花瓣 10 至 12 枚卵狀；瘦果具細長的冠毛。



園藝小撇步

繁殖以播種、扦插為主。播種於露地苗床，約半個月左右出芽，待長有 4 片真葉時移植 5 寸盆或移植苗圃，翌年開春後再定植上盆。

金魚草 *Antirrhinum majus* L.

別　名：龍口花、龍頭花、兔仔花
科　名：玄參科
原產地：西南歐



多年生直立草本，通常作一年生草花，株高 30 至 90 公分，另有矮性種，株高 20 公分左右，匍匐種可作吊缽觀賞；莖下部葉對生，上部葉常互生，披針形或矩圓狀披針形，全緣光滑，長 7 公分；總狀花序頂生，長可達 25 公分，花冠大唇形，花似金魚狀成串生長，相當美觀；蒴果卵形，種子極小。

三色堇 *Viola × wittrockiana* Gams



別　名：貓兒臉、人面花、鬼臉盆、蝴蝶花
科　名：堇菜科
原產地：園藝雜交種

一、二年生草本花卉，分枝多，匍匐狀生長；莖生葉近心臟形，莖生葉較狹長，邊緣淺波狀，托葉大而宿存；花頂生或腋生，花大型，有純色、雜色，波狀緣花瓣、重瓣等色系；蒴果卵形。

園藝小撇步

繁殖以播種為主，亦可取植株基部抽生的枝條進行扦插繁殖。喜日照及較冷涼的氣候，適合種在戶外。

石竹 *Dianthus chinensis L.*



別　名：中國石竹、洛陽花、石菊
科　名：石竹科
原產地：中國

一、二年生草本花卉，亦可多年生，株高可達 30 公分，莖直立，少分枝；葉對生，線狀披針形，先端漸尖，基部抱莖；圓錐狀聚繖花序，花小而多，有密集短梗，花色有紅、白、紫、深紅等；蒴果矩圓形。

園藝小撇步

繁殖以播種為主，忌潮濕、淹水。



黃金金露花 *Duranta erecta* L. ‘Goldon Leaves’

別　名：黃金金露華
科　名：馬鞭草科
來　源：園藝栽培種

常綠灌木，葉對生，卵狀橢圓形或倒卵形，先端短尖或渾圓，邊緣在中部以上有鋸齒，葉為黃金色；總狀花序腋生，排成一個頂生圓錐花序，通常著生在中軸一側，花淡紫色，亦有白色；核果黃色、卵形。此外，還有開白花的金露花，又稱台灣連翹，其果實如成串金黃露珠，是得名由來。若誤食果實會有腹痛、痙攣等症狀。



金露花（台灣連翹）的花則是白的。

園藝小撇步

黃金金露花生性強健、耐修剪；喜陽光，日照、水分充足，葉片才會呈現漂亮的黃綠色。

與蕾絲金露花相異處

1988 年由新加坡引種，主要栽培為綠籬和盆花，金黃葉色相當耀眼奪目又耐修剪，適合作為綠籬，繁殖主要扦插或高壓。與蕾絲金露花主要差別點為花色，黃金金露花淡紫色，而蕾絲金露花，花較大，花色為深藍色，花瓣有白色滾邊。



蕾絲金露花



朱蕉 *Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev.

別　名：紅竹
科　名：龍舌蘭科
原產地：中國大陸、印度、馬來西亞、澳洲、夏威夷、波里尼西亞

常綠灌木，莖直立細長叢生；葉革質劍狀，聚生枝端具有深溝的葉柄，原種葉面綠色帶棕紅，幼葉在開花時變深紅；圓錐花序，小花白色或帶黃或帶紅；漿果紅色、球形。



園藝小撇步

朱蕉喜歡溫暖濕潤的氣候，生長需要充足光線，在短日照下，葉色鮮艷；夏季光照太強，葉片易老化、色暗，應注意遮蔭。



錦葉紅龍草 *Alternanthera dentata* (Moench) scheygr. ‘ cv. Rubiginosa Stripe’

科　名：莧科
來　源：園藝栽培種

多年生草本，植株高可達約 45 公分；葉卵形到線狀披針形，長 10 公分，寬 5 公分，暗紅到紫色，具斑紋；花白色，腋生，穗狀，長 12 公分，寬 1 至 2 公分，管狀、尖形、無柄；未見結實。葉片斑紋變化多樣，非常適合與其他草花或觀葉植物做搭配，在花壇中營造大面積的彩色效果。

與紅龍草的不同

紅龍草與錦葉紅龍草同屬莧科，花也是白色小球狀，但是莖葉色澤皆較暗紅，葉片較窄，植株也稍高一些，葉片易有皺摺。



紅龍草



長紅木 *Decaspermum fruticosum* J. R. & G. Forst





別　名：紅楠木
科　名：桃金孃科
原產地：中國、菲律賓、澳洲、印度、馬來西亞、泰國、越南、緬甸

常綠灌木或小喬木，枝條紅色；葉互生，狹橢圓形，長 2.5 至 8 公分，寬 1.5 至 3 公分，革質，幼芽鮮紅；花穗腋生，可達 7.5 公分，花白或淡綠色；漿果球形，徑 0.6 公分，種子 3 或 4 枚。植株耐修剪，宜作綠籬、塑形等庭園佈置。

福建茶 *Carmona retusa* (Vahl) Masamune





別　名：小葉厚殼樹、福滿木
科　名：紫草科
原產地：台灣、中國、印度、東南亞、琉球

常綠小灌木，一般皆當作觀賞盆栽培養，枝葉茂密是良好綠籬樹種；葉近輪生，倒卵形，長 3 公分以內，鈍頭，全緣或先端有鈍齒，葉近無柄；聚繖花序腋生，2 至 3 花，萼裂片線狀，花冠白色；核果球形，徑 0.4 公分，黃紅熟，種子 1 枚。



春不老 *Ardisia solanacea* Roxb.

別　名：酸苔菜、蘭嶼紫金牛
科　名：紫金牛科
原產地：印度、中國大陸、東南亞、台灣蘭嶼及綠島





常綠灌木，株高可達 6 公尺以上，小枝粗，無毛；葉互生，肉質，橢圓狀披針形或倒披針形，長 6 至 12 公分，寬 4 至 7 公分，先端尖鈍或近圓，基部楔形，葉柄長 1 至 2 公分；繖形花序，近頂生或腋生，總梗長 5 至 10 公分，花梗長 1 至 3 公分，均無毛，花瓣粉紅色，寬卵形長約 0.9 公分，密被腺點；漿果狀核果扁球形，徑 1.2 公分，紫紅色或帶黑色，是誘鳥植物。目前園藝品種上有引進斑葉種，更具觀賞性。



變葉木　*Codiaeum variegatum* (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Muell.-Arg.



別　名：撒金榕、變色葉、彩葉木
科　名：大戟科
原產地：斯里蘭卡、馬來西亞、印度

常綠灌木，株高 1 至 2 公尺，品系繁多，葉形從闊葉系、飛葉系、螺旋系、戟葉系、母子葉系、捲葉系、長葉系、角葉系、細葉系等等，各種形態和斑紋幾乎都可見到，主要利用扦插、播種。單葉互生，有梗，厚革質，由線形至橢圓形，全緣或分裂，波狀或螺旋狀扭曲，常見白色、黃色、紅色和紫色斑點或斑紋，全株具乳狀液體；總狀花序單生或 2 個合生在上部腋間；蒴果球形或稍扁，長約 0.7 公分，直徑約 0.9 公分，白色。若誤食汁液，會有腹痛、腹瀉等症狀。



園藝小撇步

原生熱帶地區的變葉木，生長力強；喜愛陽光，日照愈強，色彩層次愈明顯，顏色也更鮮豔明亮。忌寒冷，通常氣溫低於 12℃或水分不足就會落葉。

紅葉鐵莧　*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.

別　名：威氏鐵莧、紅桑
科　名：大戟科
原產地：太平洋諸島

常綠灌木，直立多枝，因葉色多彩美觀，一般多作綠籬；葉互生，青銅綠色有紅紫斑紋，心形、橢圓形或卵形，長 10 至 20 公分，先端短漸尖，基部圓形或銳形；花雌雄同株，花序長 20 公分，徑約 0.6 公分，雌花單生於基部；蒴果 3 個，2 瓣裂。





彩葉山漆莖　*Breynia disticha* J. R. & Forst. ‘Roseo-picta’

別　名：五彩龍、甜豆木
科　名：大戟科
來　源：園藝栽培種

常綠小灌木，株高 1.2 公尺；葉互生，卵形，鈍頭，長 3 至 5 公分，幼葉具紅斑，是觀葉灌木；花小單生，下垂，帶綠色，雌雄同株，無花瓣；核果具長梗，扁球形，徑約 1 公分肉質。







錫蘭葉下珠 *Phyllanthus myrtifolius* Moon





科　名：大戟科
原產地：印度、斯里蘭卡

常綠灌木，多枝；單葉互生，倒披狀線形，先端鈍或尖，基部楔狀並具垂耳，長約 1.5 公分，寬 0.35 公分；花單生或數朵叢生於葉腋下；蒴果扁圓形，徑約 0.35 公分，生於葉下，需要翻開葉子才能看到，故名葉下珠。由於枝條具下垂性，且耐修剪、萌蘗性佳，適合栽植於花台與水岸造景。

大果黃褥花 *Malpighia* × *hybrida* hort.

別　名：西印度櫻桃
科　名：黃褥花科
原產地：熱帶美洲



常綠光滑灌木；葉互生，卵形至橢圓狀披針形，長 2.5 至 7.5 公分，多尖銳，全緣，無柄；聚繖花序腋生，玫瑰色，花瓣不整齊或有長毛；核果，具三核，深紅色，扁圓形，長約 2 公分，鮮紅的果實酷似櫻桃，極具觀賞價值，即一般所稱的西印度櫻桃。植株萌芽性良好，生長強健，耐修剪成形，可供作市容景觀造型樹雕之用。

蘭嶼羅漢松 *Podocarpus costalis* Presl

別　名：鈍頭羅漢松
科　名：羅漢松科
原產地：蘭嶼、菲律賓



常綠灌木或小喬木，原生於蘭嶼，被列入保育之珍稀樹種；葉線形或線狀倒披針形，長 5 至 7 公分，寬 0.7 至 1.2 公分，先端圓鈍，基部銳形，邊緣反捲；單性花，雌雄異株，雄花圓柱形，無柄，單生，長約 3 公分，雌花毬單生；果實長 0.9 至 1 公分，著生於果托，暗藍色，青綠色種子與暗藍色果托，看起來像是光頭僧人披著袈裟，是羅漢松得名由來。



黃金榕 *Ficus microcarpa* L. f. 'Golden Leaves'



別　名：黃斑榕
科　名：桑科
原產地：太平洋諸島

常綠喬木，生性強健耐修剪；葉片倒卵形，先呈金黃色，後呈綠色；隱頭花序，雌雄花皆集中於果內；果球形，直徑 0.5 至 1 公分，紅熟。



鵝掌藤 *Schefflera arboricola* Hayata



別　名：狗腳蹄
科　名：五加科
原產地：台灣、中國大陸

常綠灌木，台灣原生種具攀附性，其耐陰、耐旱，是優良室內觀葉植物；葉互生，長橢圓形或長圓形，小葉 7 至 9 枚，長 8 至 15 公分，平滑革質，全緣，總柄長 10 至 15 公分；由多數繖形花序組成一頂生圓錐花序；漿果球形。除了綠葉之外，還有斑葉、捲葉等品系。

聖誕紅 *Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch

別　名：一品紅、猩猩木
科　名：大戟科
原產地：美洲西墨西哥



落葉灌木，葉卵狀橢圓形至披針形、提琴形，緣有波狀或淺裂，鮮紅色的葉狀苞片是葉片構造的一部分，並非聖誕紅的花，其小黃花並不明顯。苞片有玫瑰聖誕、重瓣，顏色有桃紅、米白、深紅、粉色等色系；花序為杯狀聚繖花序，為大戟科植物特有的花序，故又稱為大戟花序、杯狀花序。全株有乳汁，誤觸會引發皮膚紅腫，誤食會有嘔吐、腹瀉症狀。

園藝小撇步

聖誕紅觀賞期長，豔麗的苞片是觀賞焦點。繁殖主要採扦插，只要縮短陽光照射的時間，花芽就會開始分化，苞片也會轉成鮮豔的顏色。

粉葉金花 *Mussaenda 'Dou Luz'* hort. *(M. pbilippica* 'Alicia' × *M. erythrophbla)*

別　名：桃萼花
科　名：茜草科
來　源：園藝雜交種



常綠灌木，葉橢圓形至闊卵形。聚撒花序預生，小花金黃色，葉狀苞片粉紅色，故被稱為粉葉金花；橢圓形漿果，台灣較少見其結果。另有台灣原生種白色苞片的玉葉金花及緋紅色苞片的紅葉金花。



射干 *Belamcanda chinensis* (L). DC.





別　名：扁竹、螞蜍花
科　名：鳶尾科
原產地：中國大陸、韓國、日本、印度

多年生草本，地下根莖及匍匐枝外皮鮮黃色，生多數鬚根；葉互生，廣劍形，扁平，稍被白粉；花序頂生，2 歧狀繖房花序，花橙色至橘黃色有暗紅色斑點，花被 6 片，基部合生成短筒，花謝後花被片呈旋轉狀；蒴果橢圓形，內含多粒種子，圓形黑色，可以作為乾燥花材之使用。

園藝小撇步

繁殖用播種或分株，生性強健、耐寒霜，喜乾燥和陽光，宜在濕潤、疏鬆、肥沃、排水良好的土壤中生長。

細葉雪茄花 *Cuphea hyssopifolia* H. B. K.

別　名：神香草葉萼距花
科　名：千屈菜科
原產地：墨西哥、瓜地馬拉



低矮小灌木、多分枝；葉互生，線狀披針形；花單生於葉腋，花期春至秋，花冠筒紫色、淡紫色、白色等花色，隨枝梢的生長而不斷開花；蒴果膜質，種子細小多數。

黃蝴蝶 *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw.

別　名：蛺蝶花、香蝴蝶、金鳳花、洋金鳳、黃金鳳
科　名：蘇木科
原產地：熱帶美洲



常綠灌木或小喬木，高可達 3 公尺，枝具少數棘刺；葉互生，二回羽狀複葉，羽片 6 至 9 對，小葉 10 至 12 對，長橢圓形，長 1 至 3 公分，略偏斜先端圓；總狀花序，頂生或腋生，花瓣圓形見柄紅黃色，有明晰之柄，邊緣呈波狀皺摺有明顯爪；莢果長條形而直扁平，長約 9.5 公分，平滑無毛，種子 6 至 8 粒，亦有黃、橙紅色之花色。



園藝小撇步

繁殖以播種、扦插為主，喜溫暖、濕潤、陽光充足的環境、耐熱、不耐寒，耐微陰宜植於排水良好，微酸性土壤。


紅寶巾

九重葛屬 *Bougainvillea spp.*


美人寶巾


寶巾花


雙色寶巾

別　名：寶巾花、三角梅、筋杜鵑
科　名：紫茉莉科
來　源：園藝雜交種

常綠攀緣灌木，幼莖具彎曲密生絨毛；葉互生，全緣卵形；花頂生聚繖花序，花由新梢頂端常有 3 朵簇生於 3 枚苞片內，花梗與苞片中脈合生，苞片橢圓形，有鮮紅、紫紅、桃紅、白、黃、橙黃、混色等色系；瘦果延長 5 裂梨形。九重葛是原生種，目前常見多色、多花的品系，是雜交後的品種，稱為「寶巾花」。

園藝小撇步

繁殖主要用高壓和扦插，九重葛（寶巾花）是喜陽光的植物，在南部全年都可開花，尤以秋冬為盛。在生長旺盛的夏天，會從主莖上長出較粗的直立枝條，應予剪除，一般促進開花的方式，就是製造一個乾濕交替的環境搭配施肥，就能開花繁盛。



朱槿 *Hibiscus rosa-sinensis* L.

別　名：扶桑、赤槿、佛槿、桑槿、大紅花、朱槿牡丹
科　名：錦葵科
原產地：中國大陸、熱帶亞洲

常綠灌木、株高可達 5 公尺，植株具細柔毛或光滑，小枝紫紅色直立而多分枝，目前全球有 3000 個以上栽培品種；葉互生，長 7 至 15 公分，寬 9 公分，卵圓形或狹卵形至廣披針形，邊緣有粗鋸齒，具 3 主脈，先端突尖或漸尖，形似桑葉；花期全年，夏秋最盛，花梗長 2 至 6 公分，花色有白色、鮮紅、玫瑰紅、橙黃、黃等，黃花紅心者直徑約 10 至 17 公分，有單瓣、大花重瓣品系，花大有下垂或直上之柄，單生於上部葉腋間，雄蕊及柱頭伸出於花冠之外；蒴果長 3 公分，倒卵圓形，光滑有喙。



園藝小撇步

原生熱帶地區的朱槿，在台灣全年開花，修剪枝條可幫助朱槿抽新梢開花，夏季生長旺盛，可修剪過密的枝葉，保持植株通風；栽植盆內時常會發生細根纏繞導致植株老化，須修剪根部或換盆。

宮粉仙丹 *Ixora sianensis* Wall.



科　名：茜草科
原產地：泰國、爪哇

常綠灌木，株高可達 3 公尺；葉對生，長 5 至 10.5 公分，寬 0.5 至 5 公分，長橢圓狀橢圓形，頂端銳尖或鈍頭，基部圓形或凹頭，15 至 22 脈，有柄長 1 至 1.5 公分；繖房花序密集多花，粉紅色，有梗長 0.3 公分，裂片三角狀銳尖，花管長 1.6-2.5 公分，裂片 0.8 公分；漿果球形。

園藝小撇步

仙丹類只要有新的枝條生長，就能長出新的花序，在花序開完後重新修剪，可促使萌生新枝條繼續開花。

矮仙丹 *Ixora Sunkist* hort.



別　名：小葉仙丹
科　名：茜草科
來　源：園藝雜交種

常綠矮小灌木，葉片是所有仙丹中最小的，除了園藝、綠籬之外，葉子也是插花的常見材料；葉對生，較小，長 5 公分以下；花冠裂片長橢圓形，先端銳形，有黃、粉紅、橙紅、白色等花色；漿果近球形，紅紫轉黑色。

大王仙丹 *Ixora casei* Hance

科　名：茜草科
原產地：熱帶太平洋諸島、加羅林群島



常綠灌木，株高可達 3 公尺；葉對生，長 27 至 30 公分，寬 5 至 10 公分，橢圓狀至長橢圓形，頂端銳尖，基部楔形，16 至 18 脈，有柄長 1.2 至 2 公分；聚繖花序頂生，花紅色，花多密集，花梗 3 公分具細毛，花瓣闊卵形圓頭略尖，花管 3 至 3.5 公分，花序在所有仙丹花中最大、最具觀賞性；依靠自然界中如蒼蠅等幼小昆蟲協助授粉，幫助結果，其漿果近球形紫紅色。

洋紅仙丹 *Ixora longifolia* Smith

科　名：茜草科
原產地：太平洋摩奴加群島



常綠灌木，高可達 1.5 至 3 公尺；葉十字對生，長 22 至 30 公分，寬 5.5 至 8.5 公分，披針形或長橢圓狀披針形，頂端銳尖或漸尖，具 15 至 22 脈，有柄長 1 至 1.5 公分；繖房花序頂生，紅色，小花密集，短梗，橢圓形至銳形十字排列，花管長 4 公分；漿果球形。

立鶴花 *Thunbergia erecta* T. Anders.



科　名：爵床科
原產地：熱帶非洲

直立平滑灌木，先後於日治時代、民國 56 年引進台灣；葉對生，卵形，先端銳尖，全緣或不明顯疏鋸齒緣，長 3 至 5 公分；花腋生，花萼短，10 至 12 齒裂，花冠緣藍紫色，另有深紫色、白色花色冠筒彎曲淡黃色白色；蒴果頂端伸長成尖凸狀。適當的管理，幾乎年可賞花，單植或叢植於庭園、花圃；列植修剪成籬垣，是很好的觀賞花木。

翠蘆莉 *Ruellia brittoniana* E. Leonard





別　名：蘭花草
科　名：爵床科
原產地：墨西哥

多年生草本花卉，基部木質化；葉對生，線狀橢圓形或線狀披針形，10 至 12 公分長，0.8 至 1.5 公分寬，平滑葉柄 1 至 2.4 公分長；聚繖圓錐花序腋生，花期約 4 至 10 月，有桃紅、白、深紫等花色；蒴果橢圓形 2 至 2.5 公分長。依植株高度可分高性種與矮性種，高者可達 1 至 1.5 公尺，節間較長，適合英式庭園造景使用；矮性品種節間密集，花朵較為叢生狀且集中開放，可搭配小陶盆做成小型桌上型盆景。



紫薇 *Lagerstroemia indica* L.

別　名：小花紫薇、百日紅、滿堂紅、癢癢花
科　名：千屈菜科
原產地：中國大陸



落葉大灌木，樹皮褐色，光滑，具脫落性；葉互生，無柄，平滑無毛或背面沿中肋有毛，葉形橢圓、倒卵形或長橢圓形，長 2.5 至 6.8 公分；夏季開花，花期長，花朵繁茂，有白、紫、黃、紅、桃紅、粉紅等不同深淺的變化；蒴果長橢圓形，長 0.9 至 1.5 公分。另有別名猴不爬的九芎，是紫薇的相似種，可以供作紫薇嫁接用。

園藝小撇步

繁殖用播種、扦插為主，喜溫暖、濕潤、陽光，稍耐陰，有一定的抗寒力和耐旱力，喜生於排水良好之石灰性土壤和砂壤。



斑葉月桃 *Alpinia zerumlet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith 'Variegata'

別　名：花葉豔山薑
科　名：蘘荷科
來　源：園藝栽培種



斑葉月桃為月桃的園藝栽培種，多年生草本，叢生、株形比月桃矮小，高 2 至 3 公尺， 根莖橫生；葉革質矩圓狀，披針形，長 60 公分、寬 12 公分，有短柄，邊緣有短柔毛，葉片有黃色條紋，主要以觀葉為主；花期 6 至 7 月，開花具有特殊的芳香味，圓錐花序似總狀花序，下垂，苞片白色，頂端及基部粉紅色，花萼近鐘形，花冠白色；果實紅色。因月桃葉子具芳香，可作蒸製年糕及粿的鋪墊或包粽子的材料。



大花美人蕉 *Canna × generalis* L. H. Bailey





別　名：美人蕉
科　名：美人蕉科
來　源：園藝雜交種

多年生球根花卉，高可達 1 公尺，根莖橫臥而肥大，地上莖肉質，不分枝；葉互生，寬大長橢圓狀披針形；總狀花序，自莖頂抽出，花色有乳白、淡黃、橘紅、粉紅、大紅、紅紫、酒金等，花期長，在南部能四季開花；蒴果，多橢圓形，種子多數，球形至橢圓形，黑色至褐色。因多種子的特性，民間婚俗女方多攜其植株，有期許子孫滿堂之意。

黃鸝鳥蕉 *Heliconia 'Golden Torch'* hort. (*Heliconia psittacorum* × *H.spathocircinata*)



別　名：黃鸝蕉、黃鸝鳥
科　名：赫蕉科
來　源：園藝雜交種

多年生草本類；葉革質，基生成二列，似芭蕉狀；全年開花，花黃金或黃色，所以被叫做黃鸝鳥蕉，苞片頂端綠色，頂生穗狀花序，花色鮮豔美觀；未見結果。

文殊蘭 *Crinum asiaticum* L. var. *sinicum* Baker.

別　名：文珠蘭、允水蕉
科　名：石蒜科
原產地：台灣、中國大陸、海南島





鱗莖草本植物，株形高大（約 1 至 1.5 公尺）是辨識重點。葉 15 公分寬；葉片寬大肥厚；頂生傘形花序，花梗高 1 公尺，著花 25 至 28 朵，每花序有 2 個苞片，開花時苞片下垂，花瓣線形白色有芳香；蒴果圓形或不整齊，3 室種子大粒，綠色 3 粒。全株含生物鹼，誤食會導致腹痛、腹瀉。

與蜘蛛百合相異處

文殊蘭有明顯大而長之鱗莖，葉片寬大，葉著生蓮座狀，蜘蛛百合（螯蟹花）葉片窄小莖小，葉對生，花瓣相連如螃蟹之身軀。



蜘蛛百合 *Hymenocallis caribaea* (L. emend. Ker) Herb.

別　名：螯蟹花、蜘蛛蘭、水鬼蕉
科　名：石蒜科
原產地：西印度群島



多年生草本，鱗莖扁球形，外皮褐色，膜質；葉闊帶形，濃綠色，先端細尖；繖形花序頂生，花冠純白色，副冠花被裂片線形，基部呈筒狀，花形如四方散開的螃蟹，富芳香開於黃昏。誤食鱗莖會引起嘔吐、腹瀉、腹痛及頭痛等症狀。

園藝小撇步

主要利用分株繁殖，生性健壯適應性強，喜溫暖氣候及粘質土壤，需在高於 15℃溫度下越冬，夏季需置於半陰處，花期甚長，花黃昏開放，乾燥後花香可保存達數月之久。



時鐘花 *Turnera ulmifolia* L.





別　名：金寶花、午時花
科　名：時鐘花科
原產地：熱帶美洲

多年生草本亞灌木，株高可達 70 公分；葉互生，長 10 公分，披針形或長圓形，先端尖或銳尖，鈍鋸齒或鋸齒緣，葉柄常有 2 腺點；花開於枝端葉腋，黃色，直徑 5 公分，因開於早晨並於中午時間閉合，故名時鐘花；蒴果 3 室，種子細小多數。

黃鐘花 *Tecoma stans* H. B. K.





別　名：金鐘花
科　名：紫薇科
原產地：熱帶美洲

小喬木，高可達 5 公尺，具多數分枝；枝條圓柱形，光滑無毛或僅幼嫩部份有毛茸。葉對生，奇數羽狀複葉，小葉 7 至 11 枚，卵狀長橢圓形或卵形至披針形；花頂生總狀或圓錐花序，花冠漏斗狀筒形；果實為蒴果，長圓柱形，成熟時褐色。與時鐘花的相異處為，時鐘花花冠是離瓣花覆瓦狀，黃鐘花花冠是合瓣花。



馬纓丹 *Lantana camara* L.

別　名：五色梅、臭草
科　名：馬鞭草科
原產地：西印度群島





直立或半藤本狀灌木，株高可達 1.2 公尺，莖枝無刺，全株被短毛，有一種強烈氣味，小枝方形；葉對生，橢圓形或短圓卵形，先端漸尖，邊緣有鋸齒，背面有硬毛；於葉腋抽出長花梗，頭狀繖房花序，花序如盤，花小密生，花初開時顏色較淺，繼而漸深，全年開放；核果肉質或漿質；是蝴蝶、蜜蜂等昆蟲的重要蜜源植物。誤食枝葉或果實，會有嘔吐、腹瀉、昏迷等症狀。

與蔓馬纓丹相異處

馬纓丹是軟枝灌木，花序較大，顏色以紅黃色系，蔓馬纓丹葉較小，花色以紫白居多。

小故事

有強烈氣味的馬纓丹是製作香水的原料，早年曾有法國貿易商前來台灣，大量收購馬纓丹枝條。



月橘 *Murraya exotica* L.



別　名：七里香
科　名：芸香科
原產地：台灣、中國大陸、琉球、印度、馬來西亞、菲律賓

常綠灌木，分枝多，花朵極芳香，小枝圓柱形；奇數羽狀複葉，葉軸不具翅，小葉 3 至 9 枚，互生，卵形、倒卵形至近菱形，長 2.8 公分，寬 1 至 3 公分，全緣；聚繖花序腋生，同時有頂生，花大而多，花瓣 5 枚；漿果朱紅色，紡錘形或橢形。



與四季樹蘭相異處

月橘樹形優美，四季常青，夏秋開花香氣濃烈，可作盆栽及綠籬，花可提取芳香油，果實朱紅色美豔動人。繁殖主要播種或高壓，和樹蘭相異處為月橘小葉互生具油狀腺點，卵至倒卵形，花為白色，樹蘭小葉上無油腺點，小葉對生，葉形較圓，花為黃色。

四季樹蘭 *Aglaia duperreana* Pierre

別　名：四季米仔蘭
科　名：楝科
原產地：越南、泰國



常綠小喬木，多分枝，花朵芬芳；奇數羽狀複葉，葉 3 至 5 枚，葉面亮綠；圓錐花序腋生，黃色小花緊密，四季皆能開花，尤以夏秋為盛；4 月果熟，四季樹蘭較一般樹蘭容易結果。

園藝小撇步

繁殖以高壓為主，喜陽光充足環境，稍耐陰，土壤以疏鬆微酸性為宜。芬芳的花朵不僅可提取香料，還可適度壓制臭味。



花

玉蘭 *Michelia* × *alba* DC.

別　名：白蘭、白玉蘭、木筆
科　名：木蘭科
來　源：天然雜交種

常綠喬木，高可達 12 至 15 公尺以上，花朵香氣濃烈；葉互生，橢圓形，長達 20 公分，葉柄基部膨大，有托葉遺痕。花蕾被有青色苞片，多毛，花被 8 片，披針形，白色，長 2 至 3 公分，可作香料。另有金玉蘭，花濃香、易結果，是蝴蝶之食草。





圖片提供：莊溪

茉莉 *Jasminum sanbac* (L.) Ait



別　名：枺厲、末利
科　名：木樨科
原產地：印度、中國西部

蔓藤類常綠灌木，芬芳花朵可薰茶，作成茉莉香片；葉對生或輪生，革質，闊卵圓形，長 8 公分，葉片光滑；花期 6 至 10 月，花冠白色，花謝時變粉紅；開花後通常不結果實。



園藝小撇步

栽培容易，可利用扦插繁殖、壓條或分株，扦插於 4 至 10 月進行較佳，雨季時空氣濕度高，較易發根存活。

夜香木 *Cestrum nocturnum* L.



別　名：夜香樹、木本夜來香、洋素馨
科　名：茄科
原產地：熱帶美洲

綠軟枝灌木，分枝下垂，夜間極香；葉互生，卵形，葉薄紙質；花期 7 至 10 月，總狀花序近繖房狀，腋生或頂生，花端短尖，邊緣波浪形，黃綠色；果為白色，不常結實。植株生長強健，適應性強。誤食莖葉或花，會出現心跳加快、肌肉痙攣等症狀。



園藝小撇步

繁殖以分株較容易，忌寒冷，性喜溫暖、向陽和通風良好的生長環境，要求疏鬆、肥沃土壤。傍晚開花香氣濃郁，具驅蚊效果，同時也可吸引夜出的飛蛾前來授粉。

黃梔 *Gardenia angusta* (L.) Merr.

別　名：梔子、花黃枝、山梔、山黃枝
科　名：茜草科
原產地：台灣、中國大陸、日本、琉球、中南半島



常綠灌木或小喬木，花朵芬芳；葉對生，卵形、橢圓形或長橢圓狀披針形，長 5 至 10 公分，先端銳至短漸尖；花白色，花冠裂片長約 2.5 公分，花瓣有單瓣及重瓣之分；漿果，卵狀至橢圓狀，長 2 至 4 公分，有 5 至 9 條翅狀直棱，果實是天然染料，可染成黃色。果實稍有毒性，勿食。





含笑 *Michelia figo* (Lour.) Spreng.

別　名：香蕉花、含笑花
科　名：木蘭科
原產地：華南、喜馬拉雅、西藏



常綠小喬木，分枝緊密，香氣濃郁；葉橢圓形或倒卵狀橢圓形，革質，全緣；花期 4 至 6 月，乳白色花單生於葉腋間，花瓣 6 枚，肉質，花瓣基部帶紫暈色，有如香蕉香味，開花時花瓣不全部綻放，有如含笑般而得名；9 月果熟，蓇葖果卵圓形，先端鳥嘴狀。



園藝小撇步

喜陰涼環境，不耐烈日曝曬，要求排水良好，肥沃的微酸性壤土。花含芳香油，可供薰茶；花過中午溫度昇高芳香四溢，早期婦人喜摘其花於髮髻上，以為裝飾或聞其似香蕉的芳香味。

桂花 *Osmanthus fragrans* (thunb ex A. Murr.) Lour.



別　名：木樨、銀桂、巖桂
科　名：木樨科
原產地：中國大陸

常綠灌木或小喬木，花朵香氣優雅;葉對生，革質，橢圓狀披針形，長 5 至 10 公分，全緣或有細鋸齒，背有細脈，先端尖或漸尖；花單頂叢生或簇生，白色，花萼具 4 長齒，花冠分裂幾達於基部，裂片長橢圓形；核果長約 1 公分，幼果綠色，成熟時轉為紫黑色。

重瓣馬茶花 *Tabernaemontana divaricata* (L.) R. Br. 'Flore pleno'





別　名：狗牙花、白狗牙、獅子花、豆腐花
科　名：夾竹桃科
來　源：園藝栽培種

常綠灌木，花朵形似黃梔花、具清香，除花萼披毛，其餘無毛；葉對生，堅紙質，橢圓形或橢圓狀矩圓形，長 5.5 至 11.5 公分，寬 1.5 至 3.5 公分，上面深綠色，下面淡綠色；聚繖花序腋生，通常又對生，花萼 5 裂，內面基部有腺體，花冠白色，毛瓣邊緣有皺摺，長和寬約 2 公分；蓇葖果極叉開或外彎，長2.5至7公分，內有種子3至6顆，種子矩圓形無種毛。全株有毒，誤食枝葉或花朵，引起嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。



緬梔 *Plumeria rubra* L. var. *acutifolia* (Poir.) Woodson

別　名：雞蛋花、蛋黃花、鹿角樹
科　名：夾竹桃科
原產地：墨西哥、巴拿馬

落葉小喬木，高可達 5 公尺，小枝肥厚多肉，花朵極芳香；葉互生，葉大厚紙質，多聚生於枝頂，卵狀長橢圓形，長 18 至 33 公分，羽脈 30 對以上；花數朵聚生於枝頂，花色多樣，花朵除單瓣外，目前還有重瓣品種，花冠筒狀，徑約 5 至 6 公分，5 裂；蓇葖果線形、長橢圓形或橢圓形，種子有翅。誤食汁液會造成嘔吐、腹瀉、發燒、噁心等症狀。







園藝小撇步

繁殖以扦插、播種為主，因枝條肥厚多汁，必先陰乾後再扦插，才不致潰爛。



蔓馬纓丹 *Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq.

別　名：小葉馬纓丹、紫花馬纓丹
科　名：馬鞭草科
原產地：南美洲

無刺灌木，枝披散或蔓狀臥地被毛，長可達 90 公分，幸福川上游兩岸就能一賞芳蹤。葉對生，卵形，長約 2.5 公分，粗齒緣；頭狀花序具長梗，花色有紫紅、白、黃色；核果球形，徑約 0.5 公分，肉質光滑。誤食枝葉或果實，會有嘔吐、腹瀉、昏迷等症狀。





使君子 *Quisqualis indica* L.

別　名：山羊屎
科　名：使君子科
原產地：中國大陸、印度、緬甸、菲律賓



常綠攀緣灌木，小枝被短柔毛；葉對生或近對生，卵形至橢圓形，革質，背面有銹色柔毛；穗狀花序頂生，下垂，花大有香氣，初開時白色，後變紅色，常數朵聚生，花朵有單瓣及重瓣品種；果實球狀卵形成 5 角棱或翅，沿頂角開裂，白色種子 1 顆，近橄欖核狀，長 2.5 至 4 公分。誤食種仁會引發頭痛、眩暈、噁心、嘔吐等症狀。

小故事

相傳北宋年間 四川潘州有一位名為郭使君的醫師，善於利用此植物替孩童治病，後人為了感念他，而稱此植物使君子。繁殖可以用播種、扦插分株和分根。



蒜香藤 *Mansoa hymenaea* (DC.) A. Gentry



別　名：紫鈴藤
科　名：紫葳科
原產地：墨西哥、巴西、西印度群島

常綠攀緣灌木，最早叫做紫鈴藤，因其葉片有蒜味，而被叫作蒜香藤；葉對生，小葉 3 枚，頂小葉常生捲鬚狀，橢圓形先端鈍而微凹，長 6 至 10.5 公分，側脈每邊 6 至 7 脈，富大蒜味，總柄長 0.5 至 0.8 公分；花淡紫色，成串如風鈴，花期為春至秋季，但春、秋 2 季是盛花期，花冠筒狀，雄蕊內含穗狀圓錐花序；果實線狀，長 15 至 25 公分，1.7 至 2 公分寬，頂端銳尖光滑，種子 2 翅。

園藝小撇步

蒜香藤不擇土質，全日照的環境最佳。繁殖以扦插、高壓法。

黃蟬 *Allamanda cathartica* L.



別　名：軟枝黃蟬
科　名：夾竹桃科
原產地：熱帶美洲



常綠直立或半直立灌木，高約 1 公尺；葉對生，3 至 5 片輪生，橢圓形或矩圓形，長 7 至 12 公分，寬 2.5 至 3 公分，先端漸尖，背面中脈有柔毛；花鮮黃色中心有紅褐色條斑，花冠基部膨大呈漏斗狀，長 5 至 7 公分，徑約 4 公分，花朵有單瓣及重瓣品種；蒴果有刺，2 瓣裂，種子有翅。誤觸乳汁會引起皮膚過敏，誤食會引起噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。

園藝小撇步

喜高溫多濕、陽光充足、排水良好環境，在 20℃氣溫條件下，扦插於砂土中約 20 天即可長根。

珊瑚藤 *Antigonon leptopus* Hook. & Arn.

別　名：連理藤、紅珊瑚、愛之藤
科　名：蓼科
原產地：墨西哥



多年生落葉木質藤本，攀緣力強可達 10 公尺，塊根肥厚；葉互生，卵形至矩圓狀卵形，先端漸尖，基部心臟形；總狀花序生於頂端上部葉腋，花密生成串，多數為桃紅色，又有白色園藝變種；瘦果圓錐形。

園藝小撇步

向陽植物，喜濕潤肥沃的酸性土，春暖時發芽，待冬季氣溫 10℃以下時，葉色會轉墨綠並微枯。

星果藤 *Tristellateia australasiae* A. Rich.





別　名：庚中藤、蔓性金虎尾
科　名：黃褥花科
原產地：恆春半島、蘭嶼、馬來西亞、菲律賓、澳洲

常綠攀緣藤本，耐旱、抗風、喜陽光；葉互生，基具 2 腺，卵形，頭銳基圓，全緣，長 5 至 8 公分；總狀花序，花期 4 至 5 月，在溫暖地區可以全年開花，花兩性，花黃色，花瓣基部心形有柄；翅果心形，3 心皮各著生 3 枚以上之翅，側翅分為 4 至 10 狹片輻射狀。

園藝小撇步

繁殖可用扦插、高壓，因為攀爬的特性常用於棚架，同時枝條下垂，也適合作吊鉢懸掛觀花。

雲南黃馨 *Jasminum mesnyi* Hance



攝影／莊溪

別　名：雲南迎春
科　名：木樨科
原產地：中國雲南

常綠軟枝灌木，枝呈蔓狀平滑，略 4 棱小枝有毛；葉對生，小葉 3 枚，長 2.5 至 7.5 公分，長橢圓狀披針形，頂端 1 枚較大，基部漸狹成短柄，側生 2 枚小而無柄；花黃色，徑 4 至 5 公分，單生，花冠裂片倒卵狀匙形，常近於複瓣，淡黃色，具暗色斑點，花瓣較花筒長，有香氣；漿果橢圓狀卵形綠褐色。

園藝小撇步

繁殖用扦插、高壓和分株均可。喜溫暖向陽及空氣濕潤環境，在排水良好肥沃的酸性砂質壤土生長良好。



炮仗花 *Pyrostegia venusta* (Ker) Miers

別　名：黃金珊瑚、金獅花
科　名：紫葳科
原產地：巴西、玻利維亞、阿根廷、巴拉圭





常綠攀緣大藤本，可攀緣高達 7 至 8 公尺；葉對生，小葉 2 至 3 枚，卵狀長橢圓形，長 5 至 7.5 公分，先端漸尖，有線狀，3 裂的卷鬚；圓錐花序頂生，每年春節前後的 2 至 3 月間，是炮仗花的花期，花冠橙紅色，漏斗狀，長約 6 公分，口部膨大，裂片 5 反捲，邊緣有白毛，萼鐘形，有腺點，花纍纍成串，如串連的鞭炮而得名；蒴果長達 30 公分，開裂線形。

園藝小撇步

炮仗花生長迅速，喜陽光和肥沃濕潤的酸性土壤，在南部枝葉常青，繁殖可用高壓和扦插繁殖。適合作為綠廊、棚架之最佳材料，也可牽引作籬笆牆垣，甚或屋頂、牆壁及地面的遮覆物。

薜荔 *Ficus pumila* L.



別　名：木蓮、木壁蓮、風不動、文頭果
科　名：桑科
原產地：台灣、中國大陸

常綠攀緣藤本，嫩枝有毛；葉互生而排成二列，卵狀橢圓形，先端鈍，基部圓或心型，革質短柄，全緣，長2至10公分，側葉脈5對，背面葉脈顯著並密生氈毛；隱花果單生於葉腋，倒圓錐狀球形，徑約4公分，上半部有白毛斑點，熟時暗紫色；瘦果浸出膠質凝結後可食，隱花果陰乾亦可當甜餅食用。台灣山區另有愛玉果實，紡錘型的種子具果膠，可製成愛玉凍，是夏天消暑聖品。

園藝小撇步

喜溫暖濕潤氣候，喜陰、耐旱適生含腐植質的酸性土壤，播種、扦插、壓條均可繁殖。

錦屏藤 *Cissus sicyoides* L.





別名：綠簾藤
科名：葡萄科
原產地：熱帶非洲、美洲、墨西哥北部

常綠攀緣大藤本；葉互生，單葉革質，長4至15公分，寬3至10公分，卵形鈍頭先端尖銳形或銳尖形，葉緣鋸齒，深綠光澤，背面淡綠色有微毛；近球狀聚繖花序2至5公分光滑，黃或白，常與葉對生；漿果卵形或球形，0.5至0.8公分，黑熟呈藍黑色。

園藝小撇步

繁殖主要採用扦插、壓條。錦屏藤有下垂的氣根，掛滿棚架非常好看，是很好的觀賞植物。

荷花 *Nelumbo nucifera* Gaertn.

別　名：蓮花、芙蕖、火芝、芙蓉、水華、水芸、水且、水芙蓉
科　名：睡蓮科
原產地：中國、日本、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲



多年水生草本，為古生物孑遺活化石植物；葉大，直徑可達70公分，全緣，呈盾狀圓形，具14至21條輻射狀，葉脈葉面深綠色，粗糙滿布短小鈍刺，刺間有一層蠟質白粉，故能使雨水凝成滾動的水珠，葉背淡綠光潔無毛，脈隆起中央有圓柱狀，葉柄挺舉荷葉池水；花單生，兩性，萼片4至5枚，綠色，花有單瓣、複瓣、重台、千瓣，色有深紅、粉紅、白、淡綠及間色等變化，單朵花期只3至4天，多晨開午閉，千瓣能開10天以上，花徑最大可達30公分，蓮蓬上有3至30個蓮室；果托徑5至10公分，呈短倒圓錐形；果實圓形，長約1至1.2公分，卵球形，果皮堅硬，暗黑色，稱蓮子。

園藝小撇步

繁殖可用播種、分藕方式，蓮子無休眠期，隨來隨播也能萌發，只要種殼硬，甚至保存多年的種子仍可萌芽。播種時必須先用刀刻劃或銼開硬殼，置於流動的清水，充分供肥，才能正常開花。

與睡蓮相異處

荷花之葉梗由中間挺出無缺刻，呈盾狀圓形具蠟質白粉，蓮蓬挺出水面，內有橢圓形種子，內含多數橢圓形小堅果；睡蓮葉長圓形，基部深裂至葉柄著生處，葉片平貼水面，全緣聚合果球形，無蓮蓬，果實成熟後下沉水中，有利發芽長苗。部分睡蓮葉片心部具有芽點，可長出胎生苗，而荷花則完全無此特性。



睡蓮

台灣萍蓬草 *Nuphar shimadae* Hayata



別　名：水蓮花
科　名：睡蓮科
原產地：台灣

多年生水生草本，生長於池塘、濕地區域，根莖塊狀，台灣特有原生種類，是台灣埤塘生態系的指標物種；浮水葉，紙質或近革質，闊卵形或長圓形，葉面光亮無毛，背具粗毛，長 8 至 12 公分，7 至 9 公分寬，先端圓形，基部心形或箭頭心形，全緣，長柄；花期全年，夏至秋季為盛花期，花黃色，花瓣 5 枚，卵圓形或匙狀卵圓形，大約 2 公分長，1.3 公分寬，先端圓形或微凹頭，瓣多數；漿果闊卵球形種子多數。

園藝小撇步

喜光稍耐陰、耐寒，不加防寒措施能安全越冬，適應力強、少病蟲害，適於水深 0.6 公尺左右的池塘，對土壤選擇不嚴，一般種植蓮花的輕黏質土壤最適宜。

印度莕菜 *Nymphoides indica* (L.) O. Kuntze



別　名：金銀蓮花
科　名：睡菜科
原產地：台灣、中國大陸、日本、俄國、韓國

多年生水生草本，全株光滑無毛，莖圓柱形；葉飄浮於水面，革質，3 至 11 公分，卵狀心形至圓形，葉柄短；花序束生於葉腋，花梗長 3 至 5 公分，花萼 5 深裂，邊緣具纖毛，內部有腺體；蒴果橢圓形，種子光滑。

園藝小撇步

只要將植株置於水面漂浮即可，是容易栽培的水生植物。

欖李 *Lumnitzera racemosa* Willd.

科　名：使君子科
原產地：台灣、澳洲熱帶、太平洋諸島、琉球、非洲







常綠喬木；葉互生，螺旋狀排列，肉質，倒卵形，長 5 至 6 公分，寬約 3 公分，先端圓或凹形，基部楔形，全緣或具波狀小齒；花期 5 至 7 月之間，短穗狀花序，腋生，萼短鐘狀，裂片三角形，花瓣長橢圓形；核果長約 1.5 公分，長橢圓形。欖李是高雄最多的紅樹林樹種，在中都濕地就能一賞芳蹤。

與海茄苳相異處

欖李葉互生，海茄苳葉對生；欖李根是彎曲的屈膝根，海茄苳會長出一支支的呼吸根；欖李開白色小花，海茄苳則是橘色小花；欖李的橢圓形核果與海茄苳的蒴果亦不相同。

海茄苳 *Avicennia marina (Forsk.) Vierh.*

別　名：海茄藤、茄苳樹
科　名：馬鞭草科
原產地：台灣、南洋、澳洲、太平洋諸島



常綠小喬木，樹皮常具星狀或粗糠狀，嫩枝具短柔毛；葉對生，卵形，長 5 公分，兩端鈍形，葉片具鋸齒緣，內面蒼綠色，全緣，革質；短聚繖花序腋生，有苞，偶有胎生現象；漿果球形。氣生根具有固定植株，增加氧氣吸收的效果。高雄多處濕地如中都濕地、永安鹽田濕地、援中港濕地等皆看到海茄冬。

水筆仔 *Kandelia candel* (L.) Druce



別　名：茄藤樹
科　名：紅樹科
原產地：台灣、東亞、東南亞、日本、中國大陸

常綠小喬木，高可達 4 至 5 公尺。水筆仔樹皮富含單寧，可做染料；葉互生，長橢圓形，厚革質，長 8 至 15 公分；花腋生聚繖花序，萼 5 裂，裂片披針形，5 枚花瓣白色，雄蕊多；果實卵形，宿存萼反捲，胎生。援中港、中都濕地可見水筆仔。

紅海欖 *Rhizophora stylosa* Griff.







別　名：五梨跤
科　名：紅樹科
原產地：台灣、中國南部、東南亞、澳洲

台灣紅樹林以紅海欖(五梨跤)的數量最為稀少，主要分布在南部，常綠小喬木，樹皮灰褐而光滑。葉革質，對生，卵形或橢圓形，葉面光滑，全緣，基部及先端均為鈍形，先端具有芒間凸起。花期5至7月，聚繖花序腋生，花黃白色，無花梗；果實圓錐狀，具宿存萼片，胎生苗長約25至35公分。此種的主要特徵之一，為自樹幹及側枝之上端所長出的多數氣根，氣根於中途分歧，延伸入地下而成支持根。援中港、林園人工濕地可見紅海欖。

香蒲 *Typha orientalis* Presl

別　名：水蠟燭、東方香蒲
科　名：香蒲科
原產地：台灣、日本、菲律賓、中國大陸、蘇聯

多年生水生草本，是河岸邊淺灘挺水植物 ，高 1 至 2 公尺，地下根狀莖粗壯，有節；葉條形寬 0.5 至 1 公分，基部鞘狀抱莖；花期 4 至 9 月，穗狀花序圓柱狀，雄花序與雌花序彼此連接，雄花序在上，長 3 至 5 公分，雄花有雄蕊 2 至 4 枚，花粉粒單生，雌花序在下，長 6 至 15 公分，雌花無小苞片，有多數基生的白色長毛。



園藝小撇步

繁殖主要以分株方法，雌花稱「蒲絨」，可用作填充。



蘆葦 *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

別　名：水蘆竹、蒲蘆
科　名：禾本科
原產地：全球亞熱帶至溫帶地區

多年生具粗壯根狀莖稈高 1 至 3 公尺，植株茂密且具有隱密性，可供作濕地鳥類、生物的最佳棲息地環境；葉片寬 1 至 3.5 公分；圓錐花序，長 10 至 40 公分，微垂頭，分枝斜上或微伸展，小穗長 1.6 至 2.2 公分，通常含 4 至 7 小花，第一小花常為雌性；穎果及外稃均有 3 條脈，外稃無毛，眾性外稃的基盤具長 0.6 至 1.2 公分的柔毛。



白水木 *Tournefortia argentea* L. f.





別　名：水草
科　名：厚殼樹科
原產地：台灣、中國廣東、海南島、東半球熱帶海岸

常綠中喬木，樹皮灰褐色，枝粗有顯著葉痕，小枝，葉花序全被銀白色絹毛；葉輪生枝端，倒卵形肉質，無柄，全緣；聚繖花序花頂生或腋生；核果，小球形至卵圓形，種子 1 至 2 粒，熟時乾燥，中果皮有小泡，軟木質。其枝幹彎曲多變，是庭園景觀、海濱造景的重要素材。

園藝小撇步

繁殖主要以播種、扦插、空壓方法，是台灣近海普遍野生樹種，葉具銀白色絹毛，美觀可愛而受歡迎。

苦林盤 *Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.





別　名：苦藍盤
科　名：馬鞭草科
原產地：台灣、中國廣東、福建、印度、太平洋諸島

蔓莖狀軟枝灌木；葉十字對生或稀輪生，橢圓形，全緣，長 6 至 8 公分，寬 2 至 2.5 公分；花期在夏季，聚繖花序，腋生並頂生，萼截斷狀，花筒白色，長 3 公分，裂片有紅暈，花絲紅紫色；核果倒卵形，徑 1.5 公分。是生性強健、適應力佳，耐旱良好的濱海植物。

園藝小撇步

繁殖主要以播種、扦插方式，可作為盆景。



苦檻藍 *Myoporum bontioides* A. Gray

別　名：義藍盤、甜藍盤
科　名：苦檻藍科
原產地：台灣、中國大陸

常綠灌木；葉互生或稀對生，革質光滑，倒披針形至長橢圓形，長 6 至 10 公分，具透明腺點；花期在 10 月至翌年 2 月，淡紫色花冠會散發出氣味吸引鳥類和昆蟲，花 1 至 3 朵簇生於葉腋，淡紫色；核果球形略肉質，各室 1 至 2 粒種子。樹形半圓形，萌芽性強、耐鹽性佳，是濕地重要常綠灌木。幸福川靠近愛河口可欣賞到苦檻藍。

園藝小撇步

繁殖主要以播種、扦插為主，肉質葉，葉型美麗為主要觀賞部位。







草海桐 *Scaevola taccada* (Gaertn.) Roxb.

別　名：水草
科　名：草海桐科
原產地：台灣、澳洲、太平洋熱帶島嶼

常綠灌木，莖叢生，葉腋具毛叢，其餘部位光滑無毛；葉螺旋狀排列或對生，倒卵形或匙形葉，鈍頭全緣或齒緣，略肉質，先端圓鈍，基部楔形；花長 2 至 2.5 公分，白色或淡黃白色；核果直徑約 1 至 1.5 公分，種子 1 至 2 枚。植株生長於海岸邊，耐鹽、抗風，是可防砂流失的海濱植物。誤食根會導致不適。

園藝小撇步
繁殖採播種、扦插或分株。





蔓荊 *Vitex rotundifolia* L. f.

別　名：白埔姜、海埔姜
科　名：馬鞭草科
原產地：台灣、中國大陸、日本、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、澳洲、太平洋諸島

匍匐性小灌木，枝幹均著生柔毛，枝葉具香味；單葉對生，倒卵形或圓形，頭鈍或圓，基部楔狀全緣，灰白色；淡紫色聚繖花序，萼鐘狀花冠筒漏斗狀；小核果具一室之小種核，周圍為永存萼所包被，種子不具胚乳。根系深入土中，植株強健旺盛、耐旱性強、抗風定砂。



園藝小撇步
繁殖採用分株、播種、扦插行之。



馬鞍藤 *Ipomoea pes-caprae* (L.) R. Br. subsp. brasiliensis (L.) Ooststr.

別　名：馬蹄花、馬蹄藤
科　名：旋花科
原產地：台灣、熱帶沿海地區

無毛匍匐多年生藤本；葉互生，在節處長根，革質，馬鞍形，長 3 至 9 公分，全緣，先端凹截形至深裂，基部截形或略心形；花期全年、夏季最盛，花冠漏斗形，粉紅色至紫紅色，在眾多海濱植物中，其花特別大且艷麗，故有「海濱花后」之稱；蒴果卵狀橢圓形，植株具有深根性，耐旱、耐風、適應力強，於海岸具有防風定沙的功能。

園藝小撇步
繁殖以播種、扦插、分株為主。







高雄城市花田

想要欣賞花海，不必捨近求遠，遍佈高雄各地的「城市花田」，一年四季提供市民滿眼繽紛！

高雄市城市花田計畫，配合年節與農地休耕期，讓城市中的公、私有地換上耀眼色彩，不斷創造驚喜，即使在都會區中的凹仔底森林公園、衛武營都會公園等地，都能享受大片花海美景；而橋頭、美濃、杉林、六龜等地，每年運用休耕期間種植的壯觀花海，彷彿將大地變成畫布，令人讚嘆不已。賞遊花田之餘，民眾還能順遊周邊景點、自行車道，品嘗道地小吃、名產，甚至參加當地節慶活動，是最多采多姿的高雄玩法！



橋頭區

- 地點：竹林公園、橋頭新市鎮、橋頭區公所、捷運青埔站
- 景點：橋頭糖業博物館、橋頭老街
- 自行車道：橋頭自行車道
- 捷運站：捷運紅線橋頭糖廠站、青埔站









美濃區

- 地點：中正湖周圍、中山路兩側
- 景點：中正湖、客家文物館、黃蝶翠谷、雙溪熱帶樹木園
- 自行車道：美濃自行車道





鼓山區

- 地點：捷運凹子底站周邊
- 景點：凹仔底森林公園、高雄市立美術館、愛河之心、高雄市客家文化園區
- 自行車道：博愛世運自行車道、愛河自行車道
- 捷運站：捷運紅線凹子底站







楠梓區

- 地點：高雄大學周邊、台 17 線、後勁溪流域
- 景點：援中港濕地公園、益群橋、都會公園
- 自行車道：後勁溪自行車道
- 捷運站：捷運紅線都會公園站







鳳山區

- 地點：衛武營都會公園
- 景點：衛武營都會公園、大東文化藝術園區、鳳山縣城殘蹟
- 自行車道：捷運橘線自行車道、鳳山溪自行車道
- 捷運站：捷運橘線衛武營站







旗山區

地點：國道 10 號終點

景點：旗山車站、旗山武德殿、旗山糖廠、孔廟、鼓山公園、旗山老街

自行車道：旗山自行車道





鹽埕區





地點：愛河周邊、鹽埕綠廊

景點：愛河、駁二藝術特區、高雄電影館

自行車道：西臨港線自行車道

捷運站：捷運橘線鹽埕埔站



小港區

地點：大坪頂

景點：大坪頂熱帶植物園、鳳山水庫

自行車道：大坪頂林園自行車道



前金區

地點：中央公園

景點：中央公園

自行車道：美麗島自行車道

捷運站：捷運紅線中央公園站





杉林區



地點：月光隧道出口

景點：葫蘆藝術村

高雄市常見花木索引

依中文名稱筆畫順排序

筆畫	中文名	學　　名	頁碼
1 畫	一串紅	*Salvia splendens* Sell. ex Roem. & Schult.	16
2 畫	九重葛屬	*Bougainvillea spp.*	36
3 畫	千日紅	*Gomphrena globosa* L.	11
	大花松葉牡丹	*Portulaca pilosa* L. 'Jewel'	12
	三色菫	*Viola* × *wittrockiana* Gams	22
	大果黃褥花	*Malpighia* × *hybrida* hort.	31
	大王仙丹	*Ixora casei* Hance	39
	大花美人蕉	*Canna* × *generalis* L. H. Bailey	42
4 畫	天使花	*Angelonia salicariifolia* Humb. & Bonpl.	08
	孔雀草	*Tagetes patula* L.	19
	立鶴花	*Thunbergia erecta* T. Anders.	40
	文殊蘭	*Crinum asiaticum* L. var. *sinicum* Baker	43
	月橘	*Murraya exotica* L.	46
	水筆仔	*Kandelia candel* (L.) Druce	62
5 畫	四季秋海棠	*Begonia* × *semperflorens-cultorum* hort.	17
	石竹	*Dianthus chinensis L.*	22
	四季樹蘭	*Aglaia duperreana* Pierre	47
	玉蘭	*Michelia* × *alba* DC.	47
	台灣萍蓬草	*Nuphar shimadae* Hayata	60
	印度莕菜	*Nymphoides indica* (L.) O. Kuntze	60
	白水木	*Tournefortia argentea* L. f.	64
6 畫	百日草	*Zinnia elegans* Jacq.	10
	朱蕉	*Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev.	24
	朱槿	*Hibiscus rosa-sinensis* L.	37
7 畫	含笑	*Michelia figo* (Lour.) Spreng.	49
8 畫	長春花	*Catharathus roseus* (L.) G. Don	09
	波斯菊	*Cosmos bipinnatus* Cav.	14
	非洲鳳仙	*Impatiens walleriana* Hook. f.	18
	金魚草	*Antirrhinum majus* L.	21
	長紅木	*Decaspermum fruticosum* J. R. & G. Forst	26
	夜香木	*Cestrum nocturnum* L.	48
	使君子	*Quisqualis indica* L.	53

筆畫	中文名	學　　名	頁碼
9 畫	春不老	*Ardisia solanacea* Roxb.	27
	紅葉鐵莧	*Acalypha wilkesiana* Muell.-Arg.	29
	洋紅仙丹	*Ixora longifolia* Smith	39
	茉莉	*Jasminum sanbac* (L.) Ait	48
	重瓣馬茶花	*Tabernaemontana divaricata* (L.) R. Br. 'Flore Pleno'	50
	珊瑚藤	*Antigonon leptopus* Hook. & Arn.	55
	星果藤	*Tristellateia australasiae* A. Rich.	56
	炮仗花	*Pyrostegia venusta* (Ker) Miers	57
	紅海欖	*Rhizophora stylosa* Griff.	62
	香蒲	*Typha orientalis* Presl	63
	苦林盤	*Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.	64
	苦檻藍	*Myoporum bontioides* A. Gray	65
10 畫	夏堇	*Torenia fournieri* Lind. ex Fourn.	11
	粉萼鼠尾草	*Salvia farinacea* Benth.	20
	粉葉金花	*Mussaenda 'Dou Luz'* hort. *(M. pbilippica* 'Alicia' × *M. erythrophbla)*	33
	射干	*Belamcanda chinensis* (L). DC.	34
	宮粉仙丹	*Ixora sianensis* Wall.	38
	時鐘花	*Turnera ulmifolia* L.	44
	馬纓丹	*Lantana camara* L.	45
	桂花	*Osmanthus fragrans* (thunb ex A. Murr.) Lour.	50
	海茄苳	*Avicennia marina* (Forsk.) Vierh.	61
	草海桐	*Scaevola taccada* (Gaertn.) Roxb.	66
	馬鞍藤	*Ipomoea pes-caprae* (L.) R. Br. subsp. brasiliensis (L.) Ooststt.	67
11 畫	彩葉草	*Solenostemon scutellarioides* (L.) Codd 'Hybridas'	13
	黃波斯菊	*Cosmos sulphureus* Cav.	14
	黃金金露花	*Duranta erecta* L. 'Goldon Leaves'	23
	彩葉山漆莖	*BBreynia disticha* J. R. & Forst. 'Roseo-picta'	29
	黃金榕	*Ficus microcarpa* L. f. 'Golden Leaves'	32
	細葉雪茄花	*Cuphea hyssopifolia* H. B. K.	35
	黃蝴蝶	*Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw.	35

筆畫	中文名	學　　名	頁碼
11 畫	黃鸚鳥蕉	*Heliconia 'Golden Torch'* hort. (*Heliconia psittacorum* × *H.spathocircinata*)	42
	黃鐘花	*Tecoma stans* H. B. K.	44
	黃梔	*Gardenia angusta* (L.) Merr.	49
	黃蟬	*Allamanda cathartica* L.	55
	荷花	*Nelumbo nucifera* Gaertn.	59
12 畫	紫薇	*Lagerstroemia indica* L.	41
	斑葉月桃	*Alpinia zerumlet* (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith 'Variegata'	41
	雲南黃馨	*Jasminum mesnyi* Hance	56
13 畫	矮牽牛	*Petunia* × *hybrida* Vilm.	15
	聖誕紅	*Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch	33
	矮仙丹	*Ixora Sunkist* hort.	38
14 畫	銀葉菊	*Senecio cineraria* DC.	21
	福建茶	*Carmona retusa* (Vahl) Masamune	26
	翠蘆莉	*Ruellia brittoniana* E. Leonard	40
	蜘蛛百合	*Hymenocallis caribaea* (L. emend. Ker) Herb.	43
15 畫以上	萬壽菊	*Tagetes erecta* L.	19
	蒜香藤	*Mansoa hymenaea* (DC.) A. Gentry	54
	緬梔	*Plumeria rubra* L. var. *acutifolia* (Poir.) Woodson	51
	蔓荊	Vitex rotundifolia L. f.	67
	蔓馬纓丹	*Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq.	52
	錫蘭葉下珠	*Phyllanthus myrtifolius* Moon	30
	錦屏藤	*Cissus sicyoides* L .	58
	錦葉紅龍草	*Alternanthera dentata* (Moench) scheygr. ' cv. Rubiginosa Stripe'	25
	繁星花	*Pentas lanceolata* (Forsk.) Deflers.	13
	薜荔	*Ficus pumila* L.	58
	鵝掌藤	*Schefflera arboricola* Hayata	32
	蘆葦	*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.	63
	蘭嶼羅漢松	*Podocarpus costalis* Presl	31
	變葉木	*Codiaeum variegatum* (L.) Blume var. *pictum* (Lodd.) Muell.-Arg.	28
	欖李	*Lumnitzera racemosa* Willd.	61



健康多彩的每一天

生活在高雄，除了綠蔭濃密、高大筆直的行道樹，週遭隨處可見的開花灌木、彩葉植物、季節草花，更是不可或缺的城市生態角色。

生意盎然的灌木、小喬木，除了與行道樹相互映襯，更形成複層植栽，提供更多小生物棲身之所，豐富城市的生態環境；而隨季節更換的草花，色彩多樣絢麗，提供四季不同的視覺饗宴，點亮市民每天的生活，許多花木如馬纓丹及繁星花等也是極佳的蜜源植物，使人們在城市裡也能見到蜂蝶翩翩之姿。

除了公部門的投入外，民眾更可以是城市景觀的魔法師，在私有空地或居家空間中，依季節變化挑選適宜的植栽，不僅增加家庭綠意，也為城市抹上繽紛色彩，創造熱鬧的多樣生態，在高雄這座幸福城市中，展開健康多彩的每一天。

高雄市政府工務局養護工程處處長 趙建喬